

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕВИТЕЛЯ

ЛИБЕКСИН 100 mg таблетки
LIBEXIN 100 mg tablets
преноксдиазинов хидрохлорид (prenoxydiazine hydrochloride)

ИАЛ
ОДОБРЕНО!

ДАТА: 07039/30.09.08

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Либексин и за какво се използва
2. Преди да приемете Либексин
3. Как да приемате Либексин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Либексин
6. Допълнителна информация

1. КАВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИБЕКСИН И ЗА КАВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Лекарственият продукт се прилага при остра и хронична, главно суха кашлица (такава при която не се отделят секрети). За подготовка при провеждане на бронхоскопия и бронхографично изследване за подтикане на кашлицата.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛИБЕКСИН

Не приемайте Либексин при:

- свръхчувствителност към помощните вещества на лекарствения продукт,
- заболявания свързани със значително отделяне на бронхиален секрет, при постоперативни състояния (след инхалационна анестезия)

Обърнете специално внимание при употребата на Либексин

При наличие на лактозна непоносимост, да се има предвид, че една таблетка съдържа 38,0 mg лактоза. Когато се приема съгласно препоръките на дозиране, всяка доза набавя до 114 mg лактоза. Продуктът е неподходящ при хора с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция.

Глицеролът е вреден при високи дози. Може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Бременност и кърмене

Въпреки че не оказва влияние върху плода, употребата му по време на бременност и кърмене да става само след консултация с лекар.



Шофиране и работа с машини

При по-високи дози лекарственият продукт може да наруши бдителността, затова употребата на Либексин става само след индивидуална преценка на състоянието.

Важна информация относно някои от съставките на Либексин

При наличие на лактозна непоносимост, да се има предвид, че една таблетка съдържа 38 mg лактоза.

Глицеролът може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛИБЕКСИН

Ако не е предписано друго, обичайната доза е:

Възрастни:

Обичайната доза е 3-4 пъти дневно по 1 таблетка (3-4 пъти по 100 mg).

В по-тежките случаи, дозата се увеличава до 3-4 пъти дневно по 2 таблетки, или 3 пъти по 3 таблетки (3-4 пъти по 200 mg, или 3 пъти по 300 mg).

Деца:

Обичайната доза е пропорционално по-ниска, отговаряща на възрастта и телесното тегло:

3-4 пъти по 1/2 таблетка (3-4 пъти 50 mg).

Прилага се при деца над 6-годишна възраст.

При подготовка за бронхоскопия: прилага се само след консултация с лекар в предписаната от него доза.

В случай на затруднено отделяне на гъст бронхиален секрет може да се окаже необходимо прилагането на еспекторанти и муколитици.

Таблетката се погъльща цяла без да се сдъвква, защото може да предизвика временно изтръпване на лигавицата на устата.

Максималната еднократна доза за деца над 6-годишна възраст е 1/2 таблетка, за възрастни 3 таблетки. Максималната дневна доза за деца е 2 таблетки, за възрастни 9 таблетки.

Ако сте приели повече от необходимата доза Либексин

При прилагането на по-високи дози се наблюдава появата на седативен ефект и умора няколко часа след приема. При предозиране, веднага се консултирайте с лекар.

Ако сте пропуснали да приемете използвате Либексин

Да не се употребява двойна доза за сметка на пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Либексин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Рядко се наблюдават сухота в устата или гърлото, или алергични реакции.

Стомашно-чревни оплаквания (стомашна болка, запек) могат да се наблюдават при по-малко от 10 % при случаите, които изчезват при провеждане на диета.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.



5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛИБЕКСИН

Да се съхранява се при стайна температура под 25°C, в оригиналната опаковка.

Да не се използва след датата отбелязана върху опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Либексин

- Активното вещество е: преноксиазинов хидрохлорид 100 mg (prenoxydiazine hydrochloride);
- Другите съставки са: глицерол, магнезиев стеарат, талк, повидон, царевично нишесте, лактозаmonoхидрат (38,0 mg).

Как изглежда Либексин и какво съдържа опаковката

В една опаковка се съдържат 20 таблетки в PVC/алуминиев блистер.

Притежател на разрешението за употреба

Санофи-Авентис България ЕООД,
София 1303, Бул. Ал. Стамболовски 103
България

Производител

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Co.Ltd.
1045 Budapest, To u.1-5, HUNGARY

и/или

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Co.Ltd.
H-2112 Veresegyhaz, Levai u. 5, HUNGARY

Дата на последна редакция на текста

Август 2008

