



Уважаеми пациенти,

моля прочетете внимателно следната листовка за пациента, тъй като тя съдържа важни сведения за това какво трябва да съблюдавате при употреба на този лекарствен продукт. Ако имате въпроси, моля обръщайте се към Вашия лекар или фармацевт.

Листовка за пациента Моля, прочетете внимателно!

AMLOVAS® tablets 5 mg

АМЛОВАС® таблетки 5 mg

Наименование на лекарствения продукт

Името на това лекарство е АМЛОВАС®. Лекарственото вещество е amlodipine.

Какво съдържа АМЛОВАС®?

Една таблетка АМЛОВАС® съдържа 5 mg от лекарственото вещество amlodipine. Помощни вещества: двуосновен калциев фосфат, анхидрид, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза и натриев нишестен гликолат. АМЛОВАС® се предлага в опаковки от 20 таблетки, два блистера с по 10 таблетки са поставени в картонена кутия с листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oguzlar Mah. 56. Sok. No: 7/3 Balgat-Ankara
TURKEY

Производител

PLANTAFARMA İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sancaklar Köyü 81100 Düzce
TURKEY

Какъв тип лекарство е АМЛОВАС®?

АМЛОВАС® принадлежи към група медикаменти, наречени калциеви антагонисти.

За какво се използва АМЛОВАС®?

АМЛОВАС® се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония), като се прилага самостоятелно или при необходимост с други лекарствени продукти за понижаване на кръвното налягане. Прилага се и при лечение на ангина пекторис (различни форми на исхемична болест на сърцето, при която се нарушава кръвоснабдяването на сърцето, в резултат на което възниква болка в гърдите).

При пациенти с високо кръвно налягане АМЛОВАС® действа, като разширява кръвоносните съдове, така че кръвта преминава през тях по-лесно. При пациенти с ангина пекторис АМЛОВАС® действа, като подобрява кръвоснабдяването на сърдечния мускул, който така получава повече кислород, и като резултат се предотвратява гръдната болка. АМЛОВАС® не осигурява бързо облекчение на гръдната болка от ангина пекторис.

Преди да използвате АМЛОВАС®

АМЛОВАС не бива да се използва, ако имате:

- Алергия към АМЛОВАС® или други калциеви антагонисти. Това може да бъде болка, зачервяване на кожата или затруднения в дишането.
- Кардиогенен шок и нестабилна стенокардия



- Тежко понижение на кръвното налягане, сърдечна недостатъчност след прекаран инфаркт на миокарда (през първите 28 дни), запушване на изходния тракт на лявата камера.
- Не се препоръчва приложение при деца под 12 годишна възраст.

Ако отговорът на някои от въпросите по-долу е ДА, уведомете Вашия лекар преди да приемете АМЛОВАС®:

- ✓ Прекарвали ли сте скоро сърдечен удар или имате хипертонична криза?
- ✓ Имате ли чернодробно заболяване?
- ✓ Бременна ли сте? Кърмите ли? Ако сте жена в детеродна възраст, препоръчителна е ефективна контрацепция.
- ✓ Под 18 години ли сте?

Клиничният опит показва, че е малко вероятно АМЛОВАС® да наруши способността Ви за шофиране и работа с машини. При пациенти със замаяване, главоболие, умора или гадене АМЛОВАС® може да повлияе способността за шофиране и работа с машини.

Как да приемате АМЛОВАС®?

Обичайната доза АМЛОВАС® е една таблетка дневно.

Приемайте таблетките, както Ви е предписал Вашия лекар. Най-добре е да приемате таблетките по едно и също време всеки ден с чаша вода. Продължавайте да приемате таблетките всеки ден. Те могат да Ви помогнат да се чувствате добре. Не чакайте таблетките да се свършат, за да посетите Вашия лекар. Той може да прецени да Ви предпише още таблетки АМЛОВАС®.

Ако все още не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Какво ще се случи, ако еднократно приемете твърде много таблетки?

Ако приемете твърде много таблетки, може да се почувствате зле. Ако няколко таблетки бъдат приети наведнъж, това може да е опасно. В този случай уведомете незабавно Вашия лекар или идете до най-близкото спешно отделение.

Какво ще стане, ако пропуснете прием на таблетка?

Не се тревожете. Ако забравите да вземете една таблетка, оставете напълно тази доза. Приемете следващата си доза в указаното време.

Причинява ли АМЛОВАС® нежелани лекарствени реакции?

АМЛОВАС®, както всички лекарства, може да причини някои нежелани лекарствени реакции. Най-чести са: зачервяване, лесна уморяемост, оток (например оток на глезена), замаяност, главоболие, коремни болки, гадене, сърцебиене (по-бързо и неравномерно биене на сърцето), сънливост.

Уведомете Вашия лекар, ако тези ефекти Ви причиняват проблеми или продължават повече от една седмица.

Следните нежелани лекарствени ефекти са наблюдавани по-рядко при пациенти, приемащи АМЛОВАС®, и не са задължително причинени от лекарството: сухота в устата, увеличено изпотяване, чувство на слабост, болки в гърба, неразположение, увеличаване/намаляване на телесното тегло, спадане на кръвното налягане, синкоп, намалена чувствителност, изтръпване (парестезия), тремор, периферна невропатия (нарушение на функцията на периферните нерви), увеличение на гърдите при мъже, нарушен чревен пасаж, стомашно разстройство (включително гастрит), повръщане, подуване на венците, панкреатит, увеличение на кръвната захар, болки в ставите, схващане на мускулите, болки в мускулите, намаление на тромбоцитите, импотентност, безсъние, промени в настроението, недостиг на въздух, кашлица, ринит (възпаление на носа), косопад, нарушено оцветяване на кожата, уртикария



(кожен обрив), промени във вкуса, шум в ушите, често уриниране, нарушения в уринирането, по-често нощно уриниране, възпаление на кръвоносните съдове, намаление на белите кръвни клетки и зрителни нарушения.

Следните нежелани реакции се срещат изключително рядко при пациенти, приемащи АМЛОВАС[®], и също не са непременно свързани с употребата на лекарството: хепатит, жълтеница, повишаване на чернодробните ензими, понякога налагащи хоспитализация. Следните състояния са наблюдавани при пациенти, третирани с АМЛОВАС[®], но могат да са резултат от лекуваното заболяване: сърдечен удар (миокарден инфаркт), неравномерно биене на сърцето (аритмия) и болка в гърдите.

Всички лекарства могат да причинят алергични реакции. Следните случаи се наблюдават рядко при пациенти, които се лекуват с АМЛОВАС[®]: сърбеж по кожата, обрив, оток на ларинкса и състояние, наречено еритема мултиформе (подути плаки върху кожата и лигавицата на устната кухина). Тежки алергични реакции са изключително редки и понякога животозастрашаващи. Всяко внезапно хъркане, затруднение в дишането, подуване на клепачите, лицето или устните, обрив или сърбеж (особено по цялото тяло) трябва да бъде незабавно съобщено на Вашия лекар.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакъв друг нежелан ефект.

Къде да съхранявате Вашето лекарство?

Съхранявайте Вашето лекарство при температура под 25° С! **Съхранявайте всички лекарства на недостъпно за деца място!**

Грижете се за Вашето лекарство! То е предписано на ВАС. НЕ ТРЯБВА да го давате на други. То може да не е подходящо за тях.

Не приемайте лекарството след датата, обозначена на опаковката!

Допълнителна информация

Информацията в тази листовка е само за АМЛОВАС[®]. Тази листовка не съдържа цялата информация за лекарството. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на текста

Април, 2005 г.

