

Липантил 267 М се опакова в блистери по 15 капсули, по два блистера в картонена кутия – общо 30 капсули в опаковка.

Защо Вашият лекар иска да взимате Липантил 267 М

Липиди и дислипидемия (нарушена мастна обмяна)

Чрез кръвни тестове, Вашият лекар е открил, че имате твърде висок холестерол или триглицериди в кръвта. Те са мастни субстанции (липиди). Вие може да не сте забелязали никакви симптоми. Това състояние се нарича хиперлипидемия (повишени стойности на липидите) или по-общо дислипидемия (нарушена мастна обмяна).

Рискове от твърде висок холестерол или триглицериди

Твърде високият холестерол може да Ви изложи на риск от развитие на сърдечносъдови заболявания. “Лош” тип холестерол, наречен липопротеинов холестерол с малка плътност (LDL), може да образува плаки върху стените на Вашите главни кръвоносни съдове. Това може да доведе до запушване на важни кръвоносни съдове във Вашето сърце, мозък или крайници. Високите нива на триглицеридите в кръвта могат също да увеличат риска от сърдечносъдови заболявания.

Преди да вземете Липантил 267 М

Преди да вземете капсулите, кажете на Вашия лекар, ако някое от следните оплаквания се отнася за Вас:

- Страдате от чернодробни или бъбречни заболявания или заболявания на жлъчния мехур.
- Страдате от панкреатит (възпаление на панкреаса, водещо до силна коремна болка).
- Алергични сте или сте реагирали лошо към фенофибрат, Липантил 267 М или към сходни лекарства, или към някое от помощните вещества в това лекарство.
- Имате доказана фотоалергия (алергична реакция, причинена от слънчева светлина или излагане на UV светлина) или фототоксични реакции (поражение на кожата, причинено от излагане на слънчева или UV светлина) по време на лечение с фибрати (понижаващи нивото на липидите лекарства) или с кетопрофен (противовъзпалително лекарство).
- Бременни сте, кърмите или планирате да забременеете.
- Взимате антикоагуланти, за да предотвратите съсирване на кръвта си (например варфарин).
- Взимате други понижаващи нивото на липидите лекарства (например лекарства, известни като статини или фибрати).
- Страдате от хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза).
- Пиете много алкохол.
- Взимате фенофибрат и циклоспорин (имуносупресор – потискащо имунитета лекарство).

Как да взимате Липантил 267 М

Важно е да взимате капсулите, както Вашият лекар Ви е предписал. Също така, моля прочетете етикета на опаковката. Обичайната доза за възрастни е 1 капсула Липантил М 200 mg дневно. Обаче, Вашият лекар може да иска да взимате 1 капсула Липантил 267 М mg дневно (по-голяма доза), защото имате остра дислипидемия. Важно е да взимате капсулата с храна, защото няма да подейства на гладно. Преглътнете капсулата цяла с вода.



Не се тревожете, ако забравите да вземете дозата Липантил 267 М. Вземете следващата доза със следващото ядене и след това продължете да взимате капсулите, както обикновено. Ако забравите да вземете лекарството, не взимайте 2 дози наведнъж. Ако се притеснявате за това, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Деца не трябва да взимат Липантил 267 М.

Друга информация

Дислипидемията се нуждае от лечение за дълъг период от време. Не спирайте да взимате лекарството, освен ако Вашият лекар не Ви каже, или не се чувствате добре от капсулите. Също така, трябва да продължите с Вашата бедна на мазнини диета.

Ако се консултирате с друг лекар или постъпите в болница, предупредете, че взимате Липантил 267 М, защото някои лекарства не трябва да се взимат с него. Уведомете Вашия лекар, ако трябва да взимате други лекарства.

Какво да направите, ако вземете твърде много капсули

Ако случайно вземете твърде много капсули, или мислите, че дете е глътнало капсули, веднага се свържете с най-близката болница или с Вашия лекуващ лекар.

Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, Липантил 267 М може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не при всеки се проявяват. Някои пациенти чувстват следните нежелани лекарствени реакции, когато приемат фенофибрат.

Често срещани нежелани лекарствени реакции (получавани при <1/10 и >1/100 пациенти)

- Коремна болка, гадене, повръщане, диария и събиране на газове в стомаха и червата);
- Повишени кръвни нива на различни чернодробни ензими.

Нечесто срещани нежелани лекарствени реакции (получавани при <1/100 и >1/1000 пациенти)

- панкреатит (възпаление на панкреаса, водещо до коремна болка);
- тромбоемболизъм: белодробен емболизъм (съсирек в белите дробове, причиняващ болка в гърдите и задух), дълбока венозна тромбоза (съсирек в краката, причиняващ болка, зачервяване или подуване);
- обрив, сърбеж, уртикария (копривна треска);
- леко повишаване на креатинина (вещество, секретирано от бъбреците);
- мускулна болка, възпаление на мускулите, мускулни крампи и слабост;
- главоболие;
- намалено либидо.

Рядко срещани нежелани лекарствени реакции: (получавани при <1/1000 и >1/10000 пациенти)

- хепатит (възпаление на черния дроб), чиито симптоми се изразяват в лека жълтеница (пожълтяване на кожата и белите части на очите), стомашни болки и сърбеж;
- разпадане на клетките на мускулатурата;
- падане на косата;
- намаляване на хемоглобина (пренасящ кислорода пигмент в кръвта)
- повишена чувствителност към слънчева светлина, лампи и солариуми



- леко повишаване на уреята (субстанция, отделяна от бъбреците)

Много рядко срещани нежелани лекарствени реакции

- хронична интерстициална пневмопатия (хронично заболяване на междуклетъчната белодробна тъкан)

Ако изпитате някакви други нежелани лекарствени реакции, които не са споменати в тази листовка, моля веднага уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Как да съхранявате Вашите капсули

Да се съхранява при температура под 30°C.

Съхранявайте лекарството в оригиналната му опаковка.

Да се пази на място, недостъпно за деца!

Срок на годност: 3 години.

Не взимайте капсулите след изтичане на срока на годност, отпечатан върху опаковката.

Тези капсули са за Вас. Само лекар може да Ви предпише Липантил 267 М капсули. Никога не ги давайте на друг.

Дата на последна редакция на листовката:

Юли 2008 г.

Внимание! Информацията в тази листовка е ограничена!

В случай на допълнителни въпроси, се обърнете към Вашия лекуващ лекар или към:

Солвей Фарма ЕООД

София Тауър, ет. 5, офис 52

бул. Ал. Стамболийски 103, 1303, София

Тел: ++ 3592 9234 700

Факс: ++ 3592 9234 701

