

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

МАСТОДИНОН перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт
Перорални капки, разтвор 100 ml

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 11-2495 / 15.04.08

Одобрено: № 11/14.04.2008

Състав:

100 g съдържат: *Agnus castus* (Аврамово дърво) ТМ, *Caulophyllum thalictroides* (Каулофилум) D4, *Cyclamen* (Циламен) D4, *Ignatia* (Игнация) D6, *Iris* (Перуника пъстросцветна) D2, *Lilium tigrinum* (Лилиум тигринум) D3.

Помощно вещество: етанол 53 % (v/v)


Начин на действие:

Смущенията в цикъла и/или стерилитетът често са причинени от недостатъчно образуване на жълто тяло в яйчниците. Жълтото тяло се образува всеки месец под въздействието на хормони. Самото жълто тяло образува хормони, между които и прогестерон, от който зависят силата и продължителността на месечното кръвотечение. При оплождане прогестеронът отговаря за запазване на бременността, затова често го наричат хормон-протектор (защитник на бременността). Ако яйцеклетката не бъде оплодена, жълтото тяло търпи обратно развитие, нивото на прогестерон в кръвта спада и се появява месечното кръвотечение. Предменструалния синдром се характеризира със специфични физически и психични симптоми, които настъпват около 7-10 дни преди месечното кръвотечение и отшумяват напълно през първия или втория ден от менструацията. Известно е, че предменструалният синдром се причинява от недостатъчното равновесие на фоликулите и хормоните на жълтото тяло през втората половина на цикъла. Мастодинон се намесва в цикъла между централната нервна система и яйчниците и по такъв начин съдейства за равновесието на хормоните. Така се стига до съществено намаляване на оплакванията и до пълното им отшумяване. Мастодинон не съдържа хормони. При продължителни и рецидивиращи оплаквания с неясен произход трябва да се потърси лекарска помощ, тъй като може да става дума за заболявания, за които е необходимо медицинско лечение.

Показания:

За какво се използва Мастодинон?

- смущения в менструалния цикъл, причинени от преходна или трайна недостатъчност на жълтото тяло
- стерилитет, дължащ се на недостатъчност на жълтото тяло
- оплаквания при менструация (предменструален синдром), като например напрегнатост, болки в гърдите, психическа лабилност, оток на горни и долни крайници, главоболие и мигрена
- фиброкистозна мастопатия



Противопоказания:

Кога не трябва да приемате Мастодинон?

Няма данни. Мастодинон не е предназначен за лечение на злокачествени образувания на млечните жлези.

Специални предупреждения:

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употребата на Мастодинон?

Лекарствения продукт съдържа 53 обемни % етанол. Поради това не трябва да се назначава след успешно лечение на алкохолизъм и трябва да се прилага при чернодробни заболявания само след консултация с лекар.

Възможни са прояви на свръхчувствителност към някое от активните и/или помощните вещества.

Лекарствени и други взаимодействия:

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Мастодинон или могат да бъдат повлияни?

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

В хомеопатичната терапия е известно, че обичайните вредни фактори като тютюнопушене и прием на алкохол оказват негативно влияние върху ефективността на хомеопатичния продукт.

Бременност и кърмене

Мастодинон не трябва да се прилага по време на бременност, тъй като няма достатъчно проучвания за използването на продукта при бременни жени. Мастодинон не трябва да се прилага по време на кърмене, тъй като данните от проведените изследвания с животни свидетелстват за понижаване на лактацията.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Лекарствения продукт съдържа 53 обемни % етанол. Количеството етанол, което се съдържа в единична доза (приблизително 0,5 g) се метаболизира от лица с нормален метаболизъм и телесно тегло за няколко минути. Не се очаква повлияване на способността за участие в пътното движение или обслужване на машини, вследствие на употребата на продукта.

Дозировка и начин на употреба


Как можете да използвате Мастодинон?

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, сутрин и вечер се приемат по 30 капки (0,9 ml) Мастодинон, разредени с малко вода.

В случай, че оплакванията се възобновят след преустановяване на приема на лекарствения продукт, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар преди да продължите лечението.

Предозиране:

Не са известни токсични свойства както на лекарствения продукт, така и на



някоя от неговите съставки.

Какви нежелани реакции може да предизвика Мастодинон?

Рядко биха могли да се наблюдават гадене, стомашни оплаквания, леко повишаване на телесното тегло, обрив, съпроводен със сърбеж, акне и главоболие. В отделни случаи са възможни преходно психомоторно безпокойство, състояния на обърканост и халюцинации.

Указания за употреба

Флаконът с препаратa трябва да се държи в изправено положение!

След по-продължително съхранение разтворът може да помътнее и да се образува лека утайка, което не нарушава качествата на продукта.

Условия на съхранение:

Мастодинон капки трябва да се съхраняват на защитено от светлина и влага място.

Да не се съхранява при температура по-висока от 25°C.

Срок на годност

Срокът на годност е 3 години.

Срок на годност след отваряне на опаковката – 6 месеца.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Производител и притежател на разрешението за употреба

BIONORICA AG

Kerscheneinerstrasse 11-15

D-92318 Neumarkt / Германия

Медицинско представителство в България:

Либра ЕАД

Дата на последна редакция на листовката

Май 2008

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

По лекарско предписание!

