


Информация за пациента

MEDAZERAM NIHFI
МЕДАЗЕПАМ НИХФИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 11-5375/03.06.02г	
619/09-04.02	

СЪСТАВ

Лекарствено вещество: Medazepam 10 mg в една таблетка.

Помощни вещества: лактоза монохидрат, пшенично нишесте, талк, магнезиев стеарат, желатин.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Таблетки по 10 mg, по 30 броя в опаковка.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

НИХФИ АД

София 1797

бул. "Кл. Охридски" 3,

ДЕЙСТВИЕ

Медазепам е бензодиазепинов лекарствен продукт с изразено успокояващо действие. Премахва напрежението и чувството на страх, настъпили в резултат на психическо натоварване. Има незначителен сънотворен и миорелаксиращ (разпускащ скелетната мускулатура) ефект.

Резорбира се добре в стомашно-чревния тракт. Разгражда се главно в черния дроб. Премахва кръвно-мозъчната бариера. Отстранява се от организма с урината. Премахва през плацентата и се отделя с кърмата.

ПОКАЗАНИЯ

Невротични разстройства и състояния, съпроводени с чувство на страх, тревога, напрегнатост, повишена раздразнителност, безсъние, вегетативна лабилност.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Медазепам не трябва да се прилага при свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарствения продукт или към други бензодиазепини, както и при предишна или сега съществуваща зависимост към алкохол, наркотици или

други лекарства; през първите три месеца на бременността; болестна мускулна слабост (миастения гравис).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

По време на лечение с медазепам да се избягва употребата на алкохол.

Не е желателно рязкото прекратяване на лечението. Дозата на препарата винаги трябва да се намалява постепенно.

Да се избягва употребата на медазепам при пациенти с депресия и остра дихателна недостатъчност.

Много предпазливо да се използва при хронична белодробна недостатъчност, заболявания на бъбреците и черния дроб и при пациенти в напреднала възраст.

Внимание

Този лекарствен продукт съдържа пшенично нишесте и може да представлява опасност за хора с цьолиакия (глутенова ентеропатия).

Употреба при бременност и кърмене

Да не се употребява в първите 3 месеца на бременността. В периода на кърмене да се използва само по строга лекарска преценка, тъй като преминава през плацентата и се отделя с млякото.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Поради опасност от намаляване на активното внимание и забавяне на рефлексите, по време на лечение с този лекарствен продукт не трябва да се управляват моторни превозни средства и машини.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Медазепам усилва ефектите на други потискащи ЦНС средства - невролептици, транквилизатори, хипнотици, наркотици, аналгетици и алкохол.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекуващия лекар. Дозите се определят индивидуално. Ако лекарят не е предписал друго, лечението може да се проведе по следната схема: за амбулаторно лечение обикновено по 2 таблетки дневно - сутрин и обед по 1/2 таблетка

и 1 таблетка вечер. При по-леки състояния, болни в напреднала възраст и при деца от 12 до 16 години - по 1-2 таблетки дневно.

Прилагането на медазепам при деца под 12 години не се препоръчва, тъй като клиничният опит при тази група пациенти е твърде малък.

Предозиране

При приемане на по-високи дози от предписаните може да се наблюдава депресия, сънливост, нарушения на съзнанието. В такива случаи лечението се спира и се търси незабавно лекарска помощ.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

В началото на лечението, може да се наблюдават леко изразени сънливост, уморяемост, замаяност, които обикновено преминават самостоятелно или при намаляване на дозата. При по-високи дози е възможно нарушение в координацията и понижаване на способността за ориентиране.

При продължителна употреба може да се развие лекарствена зависимост, която се характеризира главно със силно желание за употреба на лекарството, тенденция към повишаване на дозата, физическа и психическа зависимост, абстинентен синдром при прекратяване на приема.

СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 30°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца места!

СРОК НА ГОДНОСТ

4 години.

Лекарственият продукт да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката!

Последна редакция на информацията: 12.2001 г.