

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мепрезор 20 mg стомашно-устойчиви таблетки
Мепрезор 40 mg стомашно-устойчиви таблетки

А
СР
10.04.09

Езомепразол (*Esomeprazole*)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Мепрезор и за какво се използва
2. Преди да приемете Мепрезор
3. Как да приемате Мепрезор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мепрезор
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕПРЕЗОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Мепрезор се използва

- за **лечение** на следните **оплаквания от страна на хранопровода**, причинени от рефлукс на стомашен сок
 - оплаквания от страна на хранопровода с увреждане на тъканите
 - излекувано възпаление на хранопровода, което се нуждае от дългосрочно лечение, за да се продотвърти рецидив
 - симптоми от страна на хранопровода причинени от рефлукс на стомашен сок.
- за **елиминиране** на бактерия, наречена **Хеликобактер пилори** в комбинация с определени антибиотици
 - за лечение на язви на дванадесетопръстника
 - за профилактика на рецидив на язви свързани с тази бактерия
- ако за **продължителен период от време се приемат лекарства, които лекуват болка или ревматизъм**
 - за лечение на стомашни язви
 - за профилактика на язви на стомаха и дванадесетопръстника, причинени от лекарства прилагани за лечение на болка и ревматизъм при пациенти изложени на риск.
- за лечение на **синдрома на Zollinger-Ellison**
Това е заболяване на стомаха и дванадесетопръстника, при което в тези органи се образуват язви. Причинява се от определен вид тумор, който води до необичайно засилено, хормонално-контролирано отделяне на киселина в стомаха.

Мепрезор е лекарство, което намалява отделянето на киселина в стомаха. Това позволява на язви в стомаха и дванадесетопръстника да заздравеят.



2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ МЕПРЕЗОР

Не приемайте Мепрезор

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към
 - активното вещество езомепразол
 - сходни на това лекарства, имената на чиито активни вещества завършват на –празол или
 - към някоя от останалите съставки.
- ако приемате лекарства, съдържащи активното вещество **атазанавир**, лекарство за лечение на ХИВ инфекции.

Обърнете специално внимание при употребата на Мепрезор

Информирайте Вашия лекар, ако

- имате симптоми, като изразено непреднамерено отслабване на тегло, упорито повръщане, затруднение при гълтане, повръщане на кръв или наличие на кръв в изпражненията, или ако имате **язва на стомаха**, или ако Вашия лекар предполага, че можете да имате такава. Вашият лекар ще Ви изследва, за да изключи вероятността за наличие на тумори, тъй като Мепрезор облекчава симптомите и това може да забави поставянето на диагнозата.
- **приемате това лекарство за дълъг период от време**, особено за срок от над 1 година. В този случай Вашият лекар ще провежда редовни контролни прегледи.
- приемате Мепрезор **при нужда**. Консултирайте се с Вашия лекар, в случай че симптомите Ви се променят.
- приемате **други лекарства**, например за елиминиране на бактерията Хеликобактер пилори. Вижте следващата точка и следвайте съветите отразени в другите листовки.
- имате **сериозно увредена бъбречна функция**.

Деца под 18 годишна възраст

Мепрезор трябва да се приема само от деца на възраст от 12 до 18 години за продължително лечение на оплаквания от страна на хранопровода посочени в точки 1а) и 3а).

Не се препоръчва да се прилага при деца под 12-годишна възраст поради липса на достатъчно данни.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Следните лекарства могат да повлияят или да бъдат повлияни от Мепрезор:

- **кетоназол, итраконазол**, лекарства за лечение на гъбичкови инфекции
- **вориконазол**, лечение на гъбичкови инфекции
При необходимост лекарят ще коригира дозата на Мепрезор при пациенти, които провеждат продължително лечение и при пациенти с тежко увредена чернодробна функция.
- **атазанавир**, лекарство за лечение на ХИВ инфекция
Виж точка 2 “Не приемайте Мепрезор”.
- лекарства, които се метаболизират от специфични ензими като
 - **диазепам**, лекарство, което успокоява и води до заспиване
 - **циталопрам, имипрамин, кломипрамин**, лекарства за лечение на депресия
 - **фенитоин**, лекарство за лечение на епилепсия и някои състояния на болка
При необходимост, Вашият лекар трябва да намали дозата на тези лекарства, особено при нередовен прием. Ако приемате фенитоин, Вашият лекар ще проследява нивата на фенитоина в кръвта, особено при започване или преустановяване на лечението с Мепрезор.
- **варфарин, фенпрокумон, аценокумарол**, лекарства прилагани за предотвратяване на нормалното съсирване на кръвта
Вашият лекар ще проследява нивата на кръвосъсирването, особено при започване или преустановяване на лечението с Мепрезор.



- **цизаприд**, лекарство прилагано при проблеми със стомаха и червата
- **кларитромицин**, антибиотик

Бременност и кърмене

- **Бременност**

Поради липсата на достатъчно данни, по време на бременност приемайте Мепрезор **само в случай, че Вашият лекар счита това за абсолютно необходимо.**

- **Кърмене**

Поради липсата на достатъчно данни **не се препоръчва** Мепрезор да се приема по време на кърмене.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Може да шофирате и работите с машини, тъй като не са наблюдавани ефекти върху тези способности.

Важна информация относно някои от съставките на Мепрезор

Този продукт съдържа глюкоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате **непоносимост към някои захари**, свържете се с него преди да приемете този продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МЕПРЕЗОР

Мепрезор 20 mg

Винаги приемайте Мепрезор точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В случай че Вашият лекар не е предписал друго, обичайната доза е:

Възрастни и подрастващи над 12-годишна възраст

а) с оплаквания от страна на хранопровода

- оплаквания от страна на хранопровода с увреждане на тъканите
2 таблетки еднократно дневно за 4 седмици

Препоръчва се продължаване на лечението за допълнителни 4 седмици, ако заболяването на хранопровода не е оздравяло или когато оплакванията от страна на хранопровода продължават.

- профилактика на възпаление на хранопровода
1 таблетка еднократно дневно
- лечение на симптоми на заболявания на хранопровода
1 таблетка еднократно дневно

Необходими са допълнителни изследвания в случай, че лечение за 4 седмици се окаже недостатъчно. Когато симптомите отслабнат, лечението може да бъде продължено със същата доза, за да се поддържа контрола върху тях.

Възрастните, които приемат Мепрезор само „при нужда“ приемат 1 таблетка също еднократно дневно, когато е необходимо. Не се препоръчва Мепрезор да се приема „при нужда“:

- ако приемате определени лекарства за лечение на болка и ревматизъм
- ако сте изложени на риск да имате язва на стомаха или дванадесетопръстника или
- при деца под 18-годишна възраст



Възрастни:**в) с инфекция с Хеликобактер пилори**

За лечение на язва на дванадесетопръстника и за профилактика на рецидив на язви свързани с тази бактерия: 1 таблетка в комбинация с 1 g амоксицилин и 500 mg кларитромицин двукратно дневно за 7 дни

с) Като допълнение на продължително лечение с определени лекарства за болка и ревматизъм за

- лечение на стомашна язва:
1 таблетка еднократно дневно
Продължителността на лечението е 4-8 седмици.
- профилактика на язви на стомаха и дванадесетопръстника при пациенти изложени на риск:
1 таблетка еднократно дневно

д) със синдрома на Zollinger-Ellison

- Начална доза: 2 таблетки двукратно дневно
- Вашият лекар ще съобрази дозата индивидуално.
Общата дневна доза най-често варира между 4-8 таблетки. Ако общата дневна доза е над 4 таблетки, трябва да ги приемате в 2 отделни дози.
Лечението може да бъде продължено докато е необходимо.

Лица над 65-годишна възраст

Не е необходимо коригиране на дозата.

Нарушена бъбречна функция

Не е необходимо коригиране на дозата. Виж също така точка 2 "Обърнете специално внимание при употребата на Мепрезор".

Нарушена чернодробна функция

В случай че функцията на Вашия черен дроб е тежко нарушена, максималната дневна доза не трябва да надвишава 1 таблетка.


Продължителност на употребата

Ще бъде определена от Вашия лекуващ лекар.

Упътване за употреба

Приемайте таблетките без да ги сдъвквате или чупите, с 1 чаша вода винаги по една и също време на деня.





Ако имате проблеми при преглъщане можете да поставите таблетките в половин чаша вода. Не използвайте газирана вода. Разбърквайте течността докато таблетката се разтвори и се освободят пелетите. След това веднага или в рамките на 15 минути изпийте течността заедно с пелетите. Напълнете отново чашата с вода до половината, разклатете я за да се уверите, че няма остатъци и изпийте цялото количество вода. Не използвайте за тази цел други течности, тъй като обвивката на пелетите може да се разруши.

Пелетите не трябва да се сдъвкват или раздробяват.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мепрезор

Винаги се консултирайте с лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мепрезор може да имате проблеми със стомаха или червата, или да чувствате слабост.

Ако сте пропуснали да приемете Мепрезор

Моля продължете да приемате лекарството както Ви е предписано от Вашия лекар.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Мепрезор

Винаги приемайте предписаната доза толкова дълго, колкото е предписал Вашият лекар.

Прекъсването или спирането на лечението без съвет от страна на Вашия лекар може да намали успеха от Вашето лечение.

Поради това спазвайте инструкциите представени в точка 3.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Мепрезор 40 mg

Винаги приемайте Мепрезор точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Освен ако Вашият лекар не е предписал друго, обичайната доза е:

Възрастни и подрастващи над 12-годишна възраст

а) с оплаквания от страна на хранопровода

- оплаквания от страна на хранопровода с увреждане на тъканите
1 таблетка еднократно дневно за 4 седмици

Препоръчва се продължаване на лечението за допълнителни 4 седмици, ако заболяването на хранопровода не е излекувано или когато оплакванията от страна на хранопровода продължават.

- профилактика на възпаление на хранопровода
½ таблетка еднократно дневно



- лечение на симптоми на заболявания на хранопровода
½ таблетка еднократно дневно

Необходими са допълнителни изследвания в случай че лечение за 4 седмици се окаже недостатъчно. Когато симптомите отшумят, лечението може да бъде продължено със същата доза, за да се поддържа контрола върху тях.

Възрастните, които приемат Мепрезор само „при нужда“ приемат ½ таблетка също еднократно дневно, когато е необходимо. Не се препоръчва Мепрезор да се приема „при нужда“:

- ако приемате определени лекарства за лечение на болка и ревматизъм
- ако сте изложени на риск да имате язва на стомаха или дванадесетопръстника или
- при деца под 18-годишна възраст

Възрастни:

в) с инфекция с Хеликобактер пилори

За лечение на язви на дванадесетопръстника и за профилактика на рецидиви на язви свързани с тази бактерия: ½ таблетка в комбинация с 1 g амоксицилин и 500 mg кларитромицин двукратно дневно за 7 дни

с) Като допълнение на продължително лечение с определени лекарства за болка и ревматизъм за

- лечение на стомашна язва:
½ таблетка еднократно дневно
Продължителността на лечението е 4-8 седмици.
- профилактика на язви на стомаха и дванадесетопръстника при пациенти изложени на риск:
½ таблетка еднократно дневно

д) със синдрома на Zollinger-Ellison

- Начална доза: 1 таблетка двукратно дневно
- Вашият лекар ще съобрази дозата индивидуално.
Общата дневна доза най-често варира между 2-4 таблетки. Ако общата дневна доза е над 2 таблетки, трябва да ги приемате в 2 отделни дози.
Лечението може да бъде продължено докато е необходимо.

Лица над 65-годишна възраст

Не е необходимо коригиране на дозата.

Нарушена бъбречна функция

Не е необходимо коригиране на дозата. Виж също така точка 2 “Обърнете специално внимание при употребата на Мепрезор”.

Нарушена чернодробна функция

В случай че функцията на Вашия черен дроб е тежко нарушена, максималната дневна доза не трябва да надвишава 1/2 таблетка.


Продължителност на употребата

Ще бъде определена от Вашия лекуващ лекар.

Упътване за разделяне на таблетката

Разделете таблетката както е нарисувано на тази фигура






Упътване за употреба



Приемайте таблетките без да ги сдъвквате или чупите, с 1 чаша вода винаги по едно и също време на деня.



Ако имате проблеми при преглъщане можете да поставите таблетките в половин чаша вода. Не използвайте газирана вода. Разбърквайте течността докато таблетката се разтвори и се освободят пелетите. След това веднага или в рамките на 15 минути изпийте течността заедно с пелетите. Напълнете отново чашата с вода до половината, разклатете я за да се уверите, че няма остатъци и изпийте цялото количество вода. Не използвайте за тази цел други течности, тъй като обвивката на пелетите може да се разруши.

Пелетите не трябва да се сдъвкват или чупят.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мепрезор

Винаги се консултирайте с лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Мепрезор

Моля продължете да приемате лекарството както Ви е предписано от Вашия лекар.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Мепрезор

Винаги приемайте предписаната доза толкова дълго, колкото е предписал Вашият лекар.

Прекъсването или спирането на лечението без съвет от страна на Вашия лекар може да намали успеха от Вашето лечение.

По тази причина спазвайте инструкциите представени в точка 3.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Мепрезор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежелани реакции могат да настъпят със следната честота:

Чести, настъпват при 1 до 10 от 100 потребители

- главоболие
- коремна болка
- запек
- диария
- флатуленция
- гадене/повръщане

Нечести, настъпват при 1 до 10 от 1 000 потребители

- натрупване на течност в ръцете или краката
- безсъние
- замаяност
- усещане за изтръпване
- умора
- замаяност
- сухота в устата
- повишени нива на чернодробните ензими
- реакция на възпаление на кожата
- сърбеж
- кожен обрив
- белези, които наподобяват опарване от коприва

Редки, настъпват при 1 до 10 от 10 000 потребители

- понижен брой на някои от белите кръвни клетки (левкопения)
- понижен брой тромбоцити в кръвта
- алергични реакции като треска, оток на тъканите на тялото и алергичен шок
- понижени нива на натрия в кръвта
- възбуда
- състояние на обърканост
- депресия
- неспособност за усещане на вкус
- замъглено зрение
- спазъм на дихателните пътища
- възпаление на устната лигавица
- гъбична инфекция на храносмилателната система
- чернодробно възпаление, със и без жълтеница
- косопад
- повишена фоточувствителност
- ставни и мускулни болки
- неразположение
- изразено потене

Много редки, настъпват при под 1 от 10 000 потребители

- изразено намаляване на броя на определени бели кръвни клетки наречени гранулоцити
- еднакво по степен намаляване на белите и червени кръвни клетки и тромбоцитите
- агресия



- халюцинации
- чернодробна недостатъчност
- определен вид мозъчно увреждане причинено от чернодробно заболяване (енцефалопатия)
- сериозни кожни реакции като
 - тежки кожни и лигавични възпаления
 - тежки, живото-застрашаващи кожни нарушения, които могат да причинят излющване на кожата
- мускулна слабост
- бъбречно възпаление
- уголемяване на гърдите при мъже

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МЕПРЕЗОР

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

Не използвайте Мепрезор след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера или бутилката след "Гоеден до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

За Alu/Alu блистери

Да се съхранява под 25 °С.

За Aclar/Alu блистери

Да се съхранява под 25 °С.

За HDPE бутилки:

Да се съхранява под 25 °С след първоначалното отваряне на бутилката.

Срок на годност след първото отваряне на бутилката: 6 месеца.

Съхранявайте опаковката плътно затворена, за да се предпази от влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Мепрезор

Мепрезор 20 mg

- **Активното вещество е езомепразол.**
Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 20 mg езомепразол (като магнезиев дихидрат).
- Другите съставки са:
 - Сърцевина на таблетката:
захароза, царевично нишесте, течна глюкоза, хидроксипропилцелулоза, повидон, талк, титанов диоксид, съполимер на метакрилова киселина-етилакрилат (1:1), глицерол моностеарат, пропиленгликол, стеаринова киселина, полисорбат 80, симетикон, микрокристална целулоза, макрогол 6000, кросповидон, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат



- Обвивка на таблетката:
хипромелоза, макрогол 6000, титанов диоксид, талк, червен и жълт железен оксид

Мепрезор 40 mg

- **Активното вещество е езомепразол.**
Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 40 mg езомепразол (като магнезиев дихидрат).
- Другите съставки са:
 - Сърцевина на таблетката:
захароза, царевично нишесте, глюкоза течна, хидроксипропилцелулоза, повидон, талк, титанов диоксид, съполимер на метакрилова киселина-етилакрилат (1:1), глицерол моностеарат, пропиленгликол, стеаринова киселина, полисорбат 80, симетикон, микрокристална целулоза, макрогол 6000, кросповидон, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат
 - Обвивка на таблетката:
хипромелоза, макрогол 6000, титанов диоксид, талк, червен железен оксид

Как изглежда Мепрезор и какво съдържа опаковката

Мепрезор 20 mg

Бледо-розови, овални филмирани таблетки

Мепрезор е достъпен в опаковки от блистери със 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 x 1 и 100 стомашно-устойчиви таблетки и в бутилки със 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 и 250 стомашно-устойчиви таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Мепрезор 40 mg

Розови, овални, филмирани таблетки с делителна черта от двете страни. Таблетката може да бъде разделена на равни половини.

Esomeprazole е достъпен в опаковки от блистери със 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 x 1 и 100 стомашно-устойчиви таблетки и в бутилки със 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 и 250 стомашно-устойчиви таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Sandoz d.d.

Verovskova 57,

1000 Ljubljana

Словения

Производители

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Германия

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben



Германия
Място на производство:
Dieselstrasse 5
70839 Gerlingen
Германия

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57,
1526 Ljubljana
Словения

Lek S.A.
Ul. Podlipie 16,
95-010 Strykow
Полша
Място на производство:
Ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
Полша

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните членки на ЕИО под следните имена:

Дания:	Esomeprazol Sandoz
Австрия:	Esomeprazol Sandoz 20 mg – magensaftresistente Tabletten Esomeprazol Sandoz 40 mg – magensaftresistente Tabletten
Чехия:	Esomeprazol Sandoz 20 mg Esomeprazol Sandoz 40 mg
Естония:	NEXMEZOL 20mg NEXMEZOL 40mg
Испания:	Esomeprazol Lek 20 mg comprimidos gastrorresistentes EFG Esomeprazol Lek 40 mg comprimidos gastrorresistentes EFG
Финландия:	Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti Esomeprazol Sandoz 40 mg enterotabletti
Унгария:	Esomeprazol Sandoz 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta Esomeprazol Sandoz 40 mg gyomornedv-ellenálló tabletta
Литва:	NEXMEZOL 20 mg NEXMEZOL 40 mg
Латвия:	NEXMEZOL 20 mg NEXMEZOL 40 mg
Норвегия:	Esomeprazol Sandoz
Полша:	Orkal
Португалия:	Esomeprazol Sandoz
Румъния:	Esomeprazol Sandoz 20 mg comprimate gastrorezistente Esomeprazol Sandoz 40 mg comprimate gastrorezistente
Словения:	Nilar 20 mg gastrorezistentne tablete Nilar 40 mg gastrorezistentne tablete

Дата на последно одобрение на листовката
02/2009



<-----
Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Приложение през стомашна сонда – за лекари:

Ако пациентът не може да гълта, таблетките могат да бъдат разтворени в негазирана вода и да се приложат през стомашна сонда. Важно е да внимателно да се провери дали избраните сонда и спринцовка си съответстват.

Приложение през стомашна сонда

1. Поставете таблетката в подходяща спринцовка и напълнете спринцовката с приблизително 25 ml вода и приблизително 5 ml въздух.
За някои таблетки е необходимо разтваряне в 50 ml вода, за да се предотварит запушването на сондата от пелетите.
2. Веднага разклатете спринцовката за приблизително 2 минути, за да се разтвори таблетката.
3. Задръжте спринцовката с върха нагоре и проверете дали не е запушен.
4. Прикрепете спринцовката към сондата като междуременно задръжате посочената по-горе позиция на спринцовката.
5. Разклатете спринцовката и я поставете с връх насочен надолу. Веднага инжектирайте 5-10 ml в сондата. Обърнете спринцовката след инжектирането и я разклатете. Задръжте върха на спринцовката насочен нагоре, тъй като това ще предотврати запушването.
6. Обърнете спринцовката с върха надолу и незабавно инжектирайте още 5-10 ml в тръбата. Повторете тази процедура докато спринцовката се изпразни.
7. Напълнете спринцовката с 25 ml вода и 5 ml въздух и при необходимост повторете стъпка 5, за да отмиете утайката, която е останала в спринцовката. При някои сонди е необходимо да се приложи 50 ml вода.

