



Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство. Ако не разбираете нещо или имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар. Запазете я, защото може да се наложи да я прочетете отново. Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ MESALAZINUNIPHARM стомашно-устойчиви таблетки

КАКВО СЪДЪРЖА МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ?

СЪСТАВ

Една стомашно-устойчива таблетка МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ съдържа лекарственото вещество mesalazine 250 mg.

Помощни вещества: микрокристална целулоза, царевично нишесте, прежелатинизирано нишесте, колоидален силициев двуокис, талк, магнезиев стеарат, повидон.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Стомашно-устойчиви таблетки.

ОПАКОВКА

Първична

Блистери от PVC/алуминиево фолио с 10 стомашно-устойчиви таблетки.

Вторична

Картонена клиширана кутия с 5 блистерал

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА

УНИФАРМ АД, 1797, София, ул. Тр. Станоев №3

ПРОИЗВОДИТЕЛ

УНИФАРМ АД, 1797, София, ул. Тр. Станоев №3

КАКВО ДЕЙСТВИЕ ПРИТЕЖАВА МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ?

МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ се отнася към лекарства с изразено противовъзпалително действие върху чревната лигавица. Той се използва за лечение на хронични възпалителни заболявания на чревния тракт. Действието му се осъществява предимно локално и влиянието му върху други органи и системи е незначително. Това осигурява добрата му поносимост при продължителното лечение на хронични възпалителни заболявания на червата.



ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ? ПОКАЗАНИЯ

Той е показан за лечение на следните заболявания:: улцерозен колит - лечение и предотвратяване на рецидиви; продължително лечение на хроничен бессимптомен язвен колит;
болест на Крон - лечение и предотвратяване на рецидиви.

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ? ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данни за свръхчувствителност към мезалазин; данни за свръхчувствителност към салицилати (група лекарства, към които се отнася и аспирин); данни за свръхчувствителност към помощните вещества, които се намират в състава на лекарствения продукт; активна язва на стомаха и дванадесетопърстника; стеснение на пилора.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При болни с чернодробни или бъбречни заболявания лекарството може да се употребява само под наблюдение на лекар и след преценката на съотношение полза/риск от него;

При продължително лечение с лекарството се препоръчва периодично /2-4 седмичен интервал/ да се проследяват кръвната картина и функциите на черния дроб и бъбреците;

В началото на лечението с лекарството трябва да се има предвид възможността от влошаване на състоянието. При появя на такива симптоми, като силни коремни болки, кървава диария, кожни обриви и втрисане, е необходима незабавна консултация с лекуващия лекар!

Употреба при бременност и кърмене

*Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете.
Преди да вземате някакво лекарство по време на бременност, непременно се посъветвайте с лекуващия си лекар.*

Не се препоръчва лечение с лекарствения продукт по време на бременност и кърмене поради липса на достатъчно данни за безопасността му върху плода и кърмачето.

Влияние върху активното внимание, способността за шофиране и работа с машини

МЕЗАЛАЗИН не оказва неблагоприятно влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Важна информация за помощните вещества

Няма

КАКВИ ЛЕКАРСТВА МОГАТ ДА ВЗАИМОДЕЙСТВАТ С МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ?

Моля, уведомете лекуващия си лекар за всички лекарства, които вземате в момента или сте вземали доскоро, независимо дали са предписани от лекар или са купени без рецепт.

Това е важно, защото МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ може да промени активността на някои от лекарствата или обратно, някои лекарства могат да променят ефектите му.



При лечение с МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ не трябва се приемат лекарства, които променят киселинността на чревното съдържимо, например лактулоза.

Мезалазин може да засили действието на лекарства, които се използват за лечение на нарушен кръвосъсирване (антикоагуланти). Не приемайте тези лекарства едновременно с МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ без консултация с лекар!

Кортикостероидни препарати (метилпреднизолон, хидрокортизон) могат да повишат честотата на нежеланите реакции от страна на стомашно-чревния тракт при едновременната им употреба с МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ.

Нивото на кръвната захар може да се понижи значително, ако едновременно приемате МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ и перорални противодиабетни лекарства.

Диуретичния ефект на спиронолактон и фуроземид може да се намали при едновременно лечение с МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ.

МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ може да намали терапевтичния ефект на някои противотуберкулозни средства, като например-рифампицин.

Храната може да забави резорбцията на лекарството, в резултат на което да се удължи времето на настъпване на лечебното му действие.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Лекарството се приема през уста 1 час преди хранене с достатъчно количество вода.

Възрастни

За лечение на остръ стадий при възрастни пациенти се препоръчва по 3-4 таблетки 3 пъти дневно в продължение на 6-8 дни перорално. За поддържащо лечение дозите могат да бъдат по 1-2 таблетки 3-4 пъти дневно.

Деца: Не се препоръчва употребата при деца поради недостатъчен клиничен опит при тях.

Ако пропуснете поредната доза МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ?

Ако пропуснете една доза, приемете лекарството колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, приемете я както обикновено. Не използвайте двойна доза за да компенсирате забравената. Продължете да се лекувате с лекарството, както Ви е предписано или указано в тази листовка.

Ако вземете повече таблетки МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ отколкото трябва?

Посъветвайте се незабавно с лекуващия си лекар в този случай!

Случаите на предозиране с МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ са изключително редки.

Ако имате чувство, че ефектът на лекарството е много силен или твърде слаб, моля консултирайте се с лекуващия си лекар.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ, макар и рядко, може да има нежелани ефекти. Те обаче не се наблюдават при всички пациенти, така че Вие можете да не получите никаква реакция.

При поява на нежелани ефекти, включително и такива, които не са споменати в тази листовка, информирайте лекуващия си лекар.

Като правило, при правилна употреба лекарственият продукт се понася добре. В редки случаи са възможни следните нежелани реакции от страна на стомашно-чревния тракт: диария, чувство на дискомфорт в коремната област, гадене, рядко - повръщане. В много редки случаи може да се появят силни коремни болки от спастичен характер, кървава диария, кожни обриви с втискане. В тези случаи е необходима незабавна лекарска консултация.



В отделни случаи са възможни промени в чернодробните показатели, данни за хепатит и панкреатит. Отделни пациенти могат да се оплакват от главоболие и световъртеж. В изключително редки случаи са възможни отделни прояви на свръхчувствителност към лекарствения продукт - кожни обриви, сърбеж, втрисане, бронхоспазъм, увреждане на сърцето и бъбреците. Изключително рядко са възможни мускулни болки, промени в кръвните показатели, синдром, наподобяващ Лупус еритематодес.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

СРОК НА ГОДНОСТ

Лекарственият продукт не трябва да се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Януари, 2006 г.

