

Листовка за пациента

МИКРОЗЕР® 8 mg таблетки
MICROSER® 8 mg tablets
Бетахистин (Betahistine)

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ № 11-4615, 08.04.09
Одобрено: 33 / 11.03.09

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано за Вас. Не го препоръчвайте на други. Може да им навреди, дори ако техните симптоми са подобни на вашите.
- Моля, незабавно уведомете лекаря или фармацевта си, ако забележите нежелани лекарствени реакции или други такива, неупоменати в тази листовка.

В тази листовка:

1. Какво е МИКРОЗЕР и за какво се използва?
2. Преди да вземете МИКРОЗЕР
3. Как да взимате МИКРОЗЕР
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате МИКРОЗЕР
6. Допълнителна информация

1. КАКВО Е МИКРОЗЕР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

МИКРОЗЕР се прилага за симптоматично лечение на патологични състояния, дължащи се на микро-циркулаторен дефицит в лабиринта; световъртеж; Мениеров синдром и сродни състояния, свързани със световъртеж.

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ МИКРОЗЕР

Не взимайте МИКРОЗЕР, ако:

- Сте алергични (свръхчувствителни) към бетахистинов дихидрохлорид (betahistine didihydrochloride) или към някое от помощните вещества на МИКРОЗЕР;
- Ако имате язва на стомаха в активна фаза;
- Ако имате тумор на кората на надбъбрека;
- Ако приемате други антихистамини;
- При бременност.

При приемане на МИКРОЗЕР обърнете внимание

- Ако в миналото сте имали язва на стомаха, с оглед да се избегне влошаване на патологията
- Ако страдате от бронхиална астма

Приемане на други лекарства

Моля уведомете лекаря си, ако взимате или наскоро сте взимали други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание.



Вземайте МИКРОЗЕР по време на хранене или с напитка

Не употребявайте алкохол, ако забележите появата на нежелани лекарствени реакции вследствие приема на лекарството.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с лекар преди да започнете лечение с МИКРОЗЕР или с друго лекарство.

При бременни жени лекарството да се прилага само в случай на крайна нужда и под пряко лекарско наблюдение.

Ако кърмите, потърсете съвет от лекар преди да вземете МИКРОЗЕР.

Влияние върху способността за шофиране и работата с машини

Ако при прием на лекарството почувствате сънливост не бива да шофирате или работите с машини.

3. КАК ДА ВЗИМАТЕ МИКРОЗЕР

Винаги взимайте МИКРОЗЕР според предписанието на лекаря. Ако имате съмнение, допитайте се до лекар или фармацевт.

Обичайната дозировка е по 1 таблетка 2 – 4 пъти дневно, за предпочитане по време на хранене

Деца: МИКРОЗЕР не е показан за деца.

Ако сте приели повече от необходимото количество МИКРОЗЕР трябва

Да се свържете с Вашия лекар или с център за спешна медицинска помощ. Вземете МИКРОЗЕР с Вас.

Ако сте забравили да вземете МИКРОЗЕР

Вземете лекарството веднага след като се сетите. Въпреки това, ако периода до следващия прием е не повече от 8 часа, то не приемайте пропуснатата доза, а вземете следващата на време. Не взимайте двойна доза за сметка на пропуснатата.

Не прекъсвайте лечението с МИКРОЗЕР без да се консултирате с лекар, дори ако се почувствате по-добре или пък смятате, че таблетките не действат.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, така и МИКРОЗЕР може да причини нежелани лекарствени реакции, макар и не при всеки.

Понякога може да се проявят гадене, главоболие, прояви на идиосинкразия (свръхчувствителност към лекарства).

Умоляват се пациентите да съобщават на лекаря, ако се прояви някоя от нежеланите лекарствени реакции или други такива, неупоменати в тази листовка.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МИКРОЗЕР

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



Не използвайте МИКРОЗЕР след срока на годност, означен на етикета и кутията. Срока на годност се отнася до края на отбелязания месец.

Лекарствените продукти не трябва да се изхвърлят с отпадните води или с битовите отпадъци. Попитайте лекар къде да изхвърлите продукт, който вече не е необходим. Тези предпазни мерки ще помогнат да съхраним околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа МИКРОЗЕР

МИКРОЗЕР 8 mg таблетки:

- Всяка таблетка съдържа активно вещество бетахистинов дихидрохлорид (betahistine didihydrochloride) 8 mg
- Помощни вещества: микрокристална целулоза, манитол, силициев двуокис, талк, лимонена киселина.

Лекарствена форма и опаковка на МИКРОЗЕР

МИКРОЗЕР 8 mg са бели или почти бели кръгли таблетки с μ 1 лого.

МИКРОЗЕР 8 mg таблетки са опаковани в блистер по 10 таблетки, по 5 блистера в кутия.

Притежател на разрешението за употреба

PRODOTTI FORMENTI S.r.l., Via R. Koch $\frac{1}{2}$, 20152 Милано (Италия)

Производител

Farmaceutici Formenti S.p.A.

Завод – производител: Origgio (VA) – Via Di Vittorio 2 – Италия

Дата на последна редакция на текста

Март 2009 г.

