

**Уважаеми пациенти,**  
**Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за  
Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обрънете се към  
Вашия лекуващ лекар или фармацевт.**

**Наименование на лекарствения продукт:**

**Nasan®**  
/Назан®/

**ИАЛ  
ОДОБРЕНО!**  
ДАТА 09.05.06г-

**Кое е активното вещество?**

1 ml разтвор съдържа 0,5 mg xylometazoline hydrochloride.

**Какво друго съдържа Nasan® капки за нос?**

Бензалкониев хлорид, натриев хлорид, натриев дихидрогенфосфат, натриев едетат, натриев хидроокис, повидон K12 PF, вода за инжекции.

**Лекарствена форма и опаковка:**

Оригинална опаковка, съдържаща 10 ml капки за нос, разтвор.

**Кой е отговорен за продажбата на Nasan® капки за нос?**

Hexal AG  
Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Germany  
Tel.: 0 8024/908-0, Telefax: 08024/908-1290  
E-mail: [patientenservise@hexal.de](mailto:patientenservise@hexal.de)

**Кой е отговорен за производството на Nasan® капки за нос?**

Salutas Pharma GmbH  
Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Germany

**Какво представлява Nasan® капки за нос?**

Nasan® капки за нос има съдосвиващо действие и предизвиква отбъване (намаляване на отока) на лигавицата на носа.

**За какво се използва Nasan® капки за нос?**

Продуктът се прилага за отбъване на носната лигавица при остръ ринит, пристъпен вазомоторен ринит и краткотрайно подпомагащо лечение на алергичен ринит.

При хроничен ринит Nasan® капки за нос може да се прилага само по лекарско предписание поради риск от атрофия на носната лигавица. Nasan® капки за нос се прилага при деца между 2 и 6 години.

**Кога не трябва да приемате Nasan® капки за нос?**

Nasan® капки за нос не трябва да се прилага при:

- свръхчувствителност към ксилометазолин или към някоя от другите съставки на продукта
- сухо възпаление на лигавицата на носа с образуване на коричка (сух ринит)
- новородени и деца до 2 год



Поради съдържанието на консерванта бензалкониев хлорид, Nasan® капки за нос не трябва да се прилага при известна свръхчувствителност към тази субстанция.

**В какви случаи можете да използвате Nasan® капки за нос само след консултация с лекар?**

При определени състояния или необходимост от специални грижи, трябва да прилагате Nasan® капки за нос само след консултация с Вашия лекар. Това се отнася и за случаите, когато сте имали тези състояния и преди.

Nasan® капки за нос трябва да се прилага само след внимателна оценка на съотношението полза/риск при:

- пациенти, които се лекуват с моноамино-оксидазни инхибитори (МАО-инхибитори – продукти, прилагани при депресия) или други лекарствени продукти, които могат да повишат кръвното налягане
- повищено вътречно налягане, особено теснотъгълна глаукома
- тежки сърдечно-съдови заболявания (коронарна болест на сърцето, високо кръвно налягане)
- медулоадренален тумор (феохромоцитом – тумор на надбъбречната жлеза)
- метаболитни нарушения (хипертиреоидизъм - повищена функция на щитовидната жлеза, диабет)

**Какви специални предпазни мерки трябва да се вземат?**

Продължителното приложение на продукти за простудни заболявания, предизвикващи отбъбване на лигавицата, може да доведе до хроничен оток и атрофия на лигавицата на носа.

Пациенти с глаукома, особено теснотъгълна глаукома, трябва да се консултират с лекуващия си лекар преди приложение на Nasan® капки за нос.

Поради съдържанието на консерванта бензалкониев хлорид в Nasan® капки за нос, при продължителна употреба е възможно увреждане на лигавицата на носа (понижена функция на ресничестия епител). В отделни случаи тя не отшумява и може да доведе до блокиране функцията на ресничестия епител.

**Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Nasan® капки за нос или могат да бъдат повлияни от продукта?**

При едновременно приложение на Nasan® капки за нос и някои продукти, прилагани при депресия (МАО-инхибитори от транилципроминов тип или трициклични антидепресанти), е възможно повишаване на кръвното налягане, поради сърдечно-съдовите ефекти на тези субстанции.

Моля, обрнете внимание, че тази информация може да се отнася също и за наскоро приети лекарствени продукти.

**С какво трябва да се съобразяват децата и възрастните при приложение на Nasan® капки за нос?**

Продължителното приложение и предозиране трябва да се избягва, особено при деца. Приложение на по-високи дози при деца от 2-6 год. се разрешава само под лекарско наблюдение.

**Какви специални предпазни мерки трябва да се вземат при бременност и кърмене?**



Nasan® капки за нос не трябва да се прилага по време на бременност, тъй като няма достатъчно данни за ефектите на продукта върху плода.

Приложението по време на кърмене трябва да се избягва, тъй като не е известно дали активната субстанция преминава в майчиното мляко.

**С какво да се съобразявате при шофиране, при работа с машини или в несигурно положение (напр. изкачване по стълби)?**

При продължителна употреба или при приложение на по-високи дози от Nasan® капки за нос не могат да бъдат изключени ефекти върху сърдечно-съдовата или централната нервна система. В тези случаи е възможно да се наруши способността за шофиране или работа с машини. Моля, обърнете внимание, че алкохолът може допълнително да влоши способността Ви за шофиране!

**Дозировка, начин и продължителност на приложение:**

Ако няма друго предписание на Nasan® капки за нос от Вашия лекар, се препоръчва следната дозировка. Моля, придържайте се към указанията за употреба, тъй като в противен случай Nasan® капки за нос няма да действа правилно. Моля, не надвишавайте препоръчителната дозировка на лекарствения продукт!

**В каква доза и колко често можете да приемате Nasan® капки за нос?**

Ако не е предписано друго от лекуващия лекар, при деца между 2 и 6 год. се поставят 1-2 капки Nasan® капки за нос във всяка ноздра до 3 пъти дневно.

**Колко дълго можете да прилагате Nasan® капки за нос?**

Nasan® капки за нос не трябва да се прилага повече от 5 дни. Лечението може да се продължи отново след прекъсване от няколко дни.

За продължителността на приложение при деца винаги трябва да се консултирате с лекуващия лекар.

Nasan® капки за нос може да се прилага при хронични ринити само под лекарско наблюдение, поради риск от атрофия на лигавицата на носа.

**Какво трябва да предприемете, ако Nasan® капки за нос е бил приет в много големи количества (преднамерено или неумишлено предозиране)?**

Възможни са следните симптоми при предозиране или неумишлен прием през устата: разширени зеници (мидриаза), гадене, повръщане, посиняване на устните (цианоза), повищена температура, гърчове, сърдечно-съдови нарушения (учестена сърдечна дейност, сърдечна аритмия, циркулаторен колапс, сърдечен блок, повищено кръвно налягане), белодробни нарушения (белодробен оток, диспнея – нарушен дишане) и психиатрични нарушения.

Възможно е да се наблюдават сънливост, понижена телесна температура, забавен пулс, спад в кръвното налягане, подобен при шок, затруднено дишане и кома.

Терапевтичните мерки включват приложение на активен въглен, stomашна промивка или обдишване с кислород. Ако е необходимо, високото кръвно налягане, повишената температура и гърчовете се лекуват.

**Какво трябва да направите, ако сте приемали по-малко от предписаната доза Nasan® капки за нос или сте пропуснали приема на продукт?**

Не приемайте двойна доза на следващия прием на продукта приложението, както е описано в указанията за дозиране.



## **Какви нежелани реакции може да предизвика приложението на Nasan® капки за нос?**

Определянето на нежеланите лекарствени реакции е въз основа на следната честота:

Много чести: повече от 1 от 10 лекувани пациента

Чести: по-малко от 1 от 10 и повече от 1 от 100 лекувани пациента

Не чести: по-малко от 1 от 100 и повече от 1 от 1000 лекувани пациента

Редки: по-малко от 1 от 1000 и повече от 1 от 10000 лекувани пациента

Много редки: по-малко от 1 от 10000 лекувани пациента, вкл. отделни случаи

### **Дихателна система**

Особено при чувствителни пациенти Nasan® капки за нос може да предизвика леко преходно раздразване (усещане за парене или сухота на носната лигавица).

След отшумяване на симптомите, обикновено се наблюдава зачервяване на лигавицата (реактивна хиперемия).

Продължителното или често приложение, както и по-високи дози от Nasan® капки за нос, могат да предизвикат раздразване (усещане за парене или сухота на носната лигавица) и увеличаване на отока на лигавицата, които се влошават при повишена употреба на лекарствения продукт (медикаментозен ринит).

Този ефект е възможно да се появи след 5 дни лечение и при продължителна употреба да предизвика постоянно увреждане на лигавицата с образуване на коричка (rhinitis sicca).

### **Сърдечно-съдова система**

Не често се наблюдават повищено кръвно налягане, сърцевиене и ускорен пулс.

### **Нервна система**

Рядко се наблюдава главоболие, безсъние или умора.

## **Какви мерки трябва да бъдат взети във връзка с нежеланите лекарствени реакции?**

Ако наблюдавате нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, за да предприеме необходимите мерки.

### **Инструкции за съхранение:**

Срокът на годност на лекарството е напечатан върху опаковката.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

### **Дата на последната редакция на листовката:**

Март 2004

