

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Пазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Запомнете – това лекарство е изписано само за Вас!

В тази листовка:

1. Какво представлява Небиволол-Чайкафарма и за какво се използва
2. Преди да приемете Небиволол-Чайкафарма
3. Как да приемате Небиволол-Чайкафарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Небиволол-Чайкафарма
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕБИВОЛОЛ-ЧАЙКАФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Името на Вашето лекарство е Nebivolol-Tchaikapharma (Небиволол -Чайкафарма) необвити таблетки, активната съставка е nebivolol hydrochloride (небиволол хидрохлорид). Във всяка таблетка се съдържат 5 mg небиволол хидрохлорид.

Небиволол-Чайкафарма е антихипертензивно лекарство (β -рецепторен блокер). Използва се за:

- лечение на есенциална хипертония;
- лечение на лека до умерена хронична сърдечна недостатъчност в допълнение към основното лечение, при пациенти над 70 години.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ НЕБИВОЛОЛ-ЧАЙКАФАРМА

Не приемайте Небиволол-Чайкафарма:

- ако сте алергични към небиволол хидрохлорид или към някое от веществата, влизащи в състава на таблетките (виж т.б „Допълнителна информация“);
- ако имате нарушена чернодробна функция;
- ако сте бременна или кърмите;



- ниско кръвно налягане, нарущено кръвоснабдяване на ръцете и краката, много ниска сърдечна честота (по-малко от 60 удара в минута) или някои други сърдечни заболявания;
- сърдечна недостатъчност, която се е проявила наскоро или се е влошила, в случай, че Ви прилагат венозни лекарства (венозна ‘система’) за подобреие на работата на сърцето;
- астма или затруднено дишане (в момента или в миналото);
- при нелекуван тумор на надбъречната жлеза (феохромоцитом);
- метаболитно нарушение (метаболитна ацидоза), напр. диабетна кетоацидоза;

Небиволол не трябва да се приема от деца и юноши!

Обърнете специално внимание при употребата на Небиволол-Чайкафарма

Преди да започнете да взимате таблетките, кажете на Вашия лекар ако сте бременна, опитвате се да забременеете или кърмите.

Консултирайте се с Вашият лекар ако:

- имате силно забавен пулс (сърдечна честота под 50-55 удара/минута в покой и/или симптоми като световъртеж, слабост, нестабилна походка);
- имате сърдечно заболяване: например ангина (болки в гърдите) или други сърдечни проблеми;
- имате тежки нарушения в кръвоснабдяването на ръцете и краката, напр. болест или синдром на Рейно, крампи и болки при ходене;
- имате продължителни проблеми с дишането;
- имате захарен диабет: Небиволол не повлиява нивото на кръвната захар, но може да маскира симптомите на понижена кръвна захар (като неспокойствие, треперене, учестен пулс); изпотяването обаче, което може да е признак на ниска кръвна захар, ще се запази;
- имате повищена функция на щитовидната жлеза: Небиволол може да маскира симптома учестен пулс (тахикардия);
- имате алергии: реакцията към полени или други вещества може да се усили;
- имате псориазис: Небиволол трябва да се прилага само след внимателна преценка на съотношението полза/рисък.

Вашият лекар ще реши дали да взимате това лекарство и дали трябва да промени дозата.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако сте информирани от лекар, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар преди започване на лечение с този лекарствен продукт.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт. Това се отнася най-вече за следните лекарствени продукти:

- лекарства, известни като калциеви антагонисти, понижаващи високото кръвно налягане или други сърдечни проблеми, като верапамил, дилтиазем, амлодипин, фелодипин, ласидипин, нифедипин, никардипин, нимодипин, нитрендипин, както и други лекарства, понижаващи високото кръвно налягане като клонидин, гуанфацин, моксонидин, метилдопа, рилменидин;
- По време на лечение с Небиволол-Чайкафарма, не трябва да се прилагат идентично верапамил;
- лекарства за сърдечни аритмии (ритъмно-проводни нарушения като квинидин, хидроквинидин, амиодарон, цибензолин, флекаинид, дизолидрамин, нидекайн, мексилетин, пропафенон;



- лекарства за тревожност, напр. баритурати, фенотиазин;
- лекарства за депресия, напр. амитриптилин, тразодон, пароксетин, флуоксетин, тиоридазин;
- лекарства за астма, запущен нос или някои проблеми с очите, като глаукома (повишено въгледочно налягане) или разширяване на зеницата;
- анестетици: винаги преди анестезия информирайте анестезиолога, че приемате nebivolol;
- лекарства за повищена киселинност в стомаха (напр. циметидин) – трябва да приемате nebivolol по време на хранене, а антиацидът – между отделните хранения;
- дексстрометорфан (в някои лекарствата против кашлица)

Употреба на Небиволол-Чайкафарма с храни и напитки

Таблетките могат да се приемат по време на хранене. Препоръчително е предписаната дневна доза да се приема винаги по едно и също време на деня. Таблетката се приема с достатъчно количество течност (напр. 1 чаша вода).

Бременност и кърмене

Небиволол-Чайкафарма не трябва да се приема по време на бременност и кърмене.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство по време на бременност или кърмене!

Шофиране и работа с машини

При шофиране и работа с машини трябва да се има предвид, че в редки случаи могат да възникнат световъртеж и отпадналост. В такива случаи, не шофирайте и не използвайте машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НЕБИВОЛОЛ-ЧАЙКАФАРМА

Винаги приемайте Небиволол-Чайкафарма точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Високо кръвно налягане (хипертония)

Обичайната доза за възрастни пациенти е 1 таблетка (5 mg небиволол) дневно. Понижаващият кръвното налягане ефект се наблюдава след 1-2 седмици. В някои случаи оптималното действие се постига след 4 седмици.

Препоръчителната начална доза при пациенти с нарушена бъбречна функция и при пациенти над 65 години е ½ таблетка (2.5 mg небиволол) дневно.

Хронична сърдечна недостатъчност

Лечението с Небиволол трябва да започне с постепенно увеличение, като в зависимост от поносимостта, ниската доза от 2.5 mg един път дневно може да се увеличава през 14 дни с по 2.5 mg небиволол до дози от 10 mg небиволол един път дневно, докато се постигне подходящата за Вас доза.

Максималната препоръчителна доза е 10 mg еднократно дневно (2 таблетки).



При приложение на първата доза Небиволол, както и при повишение на дозата може да се наблюдава рязко спадане на артериалното налягане. Поради това тези пациенти трябва да са подложени под строг медицински контрол около 2 часа след приложението на първата доза Небиволол, както и при увеличаване на дозата, за да се избегне проявата на рязко спадане на кръвното налягане.

Продължителността на лечението се определя от Вашия лекар. Лечението на високото кръвно налягане може да продължи цял живот, а понижаващият кръвното налягане ефект се запазва при продължително лечение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Небиволол-Чайкафарма

Ако Вие или някой друг сте приели повече от необходимата доза таблетки независимо уведомете Вашия лекар или фармацевт!

Ако сте пропуснали да приемете Небиволол-Чайкафарма

Ако се забравите да приемете обичайната си доза, но се сетите малко след това, приемете таблетката както обикновено. В случай, че е минал дълъг период от време (например цял ден) изчакайте времето за следващия прием. **Не приемайте допълнителна доза, за да наваксате пропуснатата!**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Небиволол-Чайкафарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

При правилна употреба, нежеланите лекарствени реакции при приложение на Небиволол-Чайкафарма са леки до умерени и се проявяват рядко.

Най-общо при приложение за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) могат да се наблюдават следните нежелани лекарствени реакции (при по-малко от 1 на 100 пациента и повече от 1 на 1000 лекувани с този лекарствен продукт): главоболие, световъртеж, обрив или сърбеж, задух, запек, гадене, диария, отпадналост, подуване на ръцете или краката, болки или крампи при ходене, нарушено зрение, импотенция, забавена сърдечна честота или други сърдечни оплаквания, затруднено прегълъщане, стягане в гърлото, кошмари.

В клинични проучвания за хронична сърдечна недостатъчност са наблюдавани следните нежелани лекарствени реакции: забавена сърдечна честота, замаяност, влошаване на сърдечната недостатъчност, ниско кръвно налягане (чувство на замаяност при рязко изправяне), непоносимост към лекарството, неправилен сърдечен ритъм, оток (напр. отекли глезени).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА НЕБИВОЛОЛ-ЧАЙКАФАРМА



Няма специални условия за съхранение.

Както всички лекарства, таблетките Небиволол-Чайкафарма трябва да се пазят на място, далеч от погледа и достъпа на деца.

Не употребявайте таблетките след изтичане на срока на годност, обозначен върху външната опаковка.

Винаги връщайте неизползваните таблетки на Вашия фармацевт, освен ако Вашия лекар не е казал нещо друго.

Не използвайте Небиволол-Чайкафарма ако забележите видими промени в таблетките.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Небиволол-Чайкафарма

- Активната съставка е небиволол хидрохлорид
- Помощните вещества, които участват в изграждането на таблетката са: хипромелоза, лактозаmonoхидрат, царевично нишесте, натриева кроскармелоза, микрокристална целулоза, колоиден силициев диоксид и магнезиев стеарат.

Как изглежда Небиволол-Чайкафарма и какво съдържа опаковката

Всяка картонена кутия Небиволол-Чайкафарма необвити таблетки съдържа 3 блистера с 10 бели до светлокремави, овални, със заоблени ръбове, двойно изпъкнали необвити таблетки с делителна черта.

Притежател на разрешението за употреба:

“Чайка фарма – висококачествените лекарства” АД
гр. Варна 9000, “Н.Й.Вапцаров” № 1, България

Производител:

“Чайка фарма – висококачествените лекарства” АД
гр. Пловдив 4000, бул.“Санкт Петербург” № 53, България

Срок на годност

Не използвайте след срока отбелязан върху опаковката.

Дата на последно одобрение на листовката

Март 2007

