

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 28.11.2005

Моля внимателно да прочетете тази листовка, преди да приемате това лекарство. Листовката съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка, тъй като може пак да се наложи да я прочетете.

Ако след прочитането все още имате въпроси, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Neo - angin ®

Нео – ангин ®

Състав:

Една таблетка за смучене от лекарствения продукт съдържа:

2,4 – dichlorobenzyl alcohol	1.2 mg.
amylmetacresol	0.6 mg.
levomenthol	5.9 mg.

Помощни вещества:

Масло от звездовиден анисон, ментово масло, захароза, глюкозен сироп, винена киселина, оцветител Е124.

Данни за опаковката:

Първична опаковка – блистери от поливинил хлорид /алуминий

Вторична опаковка – картонена кутия, съдържаща 24 таблетки за смучене.

Показания:

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

Противопоказания:

Кога не трябва да употребявате Нео – ангин ?

При свръхчувствителност към някои от съставките на лекарствения продукт.



Пациенти с вродена непоносимост към фруктоза, страдащи от рядка глюкозо-галактозна малоабсорбция или захарно-изомалтазен дефицит не трябва да приемат този продукт.

Какво трябва да знаете ако сте бременна или кърмачка?

За *Neo – ангин* няма клинични данни за влияние при бременност и кърмене и затова този продукт трябва да се приема с внимание от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно изцяло да се изключи риска за зародиша, ето защо ако сте бременна, моля консултирайте се с лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

Предупреждения:

В случай, че симптомите продължават или състоянието се влоши консултирайте се с лекар.

Този лекарствен продукт съдържа оцветителя Е124, който може да причини алергичен тип реакции, включително астма. Реакциите на свърхчувствителност от оцветителя са по-чести при наличието на свърхчувствителност към ацетилсалицилова киселина.

Този лекарствен продукт съдържа 1,1 г. глюкоза във всяка таблетка. Този факт трябва да се взима под внимание при пациенти с диабет - всяка таблетка има захарно съдържание 0.22 хлебни единици. Глюкозата може да увреди зъбите.


Лекарствения продукт не е подходящ за приложение при деца под 6 годишна възраст.

Прилагането на лекарствения продукт при малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.

Този лекарствен продукт съдържа 1422.70 g захароза. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя до 1422.70 g захароза

Лекарствени взаимодействия:

Няма известни при перорален прием на този лекарствен продукт.



Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Инструкциите, дадени по-долу, се прилагат, ако лекарят не е предписал друго. Моля, съблюдавайте тези инструкции, за да бъде лечението Ви с ефективно и безвредно.

По колко и колко често трябва да приемате Heo – ангин ?

За възрастни и деца над 6 годишна възраст препарата се прилага по 1 таблетка за смучене за бавно разтваряне в устата на всеки 2-3 часа.

Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене. При възникване на проблеми консултирайте се с лекар.

Нежелани лекарствени реакции:

Рядко са възниквали нежелани реакции, независимо от широкото прилагане на този лекарствен продукт. Наблюдавани са само възпаление на оралната и стомашна мукоза. Все пак е възможно проява на алергични реакции.

Срок на годност:

Срокът на годност е 5 години и е означен върху кутията и блистера.

Да не се използва след тази дата!

Как трябва да се съхранява Heo – ангин ®?

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Да се съхранява при температура не надвишаваща 25° C.

Притежател на разрешението за употреба:

Divapharma – Knufinke Arzneimittelwerk GmbH

Motzener Strasse 41


D-12277 Berlin, Germany

Производител на лекарствения продукт:

Divapharma – Knufinke Arzneimittelwerk GmbH

Motzener Strasse 41

D-12277 Berlin, Germany



Последна редакция на информацията: Ноември 2005 г.

Рег. № 20000740 / 12.12.2000 год.

