

Листовка за пациента

NIX™
НИКС™

permethrin

Тази листовка се отнася само за NIX. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете употребата на лекарството. Тя ви информира за най-важното относно NIX.
За повече информация или съвет се обърнете към лекар или фармацевт!

ИАГ
ОДОБРЕ
ДАТА 19.12.2006

Наименование на лекарствения продукт

Името на лекарството е NIX.

Какво представлява и какво съдържа NIX

NIX е под формата на дермална емулсия. Предлага се в картонена кутия, съдържаща бутилка от полиетилен с ниска плътност, снабдена с накрайник и полипропиленова капачка.

Активната съставка в NIX е permethrin (перметрин). Една опаковка NIX съдържа 59 ml permethrin 1% w/w в 20% w/w изопропанол. NIX съдържа и следните помощни вещества: стеаралкониев хлорид, хидролизиран животински протеин, цетет-10, лимонена киселина, пропиленгликол, цетилов алкохол, хидроксиетицелулоза, канадски балсам, есенция 06.070, сънсет жълто и консерванти - метилпараходроксибензоат и пропилпараходроксибензоат.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за продажбата му в България

NIX се произвежда от GlaxoWellcome GmbH & Co, Industriestrasse 32-36, Bad Oldesloe, Germany. Притежател на разрешението за употребата му е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK, представяван в България от ГлаксоСмитКлейн ЕООД с адрес: София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, блок 10.

Как действа лекарството

NIX принадлежи към групата лекарства, наречени пиретроиди и е инсектицидно средство, активно срещу главовата въшка и гнидите ѝ. В повечето случаи еднократното третиране е достатъчно за изчистване от главови въшки и в 97-99 % от случаите осигурява защита срещу тях в продължение на 2 седмици. Остатъчна активност може да се наблюдава до 6 седмици след лечението.

За какво се използва NIX

NIX се използва за лечение при опаразитяване с главова въшка.

NIX може да се прилага и за профилактика при изложените на рисък от опаразитяване с главова въшка.

NIX е най-подходящ за лечение на възрастни и деца над 6 месеца.

Деца под 6-месечна възраст се лекуват след консултация с лекар.

Какво трябва да имате предвид преди да започнете да прилагате NIX

NIX е предназначен само за външна употреба и трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца.

NIX е противопоказан при лица с алергия към активното вещество, останалите съставки на продукта или към други лекарства от групата на пиретроидите и пиретрините.

NIX не дразни очите, но ако случайно попадне там, незабавно ги изплакнете обилно с вода.

На медицинските сестри, които в практиката си ежедневно работят с NIX, се препоръчва да използват защитни ръкавици, за да се избегне възможното дразнене на кожата на ръцете.

Лекарството съдържа като помощни вещества метилпараходроксибензоат и пропилпараходроксибензоат, за които е известно че могат да причинят уртикария. Обикновено това са забавен тип реакции, напр. контактен дерматит. Рядко предизвикват реакции на чувствителност от бърз тип с уртикария и бронхоспазъм.



Ако сте бременна или кърмите

Няма специфична информация за употребата на NIX по време на бременност. Има ограничени данни за приложението на съдържащи permethrin инсектицидни продукти по време на бременността, съгласно които няма риск за плода.

Как се прилага NIX

Една бутилка NIX е достатъчна за намазването на нормално гъста коса с дължина до рамената. При необходимост използвайте по-голямо количество от продукта. Максималната доза не е определена, но се счита, че за един курс на лечение са необходими не повече от две бутилки.

- ◆ NIX се прилага след измиване на косата с подходящ мек шампоан и подсушаването ѝ с хавлиена кърпа.
- ◆ Разклатете енергично бутилката и нанесете необходимото количество NIX върху косата и кожата до цялостното им намазване. Повече внимание обрнете на участъците около ушите и задната част на врата.
- ◆ Оставете NIX да действа около 10 минути, след което изплакнете косата обилно с вода.
Подсушете отново косата с хавлиена кърпа.

При повечето пациенти еднократното прилагане на продукта е достатъчно за пълно обезпаразитяване, но при нелекувани случаи с масивно опаразитяване е възможно, макар и рядко, около седмия ден от лечението все още да се откриват живи въшки или гниди. Това налага повторно лечение.

Не е необходимо специално премахване на мъртвите гниди, освен по козметични съображения. За целта използвайте гъстия гребен, който ще намерите в опаковката.

Ако вече сте излекувани, но продължавате да бъдете в контакт с други опаразитени, прилагайте NIX един път седмично в продължение на 8 седмици.

По време на епидемия от главови въшки можете да използвате NIX по описания по-горе начин веднъж седмично (максимално до 8 седмици) за профилактика или предпазване от повторно опаразитяване.

Какво да направите в случай, че приложите повече от предписаното или погълнете част от продукта

Няма съобщения за предозиране с NIX. Въз основа на проучванията при животни и хора доброволци малко вероятно е да се достигне количеството permethrin, необходимо за предизвикване на клинично значими токсични реакции, дори при погрешна или прекомерна употреба. Най-вероятните симптоми и признания са реакции на свръхчувствителност.

На теория е възможно при погълтане от малко дете да настъпи алкохолно отравяне, дължащо се на съдържащия се в NIX изопропанол. Ако това се случи потърсете незабавно съвета на лекар.

Причинява ли NIX нежелани лекарствени реакции

NIX, подобно на всяко друго лекарство, може да причини нежелани лекарствени реакции. Този продукт обикновено се понася добре и рядко води до кожни реакции. При малък брой хора се съобщава за зачеряване на кожата, обрив и/или раздразване на кожата на главата (описвано като парене или щипане) след лечение с NIX, но тъй като опаразитяването с главова въшка често пъти се съпровожда с раздразване на кожата на главата, в повечето случаи е трудно да се определи причината.

Когато се наблюдава по-тежко изразено или по-продължително дразнене на кожата или настъпят други нежелани реакции, свързани с лечението с NIX, е необходима консултация с лекар.

Как се съхранява лекарството

Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте на сухо място, при температура под 25°C.

Да се пази от светлина.

Не прилагайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.



Тази листовка не ви дава пълна информация за лекарството. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте лекар или фармацевт.

Може да ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте докато не употребите лекарството в опаковката.

Дата на последна редакция: Октомври 2006

