

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Nolvadex® 10 mg film-coated tablets
Нолвадекс 10 mg филмирани таблетки

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
дата: R-7750/22.10.08

Прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да вземате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Тя може да Ви потрябва отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля попитайте лекуващия си лекар или фармацевта.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и Вие не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори и ако симптомите им са същите като Вашите.

В тази листовка

1. Какво представлява Нолвадекс и за какво се използва?
2. Преди да вземете Нолвадекс
3. Как да вземате Нолвадекс
4. Възможни нежелани ефекти
5. Съхранение на Нолвадекс
6. Допълнителна информация

Лекарственото вещество е tamoxifen (тамоксифен).

Помощните вещества са:

Кроскармелоза натрий USNF

Желатин Ph. Eur.

Лактоза Ph. Eur.

Макрогол 300 ВР

Магнезиев стеарат Ph. Eur.

Царевично нишесте Ph. Eur.

Метилхидроксипропил целулоза Ph. Eur.

Титанов диоксид Ph. Eur. (E171).

Притежател на разрешението за употреба:


AstraZeneca UK Ltd., 600 Capability Green, Luton LU1 3LU, Bedfordshire,
Великобритания

Производител:

AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA,
Великобритания и Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn Strasse, 68723 Plankstadt,
Германия.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НОЛВАДЕКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Всяка таблетка Нолвадекс съдържа 10mg tamoxifen.



Нолвадекс се използва за лечение на карцином на гърдата.

Нолвадекс се продава в опаковки по 30 или 50 таблетки.

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ НОЛВАДЕКС

Не вземайте Нолвадекс

- Ако някога сте имали алергична реакция към Нолвадекс или към някоя от съставките му.
- Ако сте бременна или се опитвате да забременеете

Нолвадекс не трябва да се дава на деца.

Обърнете специално внимание

- Ако вземате мерки за контрацепция трябва да знаете, че някои контрацептиви се повлияват от Нолвадекс. Моля да се свържете с Вашия лекар.
- Ако имате необичайно вагинално кървене или други гинекологични симптоми (като тазови болки или напрежение) докато вземате Нолвадекс или известно време след това. Това е защото настъпват редица промени в ендометриума, някои от тях могат да бъдат сериозни, дори рак.
- ако постъпите в болница, уведомете медицинския персонал, че вземате Нолвадекс.

Бременност и кърмене

Нолвадекс не трябва да се приема от пациентки, които са бременни или кърмят. Вие не трябва да забременявате по време на лечението с Нолвадекс.


Шофиране и работа с машини

Нолвадекс таблетки е малко вероятно да повлияят способността Ви да шофирате или да работите с машини.

Вземане на други лекарства

Кажете на лекуващия си лекар или фармацевта ако вземате или се каните да спирате приема на някакви други лекарства, включително тези, които може да сте си купили сами. В частност, Вие трябва да уведомите Вашия лекар, ако приемате анти-коагуланти като варфарин (за предотвратяване на съсиреци) и лекарство наречено рифампицин (за туберкулоза). Нолвадекс не трябва да се приема заедно с лекарства, наречени ароматазни инхибитори, като анастрозол, летрозол или екземестан (всички са за лечение на рак на гърдата).

3. КАК ДА ВЗЕМАТЕ НОЛВАДЕКС?



- Следвайте инструкциите на Вашия лекар за това кога и как да вземате таблетките. Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА върху опаковката. Попитайте лекаря, медицинската сестра или фармацевта, ако не сте сигурни.
- Обичайната доза за рак на гърдата е от 20 mg до 40 mg дневно..
- По принцип Нолвадекс се приема веднъж или два пъти дневно.
- Постарарайте се да вземате лекарството по едно и също време всеки ден.
- Не спирайте да вземате таблетките си, дори ако се почувстувате добре, докато Вашия лекар не Ви посъветва да го направите.

Ако вземете повече Нолвадекс отколкото трябва

Ако вземете повече от Вашата нормална доза, свържете се незабавно с лекар или с най-близката болница.

Ако забравите да вземете доза

Ако пропуснете доза, вземете я веднага щом се сетите, но не вземайте две дози едновременно.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както при всички лекарства, Нолвадекс може да има нежелани ефекти.

- Горещи вълни
- Менструални смущения
- Вагинално кървене
- Промени в ендометриума, които могат да доведат до вагинално кървене
- Фибрози (причинени от уголемяване на матката), които могат да се проявят като дискомфорт в малкия таз или вагинално кървене.
- Рак на ендометриума или матката
- Вагинален сърбеж
- Вагинален пролапс
- Стомашни проблеми (включващи гадене и повръщане)
- Главоболие
- Чувствителност към светлина
- Задържане на течности (вероятно подути глезени)
- Тромбоцитопения (по-лесно нараняване)
- Хипертриглицидемия (повишено ниво на мазнините в кръвта) в някои случаи с панкреатит (болка или чувствителност в горната коремна област)
- Кожни обриви, сърбеж или белене на кожата
- Косопад
- Проблеми с черния дроб като например жълтеница
- Смущения в зрението
- Затруднения в зрението в резултат на катаракта, промени в роговицата или заболяване на ретината
- Съобщавани са случаи на заболявания на очния нерв при пациентки, приемащи Нолвадекс, като при малък брой от случаите е възникната слепота.



- Овариални кисти (при постменопаузални жени)
- Увеличен рисък от проява на тромбоза

Когато Нолвадекс се използва в комбинация с цитотоксични агенти, съществува повишен рисък от възникване на тромбоемболични инциденти.

- Възпаление на дробовете, което може да се прояви като пневмония, задух или кашлица.
- Схващане (крампи) на долните крайници
- Внезапно възникнала слабост или парализа на ръцете или краката, внезапно затруднение на говора, походката, трудност при задържане на предмети или затруднение на мисленето, всяко от които може да възникне, защото кръвоснабдяването на мозъчните съдове е намалено. Тези симптоми биха могли да са признаци на мозъчен инсулт.
- В началото на лечението може да почувствате влошаване на симптомите на рак на гърдата например увеличаване на болката и/или увеличаване размера на засегнатата тъкан. В случай, че изпитвате прекомерно гадене, повръщане или жажда, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар. Това вероятно може да означава, че са настъпили промени в количеството на калций в кръвта и Вашия лекар трябва да Ви направи някои кръвни тестове.

Не се беспокойте от този списък на възможни ефекти. Вие може да нямаете нито един от тях.

Уведомете лекуващия си лекар, медицинската сестра или фармацевта, ако мислите, че имате някои от тези или други проблеми докато вземате Вашите таблетки Нолвадекс.

НЕЗАБВАНО преустановете вземането на Нолвадекс, в следните случаи и веднага уведомете Вашия лекар:


- Ако изпитвате затруднения в дишането с/или подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото.
- Ако се подуят ръцете, краката или глазените Ви
- В случай на уртикария (копривна треска)

5. СЪХРАНЕНИЕ НА НОЛВАДЕКС

Съхранявайте таблетките на място, където децата не могат да ги видят или да ги стигнат. Вашите таблетки може да им навредят.

Съхранявайте таблетките си при температура под 30°C.
Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка.

Не употребявайте таблетките след датата на изтичане на срока на годност, обозначена върху опаковката.



Върнете всички таблетки с изтекъл срок на годност на фармацевта.

Nolvadex е търговска марка, собственост на AstraZeneca group of companies

© AstraZeneca 2003-2008

