

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Нурофен Актив 200 mg таблетки, диспергиращи се в уста**  
**Ибупрофен**

**Nurofen Active 200 mg orodispersible tablets**  
**Ibuprofen**

**Без необходимост от вода**  
**Облекчава болка**

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-5331 / 03.07.09
Одобрено: 37 / 19.05.09

**Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.** Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.

Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### **В тази листовка:**

1. Какво представлява Нурофен Актив и за какво се използва
2. Преди да използвате Нурофен Актив
3. Как да използвате Нурофен Актив
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нурофен Актив
6. Допълнителна информация

### **1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НУРОФЕН АКТИВ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Нурофен Актив има лимонов аромат, разтваря се бързо в устата, без необходимост от вода и осигурява ефективно облекчение.

Нурофен Актив съдържа ибупрофен, който принадлежи към групата на Нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС).

НСПВС осигуряват облекчение, като променят отговора на тялото към болка, възпаление и висока телесна температура.

Нурофен Актив облекчава главоболие, мигрена, болки в кръста, менструални болки, зъбобол, невралгия, ревматични и мускулни болки, както при грип и простудни заболявания, съпроводени с температура.

### **2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НУРОФЕН АКТИВ**

#### **Не приемайте Нурофен Актив**

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или към някоя от останалите съставки на Нурофен Актив
- имате астма, алергични обриви или сърбежи, появява се алергична реакция, когато взимате ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или подобни на тях лекарствени продукти



- имате или сте имали язва на стомаха или дванадесетопръстника
- имате фенилкетонурия или сте чувствителни към фенилаланин, всяка таблетка съдържа аспартам еквивалентен на 8.4mg фенилаланин.
- сте в последния триместър на бременността
- вашата възраст е под 12 години

#### **Обърнете специално внимание при употребата на Нурофен Актив**

- имате астма или сте получавали астматични пристъпи
- имате бъбречни, сърдечни или чернодробни проблеми
- имате системен лупус еритематозус или друго смесено съединително-тъканно заболяване

#### *Предупреждения:*

Лекарства като Нурофен Актив могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението 3 дни.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

#### **Прием и употреба на други лекарства**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

- редовно приемате други лекарствени продукти, особено ако това са:
  - други облекчаващи болката лекарствени продукти, съдържащи ацетилсалицилова киселина, ибупрофен или други от групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти
  - лекарствени продукти за високо кръвно налягане, включително и диуретици
  - лекарствени продукти за разреждане на кръвта (антикоагуланти)
  - метотрексат или литиеви лекарствени продукти
  - зидовудин
  - бременни сте или кърмите

#### **Бременност и кърмене**

Има данни за единични случаи на употреба на НСПВС лекарствени продукти, прилагани продължително и при по-високи дози, които могат да повлияят временно и обратимо възможността за забременяване.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НУРОФЕН АКТИВ**

Винаги приемайте Нурофен Актив точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Поставете таблетката на езика, изчакайте да се разтвори и след това я преглътнете, без вода. Не дъвчете таблетката.

#### За възрастни и деца над 12 години:

Първоначално се приемат 2 таблетки, след това ако е необходимо се вземат 1 или 2 таблетки на всеки 4 часа, но не повече от 6 таблетки за 24 часа.



Не е подходящ за деца под 12 години.

Ако симптомите продължат повече от 3 дни и болката и температурата не се повлияват или се появят нови симптоми, консултирайте се с лекар или фармацевт.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Нурофен Актив**  
Ако сгрешите и приемете повече таблетки от посочената доза, незабавно се свържете с лекар.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства Нурофен Актив може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нурофен Актив има добра поносимост и се приема много добре от повечето хора. В отделни случаи могат да се появят следните странични реакции: стомашни смущения, болка, гадене, стомашна язва, оцветени в черно изпражнения, кожни обриви, сърбежи, влошаване на астматични пристъпи, затруднено дишане, бъбречни или чернодробни проблеми, главоболие, замайване и смущения в слуха, много рядко лющене на кожата, склонност към лесно получаване на синини, подпухналост на лицето.

Лекарства като Нурофен Актив могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НУРОФЕН АКТИВ**

Да се съхранява под 25° С.  
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Нурофен Актив след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

##### **Какво съдържа Нурофен**

- Активното вещество е: ибупрофен 200mg
- Другите съставки са: манитол, етилцелулоза, аспартам, кроскармелоза натрий, силиконов диоксид, хипромелоза, аромат (аромати, малтодекстрин), магнезиев стеарат.

##### **Как изглежда Нурофен Актив и какво съдържа опаковката**

Опаковка Нурофен Актив съдържа 6; 12 и 24 таблетки, диспергиращи се в уста.

Не всички опаковки ще бъдат продавани на пазара.

**Притежател на разрешението за употреба:**  
**Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.**



103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH  
Великобритания

**Производители:**

**1. Ethypharm Industries,**  
Z.I De Saint-Arnoult,  
28170 Chateauneuf-en-Thymerais,  
Франция

**2. Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.**  
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB  
Великобритания

Дата на ревизия на текста: април, 2008

