

ИАЛ
ОДОБРЕНО!

ДАТА *21.11.2008* R-8287/06-11 08

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

NYSTATIN АСТАВИС 500 000 IU tablets
НИСТАТИН АКТАВИС 500 000 IU таблетки
Нистатин

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- *Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.*
- *Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!*
- *Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.*

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Нистатин Актавис и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Нистатин Актавис
3. Как се прилага Нистатин Актавис
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Нистатин Актавис таблетки

Лекарствено вещество в една таблетка: Нистатин 500 000 IU

Помощни вещества: целулоза, микрокристална ; магнезиев стеарат, царевично нишесте.


Нистатин Актавис таблетки по 10 таблетки в блистер, 2 блистера в картонена кутия

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НИСТАТИН АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Нистатин е антибиотик, съдържащ микозамин. Спира развитието на гъбичките и в някои случаи ги унищожава.

Нистатин Актавис се прилага за:

- Лечение на заболявания, предизвикани от дрождеподобни гъби от рода Candida:
 - орофарингеални кандидози (гъбична инфекция в устата и гърлото);
 - езофагеални кандидози (гъбична инфекция на хранопровода);
 - гастроинтестинални кандидози (гъбична инфекция на стомаха и червата);
- Профилактика на кандидомикоза при продължително лечение с антибиотици или имunosупресори, както и при лица с имунодефицит.



- Като придружаващо лечение при вагинална (влагалищна) или кожна кандидоза с оглед да се предотврати разпространението на процеса към стомашночревния тракт.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С НИСТАТИН АКТАВИС

Нистатин Актавис не се прилага при свръхчувствителност към лекарственото и някои от помощните вещества.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:
Поради ниската системна резорбция няма специални предупреждения по време на лечението.

Приложение на Нистатин Актавис и прием на храни и напитки

Желателно е да не се поемат храна или течности един час след приемане на продукта.

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Няма данни за нежелани ефекти върху плода, затова Нистатин Актавис може да се назначава при бременни.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Няма данни за нежелани ефекти върху плода, затова Нистатин Актавис може да се назначава и по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Продуктът може да се приема по време на шофиране и при работа с машини.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Не се наблюдават клинично значими лекарствени взаимодействия.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА НИСТАТИН АКТАВИС


Винаги приемайте Нистатин Актавис според инструкциите на лекуващия лекар!

Продуктът се приема перорално.

Възрастни - 500 000 UI до 1 000 000 UI (1-2 таблетки) три – четири пъти дневно.

При тежки случаи на кандидоза, денонощната доза може да се удвои.

Деца над 3 г. - 250 000 UI до 500 000 UI (1/2 – 1 таблетка), три - четири пъти дневно.



Профилактика на кандидози за възрастни - по 1 000 000U1 дневно. При лечение на орална кандидоза, таблетката трябва да се задържи по-дълго време в устната кухина.

Лечението с **Нистатин Актавис** трябва да продължи най-малко 48 часа след изчезване на симптомите, за да се предотвратят рецидиви.

При липса на терапевтичен ефект от приложението на продукта до 14-ия ден от началото лечението, то трябва да се прекрати.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!

При предозиране на **Нистатин Актавис** са възможни усложнения от страна на стомашно-чревния тракт - гадене, повръщане, разстройство, болки в стомаха.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Нистатин Актавис може за предизвика нежелани лекарствени реакции

Няма данни за нежелани лекарствени реакции от продукта.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25⁰С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Срок на годност: 2 (две) години

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков" 29

1407, София България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител

"Балканфарма-Разград" АД

бул. "Априлско въстание" №68


Разград-7200

Тел. 084613318

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков" 29



1407, София България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Октомври 2008 г.

