

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Olynth® 0,1% спрей за нос
Xylomethazoline (ксилометазолин)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-2294, 16.06.08
Одобрено: 18/03.06.08

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват 7 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Olynth и за какво се използва
2. Преди да използвате Olynth
3. Как да използвате Olynth
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Olynth
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OLYNTH И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Olynth спрей за нос принадлежи на група лекарства, наречени симпатикомиметици. Той има съдосвиващ ефект и с това намалява отока на лигавицата и води до подобро оттичане на секрета.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ OLYNTH

Не използвайте Olynth

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към ксилометазолин или към някоя от останалите съставки на Olynth.
- ако сте алергични (свърхчувствителни) към бензалкониев хлорид (използан като консервант в състава на Olynth)
- ако имате сухо възпаление на носната лигавица (сух ринит)
- при деца под 6 години

Обърнете специално внимание при употребата на Olynth

- ако Вие приемате лекарства, които могат да повишат кръвното налягане
- ако имате повишено вътреочно налягане (тясноъгълна глаукома)
- ако имате тежко сърдечно-съдово заболяване (исхемична болест на сърцето, високо кръвно налягане)
- феохромцитом (сериозно заболяване, което предизвиква внезапно повишаване на кръвното налягане)
- ако имате метаболитни заболявания (напр. повишена функция на щитовидната жлеза, диабет)

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Olynth 0.05%

При едновременната употреба на Olynth 0,1% и някои подобряващи настроението лекарства (MAO инхибитори) могат да се наблюдават ефекти върху сърдечно-съдовата система с повишаване на кръвното налягане.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Olynth 0,1% не трябва да се използва време на бременност, тъй като не са известни ефектите на лекарството върху плоза. Лекарството не трябва да се използва по време на кърмене, защото не е известно дали преминава в кърмата.

Шофиране и работа с машини

При продължителна употреба и във високи дози Olynth 0,1% не могат да бъдат изключени ефекти върху сърдечно-съдовата система. Това може да наруши способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ OLYNTH

Ако не е предписано друго за възрастни и деца в училищна възраст се прилагат при нужда по 1 впръскване на Olynth 0.1% във всяка ноздра. Дозировката зависи от индивидуалната чувствителност на пациента и от клиничния ефект.

Olynth 0.1% спрей за нос не трябва да се прилага повече от 5 до 7 дни, освен ако не е предписано друго от лекар.

Употребата при хроничен ринит трябва да се извършва само под лекарско наблюдение, поради опасността от атрофия (увреждане) на носната лигавица

Ако сте приели повече от необходимата доза Olynth

Ако сте приели повече от необходимата доза или случайно сте погълнали Olynth незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате Olynth

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Olynth

Повторна употреба трябва да се извършва само в случай, че лечението е прекъснато за няколко дни. Винаги се консултирайте с лекар, за продължителността на употреба при деца.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Olynth може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Дихателна система

Олинт 0.1% може да причини преходни, леки симптоми на дразнене (парене или сухота на носната лигавица) в носа при чувствителни пациенти.



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Olynth 0.05%

В изолирани случаи след изчерпване ефекта на лекарството може да се наблюдава увеличение на отока на лигавицата (реактивна хиперемия).

При продължителна или честа употреба, или в по-високи дози на Olynth 0.1% може да се получи усещане за парене или сухота на лигавицата, както и т.нар. медикаментозен ринит. Този ефект може да се наблюдава дори след 5 – 7 дневно лечение, след продължително прилагане и може да предизвика временно увреждане на лигавицата с образуване на корички (сух ринит).

Нервна система

Изключително рядко могат да се наблюдават главоболие, безсъние или умора.

Сърдечно-съдова система

Понякога се наблюдават ефекти върху сърцето и кръвообращението, като сърцебиене, ускорен пулс и повишено кръвно налягане.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ OLYNTH

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Olynth 0.1% след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Поради хигиенни причини Olynth 0.1% не трябва да бъде употребяван 24 седмици след първата употреба.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Olynth

- Активното вещество е ксилометазолин
- Другите съставки са: бензалкониев хлорид (консервант), сорбитол, натриев хлорид, натриев дихидрогенфосфат дихидрат, динатриев фосфат дихидрат, динатриев едетат, пречистена вода.

Как изглежда Olynth и какво съдържа опаковката

10 ml спрей за нос (дозиращ)

Притежател на разрешението за употреба

PFIZER EUROPE MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich, Kent
England CT13 9NJ

Производител

Pfizer PGM GmbH
5 avenue de Concorde
45071 Orleans Cedex 2
France

Дата на последно одобрение на листовката {ММ /ГГГГ}.

