

## Информация за пациента

### **Orimeten®/Ориметен**

aminoglutethimide/аминоглутетимид

Тази листовка Ви предоставя полезна информация за Вашето лекарство. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете да го приемате. Ако имате допълнителни въпроси или не сте сигурни в нещо - попитайте Вашия лекар или фармацевт. Запомнете - това лекарство е предписано на Вас. Никога не го претстъпвайте на други хора - дори и ако тяхното заболяване наподобява Вашето.

### **КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ORIMETEN®**

Всяка таблетка ORIMETEN® съдържа 250 мг активно вещество аминоглутетимид. Освен това във всяка таблетка се съдържат следните помощни вещества: Безводен колоиден силициев диоксид, хидроксипропилметилцелулоза, магнезиев стеарат, царевично нишесте, талк.

ORIMETEN® действа върху орган, познат като кора на надбъбрека.  
ORIMETEN® намалява производството на естрогени и други стероиди.  
ORIMETEN® е познат и като инхибитор на ароматазата.

### **Опаковка**

Таблетки x 250 мг x 100

### **Притежател на лиценз и производител:**

Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35,  
CH 4002, Basel, Switzerland

### **Притежател на маркетинг оторизация в България**

Novartis Pharma Services Inc., CSO,  
София 1164, "Площад на свободата" No1  
тел.: + (359 2) 963 00 51, + (359 2) 960 03 00;  
факс: + (359 2) 963 41 94

### **КАК ДЕЙСТВА ORIMETEN®**

ORIMETEN® може да се прилага за лечение на следните заболявания:

- рак на гърдата при жени в менопауза;
- рак на простатата;
- синдром на Къшинг.

При рак на гърдата, ORIMETEN® намалява продукцията на естрогени, които стимулират растежа на туморите.

При синдрома на Къшинг, ORIMETEN® намалява производството на хормона кортизол.

### **ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ORIMETEN®**

**НЕ прилагайте ORIMETEN®, а информирайте Вашия лекар, ако:**

- в миналото сте развили някакви необичайни или алергични реакции (напр. обриви) към аминоклутетимид или глутетимид;
- страдате от порфирия;
- сте бременна.

#### **Други медикаменти или вещества, които могат да се отразят на действието на ORIMETEN®**

Преди да приемате друг медикамент в комбинация с ORIMETEN®, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар може да промени дозировката или дори да спре едно от лекарствата. Това се отнася както за лекарствата по рецепта, така и за тези, без рецепта и особено за:

- някои лекарства, прилагани при лечение на възпалителни процеси (познати като синтетични кортикостероиди);
- някои лекарства, прилагани срещу кръвосъсирване (познати като антикоагуланти);
- някои лекарства, прилагани за лечение на диабет (познати като перорални антидиабетни средства);
- някои лекарства, прилагани за понижаване на кръвното налягане (познати като диуретици);
- лекарства, съдържащи дигитоксин, теофилин или медроксипрогестерон.

Повишено внимание е необходимо при консумация на алкохол, защото ефектите на алкохола могат да са по-силно изразени.

#### **При бременност или кърмене**

ORIMETEN® не трябва да се прилага по време на бременност. Преди започване на лечение с ORIMETEN® при жени във фертилна възраст трябва да се изключи наличието на бременност. Тези пациентки трябва да използват нехормонални контрацептивни методи по време на лечението.

#### **Приложение при деца**

ORIMETEN® не е прилаган при деца.

#### **Приложение в старческа възраст**

ORIMETEN® е подходящ за приложение при пациенти в старческа възраст.

#### **При шофиране или работа с машини**

ORIMETEN® може да предизвика сънливост. Ако изпитате подобен ефект, не трябва да шофирате, да работите с машини или да извършвате дейности, които могат да бъдат опасни, ако нямате нужната концентрация на вниманието.

### **КАК ПРАВИЛНО ДА ПРИЛАГАТЕ ORIMETEN®**

Вашият лекар ще Ви посъветва в какви дози и с каква честота да приемате ORIMETEN® според Вашите нужди. Следвайте инструкциите на Вашия лекар.

При започване на лечението, трябва да приемате ORIMETEN® в малки дози и след това постепенно да повишите дозата, според указанията на Вашия лекар. Важно е Вашият лекар да следи редовно подобрението Ви, за да е сигурен както в ефекта на лекарството, така и че ORIMETEN® не предизвиква нежелани ефекти.

#### **Рак на гърдата, рак на простатата**

Обикновено лечението започва с по 1/2 таблетка (125 мг), два пъти дневно. Постепенно дозировката се повишава до 2 - 4 таблетки дневно, според указанията на Вашия лекар.

Вашият лекар може да Ви предпише допълнително лекарство, което съдържа хидрокортизон или кортизон ацетат. Това ще оптимизира действието на ORIMETEN®.

### **Синдром на Кушинг**

Дозата варира от 2 до 4 пъти дневно по една таблетка, но в определени случаи може да се достигне до 7 пъти дневно по 1 таблетка. Вашият лекар ще прецени според Вашия конкретен случай.

#### *Какво да правите, ако пропуснете приема на една доза?*

Ако пропуснете приема на една доза, вземете я веднага, щом си спомните. В случай, че е настъпило време за следващата доза, пропуснете забравената и пак продължете по предписаната Ви схема. Не приемайте двойно по-голяма доза.

#### *При предозиране*

При случаен прием на много по-голям брой таблетки ORIMETEN® от предписаните Ви, незабавно потърсете медицинска помощ.

### **КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ НА ORIMETEN®**

Подобно на всички други медикаменти, в допълнение на своите благоприятни ефекти, ORIMETEN® може да предизвика и някои нежелани реакции.

Най-честите нежелани реакции на ORIMETEN® са:

- сънливост;
- отпадналост;
- обриви (понякога придружени от висока температура);
- световъртеж;
- гадене.

Най-често тези реакции се появяват през първите няколко седмици от началото на лечението с ORIMETEN® и постепенно отзвучават в хода на лечението.

Други редки странични реакции, които могат да се появят по време на лечение с ORIMETEN®, са:

- кръвни нарушения;
- обриви или кожни проблеми;
- стомашно-чревни проблеми (диария, повръщане, запек);
- главоболие;
- депресия;
- загуба на апетит;
- нарушения в съня;
- обърканост;
- втрисане;
- изпотяване;
- чернодробни или бъбречни нарушения;
- мускулни спазми;
- нестабилна походка;
- надбъбречна недостатъчност (ниско кръвно налягане, ниска кръвна захар, обща слабост, уморяемост);
- понижена функция на щитовидната жлеза;
- алергични реакции;
- лунообразно лице;
- повишена кръвна захар;
- повишено кръвно налягане.

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако някоя от гореизброените реакции продължава повече от няколко дни или Ви безпокои. Информирайте Вашия лекар и ако забележите други реакции, различни от изброените по-горе.

## **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Срок на годност**

- 5 години от датата на производство

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

### **Условия на съхранение**

- Таблетките трябва да се предпазват от топлина (съхранявайте при температура под 30°C), светлина и влага.
- Да се съхранява на места, недостъпни за деца; неконтролираната употреба на това лекарство може да им навреди.

### **Откъде да получите допълнителна информация**

Ако имате каквито и да е други въпроси относно Вашето лекарство, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

**ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА: 28.10.1992**