

Part № Годен до: Per. №	<b>АНТИМИКО-АЦИД</b> <b>Дермален разтвор</b>	Състав: g/50g: Лекарствени вещества: salicylic acid 4.0, Benz/nc acid 4.0 Помощни вещества: ацетон 12.05, Глицерол 14.0, Етанол 9% 14.0, Пречистена вода 1.95 Показания : в комплексното лечение на дерматомикози Дозировка и начин на приложение: нанася се върху засегнатите участъци с памучен тампон един-два пъти дневно в продължение на два- три дни. Противопоказания: саръчувствителност към някоя от съставките на продукта, бременност и кърмене и деца под 6 годишна възраст. Нежелани лекарствени реакции: възможна е появата на алергични реакции, дерматити, разязвяване на кожата, а също макар и рядко - световъртеж, шум в ушите, гадене и повръщане, психомоторна възбуда, нарушения в дишането и други прояви на салицилова интоксикация. При нежелани реакции, лечението следва да се преустанови и се потърси лекарска помощ. Предупреждения: само за външно приложение. Да не се нанася върху дигавици и наранени кожни повърхности. Да не се нанася върху големи кожни повърхности. Не се препоръчва прилагането му при болни с бъбречна недостатъчност и диабетни с нарушено периферно кръвообращение. Да се пазят очите. Продуктът е лесно запалим. Да се съхранява на място недостъпно за деца. Условия на съхранение: При температура под 25° С на защитено от светлина място
	<b>ANTIMYCO-ACID</b> <b>Cutaneous solution</b>	
	<b>ВЪНШНО ЗА МАЗАНЕ 50g</b> <b>Режим на предписване:</b> <b>без лекарско предписание.</b>	
	Производител и притежател на разрешението за употреба: Тикофарма ООД-гр.Пещера ул.Повранска епача № 5	

**МАЛ**  
**ОДОБРЕНО!**  
 ДАТА 15.12.2003г

М. Платиканова 29.01.04

*M. Platikanova*

Д. Крумова 23.01.04

*D. Krumova*

