

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 17.10.06г.

## **Panadol Femina** **Панадол Фемина**

Моля прочетете тази листовка внимателно.

### **Какво е Panadol Femina таблетки?**

Всяка таблетка съдържа paracetamol 500mg и hyoscine butylbromide 10mg.

Също така съдържа: микрокристална целулоза, картофено нишесте, поливинилпиролон, сорбитол, талк, магнезиев стеарат, колоидален силикон диоксид, натриево нишесте глюконат, хидроксипропилметил целулоза, полиетиленгликол 6000.

Опаковката може да съдържа 6, 8, 10, 12, 16, 30, 48, 60 или 96 обвити таблетки.

### **За какво се прилага Panadol Femina таблетки?**

**Panadol Femina** бързо и ефекасно облекчава симптомите при менструална болка.

Също така облекчава симптомите при бъбречни и жлъчни колики и синдром на раздразнено дебело черво.

### **Как действа Panadol Femina?**

**Panadol Femina** съдържа две активни съставки: парацетамол – аналгетик (обезболяващо) и хиосцин бутилбромид – спазмолитик (облекчава болезнените спазми при менструация).

Следователно, **Panadol Femina** е предпочитаното средство за облекчаване на менструалната болка. **Panadol Femina** таблетки са филмирани и с овална форма, което ги прави лесни за приемане.

### **Преди да вземете този продукт проверете:**

**Не приемайте други продукти, съдържащи парацетамол.** Не приемайте **Panadol Femina**, ако сте алергични към парацетамол, хиосцин бутилбромид или някоя от другите съставки, посочени по-горе. Не се препоръчва при кърмене и пациенти с миастения гравис и мегаколон.

### **Преди да вземете Panadol Femina се консултирайте с Вашия лекар, ако:**

- страдате от тежко бъбречно, чернодробно или сърдечно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон или дизопирамид (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, (прилаган за понижаване нивото на холестерол);
- приемате антидепресанти, антихистамини (лекарства срещу някои алергични реакции), хинидин (антиаритмично средство) или амантидин (лекарство срещу Паркинсон).
- страдате от някое от следните заболявания гастроэзофагиален рефлукс, интестинална улцерация или запек;
- сте бременна

### **Как се приема?**

#### **Възрастни и деца над 12 години:**

1-2 таблетки до три пъти дневно. Тази доза може да бъде повтаряна на всеки 8 часа.

Не трябва да се приемат повече от 6 таблетки за период от 24 часа.

Не се препоръчва при деца под 12 години.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с лекар.

#### **Не надвишавайте препоръчаната доза.**

Ако приемете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре. Предозирането може да доведе до увреждане на черния дроб.



### **Кои са нежеланите лекарствени реакции на Panadol Femina?**

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Възможно е наблюдаването на свръхчувствителност, изразена в кожен обрив. Много рядко е съобщавано за промени в кръвната картина, но тези промени не са били задължително свързани с приемането на парацетамол.

Нежелани реакции, свързани с hyoscine butylbromide, са сухота в устата, дезориентация, нарушена памет и вертиго. Ако се приема от мъже за облекчаване на симптомите при бъбречни и жлъчни колики или синдром на раздразнено дебело черво, рядко може да се наблюдава задържане на урината. Тези реакции са редки. Въпреки това, ако ги наблюдавате, спрете употребата на продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

Panadol Femina може да се приема от бременни жени само, ако по преценка на лекар, ползите за майката надвишават потенциалния риск за зародиша. Panadol Femina е противопоказан по време на кърмене.

Panadol Femina може да повлияе върху зрителната острота, затова шофирането и работата с машини са противопоказани. Информирайте Вашия лекар, че приемате **Panadol Femina**, в случай, че иска да Ви предприше други лекарства.

**Срок на годност:** Да не се приема след датата, посочена на опаковката.  
**Условия на съхранение:** Да се съхранява при температура под 25°C.  
Да се съхранява в оригиналната опаковка, на защитено от светлина място.  
**Да се съхранява на места, недостъпни за деца.**

### **Притежател на разрешението за употреба**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,  
GlaxoSmithKline Export Ltd.,  
Brentford, TW8 9GS, UK

Panadol е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

