

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 13.03.07

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PARACETAMOL INBIOTECH 500 mg tablets
ПАРАЦЕТАМОЛ инбиотех 500 mg таблетки
(Paracetamol)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация:

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 5 дни (при деца 3 дни)
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Тази листовка съдържа:

1. Какво представлява Парацетамол Инбиотех и за какво се използва
2. Преди да приемете Парацетамол Инбиотех
3. Как да приемате Парацетамол Инбиотех
4. Възможни нежелани ефекти
5. Съхранение на Парацетамол Инбиотех
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРАЦЕТАМОЛ инбиотех И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Парацетамол Инбиотех е пара-аминофенол, активен метаболит на фенацетин. Парацетамол Инбиотех има аналгетични и аптипиретични свойства. Ефективен е при остра и хронична болка.

Прилага се за симптоматично повлияване на слаба до умерена болка - главоболие, мигрена, зъббол, невралгия, мускулни и менструални болки, слаба до умерена следоперативна и следтравматична болка.

При повишена телесна температура, вследствие на грип и простуда.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ ИНБИОТЕХ

Не приемайте Парацетамол Инбиотех ако:

- сте алъргични (свръхчувствителни) към лекарственото вещество или към някоя от останалите съставки на Парацетамол Инбиотех;
- имате тежки чернодробни заболявания

Обърнете специално внимание при лечението с Парацетамол Инбиотех

- Консултацията с лекар е наложителна, когато болката продължава повече от 5 дни или температурата се поддържа висока повече от 2-3 дни и/или ако има



- симптоми се придвижват от кашлица, главоболие, обрив, гадене и повръщане продължаващи повече от 5 дни.
- Съдържанието на парацетамол трябва да се проверява в други едновременно приемани комбинирани лекарствени продукти, за да се избегне рисък от неволно предозиране.
 - При деца, приемащи Парацетамол Инбиотех 60 mg/kg дневно, не се препоръчва комбинация с друго антипириетично средство и/или парацетамол-съдържащи лекарствени продукти.
 - При пациенти, приемащи редовно алкохол или лекарства ензимни индуктори, както и при пациенти с бедна на протеини диета, парацетамол трябва да се прилага внимателно защото съществува повишен риск от чернодробни увреждания.
 - Прилагането при пациенти с чернодробни заболявания трябва да става внимателно, при проследяване на чернодробната функция.
 - На пациенти с увредена бъбречна функция (със стойности на креатининовия клирънс под 10 ml/min) се препоръчва да приемат парацетамол през интервали не по-къси от 8 часа между две дози.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насокоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.

Едновременната употреба на paracetamol може да потенцира действието на кумариновите антикоагуланти.

Cholestyramine, антиацидни лекарства и наличието на храна в stomаха намаляват резорбцията на paracetamol. Metoclopramide и domperidone увеличават степента на резорбция на paracetamol и засилват ефектите му.

Едновременното приемане на paracetamol с фенотиазини може да доведе до хипотермия.

Ензимни индуктори като phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, izoniazide могат да увеличат риска от хепатотоксичност.

Paracetamol Inbiotech може да се приема най-рано 2 седмици след спиране на лечение с МАО инхибитори (антидепресанти).

Оралните контрацептиви и Рифампицин намаляват ефектите на paracetamol. Paracetamol Inbiotech не бива да се приема заедно с алкохол тъй като, поради индукция на микрозомалната етанол-окисляща система (МЕОС), може да се повиши неговата хепатотоксичност. Пациенти, приемащи повече от 50 ml концентриран алкохол на ден трябва да се консултират с лекар преди приемането на paracetamol.

Тестовете за глукоза в кръвта могат да дадат фалшиви положителни резултати при приемането на paracetamol. Това трябва да се има предвид при болни от диабет.

Прием на Парацетамол Инбиотех с храни и напитки

Не бива да се приема заедно с алкохол, поради риск от увеличаване на токсичното действие на парацетамол върху черния дроб.

Бременност и кърмене



Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Парацетамол Инбиотех в терапевтични дози може да се използва по време на бременност и кърмене. Не се препоръчва прилагането му през първия триместър на бременността. В периода на кърмене е необходимо строго съблюдаване на препоръчителните дневни дози и продължителността на лечението.

Шофиране и работа с машини

Парацетамол Инбиотех не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ ИНБИОТЕХ

Обичайната доза е:

Възрастни и деца над 15 г.

По 500-1000 mg на всеки 4-6 часа, но не повече от 6 таблетки на ден.

Деца от 12 до 15 г.

По 1 таблетка на всеки 4-6 часа, но не повече от 4 таблетки на ден.

Деца от 6 до 12 г.

По ½ таблетка на всеки 4 - 6 часа, но не повече от 2 таблетки на ден.

Продължителността на лечебния курс без проведена консултация с лекар не трябва да надхвърля 5 дни при възрастни и 3 дни при деца.

При пациенти на възраст над 60 години се препоръчва лечение с по-ниски дози парацетамол.

Ако сте приемали повече от необходимата доза Парацетамол Инбиотех

Приемането на прекалено голямо количество парацетамол може да увреди черния дроб.

Предозирането се проявява обикновено през първите 24 часа с гадене, повръщане, загуба на апетит, болки в корема, бледност.

В тези случаи незабавно се обърнете за помощ към лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Парацетамол Инбиотех може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В редки случаи, се наблюдават алергични реакции - сърбеж, обриви, много рядко - промени в кръвните показатели напр. тромбоцитопения (намаляване броя на кръвните плоочки).

При продължително прилагане на високи дози парацетамол е възможно нарушаване функциите на черния дроб (пожълтяване на кожата и очите, гадене, стомашна болка или дискомфорт, лесна уморяемост).

Често могат да се наблюдават следните нежелани ефекти: повишена чувствителност на кожата към слънцето, гадене и повръщане.

В тези случаи може да се продължи приема на Парацетамол Инбиотех или да се премине към други подобни препарати.



Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАРАЦЕТАМОЛ ИНБИОТЕХ

Да се пази от светлина и влага, при температура под 25⁰C.

Да се съхранява на място, далеч от погледа и достъпа на деца.

Не използвайте Парацетамол Инбиотех след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Не използвайте Парацетамол Инбиотех, ако забележите нарушаване целостта на блистера или промяна в цвета на таблетките.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Парацетамол Инбиотех 500 mg tablets

- помощни вещества: пшенично нишесте, микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, магнезиев стеарат, талк, повидон, колоидален силициев диоксид.

Как изглежда Парацетамол Инбиотех 500 mg tablets и какво съдържа опаковката

Кръгли, плоски таблетки, с делителна черта, цвят - бял до почти бял.

Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.

По 10 таблетки в блистер от твърдо, бяло, непрозрачно PVC/алуминиево фолио.

По 1 или 2 блистера, заедно с листовка за пациента, в сгъваема картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

ИНБИОТЕХ ООД

София 1000, ул Триадица 5А

тел.: 987 9537

факс: 988 0457

e-mail: biopharm@mbox.infotel.bg

Производител:

ФАРМА АД

Дупница, ул. Н. Рилски 13

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последна редакция на листовката април 2007

