


Acetylcystein STADA® 100, tablets
Ацетилцистеин СТАДА 100, таблетки



Състав:

Лекарствено вещество:

Всяка таблетка съдържа acetylcysteine 100 mg

Помощни вещества:

Аспартам, микрокристална целулоза, безводна лимонена киселина, лактоза монохидрат, макрогол 4000, магнезиев стеарат, поливинилпиролон, захарин - натриум дихидрат, високодисперсен силициев диоксид, винена киселина, ароматизатор.

Данни за опаковката:

Оригинални опаковки с 20 или 50 таблетки

Лекарственият продукт подпомага отстраняването на секрета при заболявания на дихателните пътища, съпроводени с жилави секрети (експекторант).

Показания:

Муколитично лечение при остри и обострени хронични бронхопулмонарни заболявания, свързани с нарушение на продукцията и транспорта на мукус.

Противопоказания:

Кога не трябва да употребявате таблетките Ацетилцистеин СТАДА 100?

Не трябва да употребявате Ацетилцистеин СТАДА 100 ако знаете, че сте свръхчувствителни към активната му съставка ацетилцистеин, или някоя от другите съставки.

Какво трябва да знаете ако сте бременна или кърмачка?

Тъй като не е установена със сигурност безопасността на Ацетилцистеин СТАДА 100 по време на бременност и кърмене, бременни жени и кърмачки не трябва да го употребяват, освен ако лекарят не счита прилагането на този лекарствен продукт за абсолютно необходимо.

Какво трябва да се има предвид при употребата на Ацетилцистеин СТАДА 100 от деца?

Бебета и деца под 1 година трябва да приемат ацетилцистеин само при животозастрашаващи състояния в болница под лекарско наблюдение.

Предупреждения и предпазни мерки при употреба:

Какво друго трябва да имате предвид?

Пациенти с фенилкетонурия (наследствено метаболитно заболяване) трябва да имат предвид, че този продукт съдържа изкуствения подсладител аспартам. Всяка таблетка съдържа 4.49 mg фенилаланин (еквив. на около 8 mg аспартам).

Какво трябва да имате предвид при шофиране, работа с машини или върху нестабилни работни площадки?

Не е необходимо да се вземат специални предпазни мерки.

Лекарствени взаимодействия:

Кои лекарства пречат на действието на таблетките Ацетилцистеин СТАДА 100?

Имайте предвид, че тази информация се отнася и за вземани наскоро лекарства.

Комбинираната употреба на Ацетилцистеин СТАДА 100 и потискащи кашлицата лекарствени продукти (антитусива) може да намали кашличния рефлекс и да предизвика опасно натрупване на секрети. Поради това трябва да се обърне специално внимание при предписването или употребата на тези лекарствени продукти по едно и също време.

Как действа Ацетилцистеин СТАДА 100 върху ефекта на други лекарства?

Тетрациклин хидрохлорид (но не и доксициклин) не трябва да се приема едновременно с ацетилцистеин, а по-добре с интервал от най-малко два часа между приемите им.

Едновременната употреба с Ацетилцистеин СТАДА 100 може да засили съдоразширяващото и разреждащото кръвта действие на глицерил тринитрата (нитроглицерин).


Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Инструкциите, дадени по-долу, се прилагат ако Вашият лекар не Ви е предписал друго. Моля, спазвайте указанията за дозиране, за да бъде лечението с Ацетилцистеин СТАДА 100 успешно и безопасно.

Колко таблетки Ацетилцистеин СТАДА 100 и колко често трябва да прилагате?

Възрастни и юноши над 14 години: 2 таблетки 2-3 пъти дневно (еквив. на 400-600 mg ацетилцистеин на ден).

Деца от 6 до 14 години: 1 таблетка 3-4 пъти дневно (еквив. на 300-400 mg ацетилцистеин на ден).



Деца от 2 до 5 години: 1 таблетка 2-3 пъти дневно (еквив. на 200-300 mg ацетилцистеин на ден).

При кистична фиброза:

Деца (2-6 години):

1 таблетка 4 пъти дневно (еквив. на 100 mg ацетилцистеин 4 пъти дневно)

Деца над 6 години:

2 таблетки 3 пъти дневно (еквив. на 200 mg ацетилцистеин 3 пъти дневно)

Как и кога трябва да приемате Ацетилцистеин СТАДА 100?

Таблетките Ацетилцистеин СТАДА 100 се вземат след хранене или като се гълтат цели с обилно количество течност, или разтворени в чаша вода.

Забележка:

Втечняващото секретите действие на продукта се засилва чрез допълнителното приемане на течности.

Колко време трябва да се взема Ацетилцистеин СТАДА 100?

Продължителността на лечение зависи от естеството и тежестта на основното заболяване и трябва да бъде определена от лекуващия лекар.

При пациенти с хроничен бронхит или кистична фиброза лечението трябва да се удължи с профилактична цел срещу инфекции.

Предозиране и други грешки при приложението:

Какво трябва да се направи при евентуално предозиране (съзнателно или неволно) на Ацетилцистеин СТАДА 100?

Съзнателното или неволно предозиране може да предизвика локално възпаление, вкл. киселини в стомаха, стомашни болки, гадене, повръщане и диария. Сериозни странични реакции или симптоми на отравяне обаче досега не са наблюдавани дори след екстремно предозиране.

Свържете се с лекар.

Какво трябва да се прави ако сте взели по-малка от предписаната доза или сте пропуснали един прием?

Ако сте пропуснали един прием или сте взели по-малка от предписаната доза ацетилцистеин, продължете с обичайната дозировка, описана в т. **Дозировка**

Лекарственият продукт не е подходящ за кърмачета и малки деца.

Нежелани лекарствени реакции

Какви нежелани реакции можете да изпитате докато употребявате Ацетилцистеин СТАДА 100?

Има много малко съобщения за поява на киселини в стомаха, гадене, повръщане и диария.

Има също така рядко съобщения за възпаление на устната лигавица (стоматит), главоболие и шум в ушите (тинитус).

Има изолирани съобщения за наблюдавани алергични реакции след прилагане на ацетилцистеин, включващи сърбеж, копривна треска (уртикария), кожни реакции (екзантем, обрив), бронхоспазъм, тахикардия и понижаване на кръвното налягане.

Изолираните инциденти с бронхоспазъм са се появили главно при пациенти с хиперреактивна бронхиална система при бронхиална астма, така наречените "хиперреагенти" (повишена чувствителност на бронхите към различни дразнения).

Също така е имало изолирани съобщения за случаи на кръвоизлив, свързвани с употребата на ацетилцистеин, някои от които като част от реакциите на свръхчувствителност.

Ако се появят някакви нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Какви мерки трябва да предприемете в случай на появата им?

Спрете приема на Ацетилцистеин СТАДА 100 още при появата на първите признаци на свръхчувствителност. Уведомете лекаря, защото той/тя може да определи тежестта на реакцията и нуждата от по-нататъшни действия.

Срок на годност и инструкции за съхранение:

Крайният срок на годност е отпечатан върху кутийката и блистера. Да не се използва след тази дата.

Как трябва да съхранявате Ацетилцистеин СТАДА 100?

Пазете го на тъмно, сухо място.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Последна редакция на информацията: 09.2001 г

Reg.No:

Производител: DEXEL Ltd, Israel - Hadera

Притежател на разрешението за употреба:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germany

