



PHARMATEX® 1,2% vaginal cream
ФАРМАТЕКС® 1,2% вагинален крем
Benzalconium Chloride
Туба 72g вагинален крем с дозироващ апликатор

Разучете внимателно указанията за употреба, за да се избягнат всички възможни грешки при употреба на продукта ФАРМАТЕКС® вагинален крем. **ЗАПОМНЕТЕ:** не употребявайте за измиване след полов акт сапун, защото сапуна неутрализира ефекта на средството, което убива сперматозоидите. Може да се измиете **ВЪНШНО** с **ЧИСТА** вода. Изчакайте най-малко 2 часа преди да приложите вагинална промивка. ФАРМАТЕКС® вагинален крем трябва да се използва независимо от етапа на Вашия менструалния цикъл.

СЪСТАВ: активно вещество Benzalconium Chloride 1,20 g; помощни вещества лимонена киселина, етилен гликол, макрогол 300 и 1500 стеарати, натриев хидрогенфосфат додекахидрат лавандулова есенция, пречистена вода за 100g вагинален крем.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕН КЛАС: локално противозачатъчно средство(G)


ПОКАЗАНИЯ: за противозачатъчно действие на място. Този метод намалява значително опасността от забременяване, без напълно да я подтиска, ето защо неговата ефективност зависи от строгото спазване на правилата за употреба.

ФАРМАТЕКС® вагинален крем може да се използва от всяка жена в детородна възраст, особено подходящ е за жени, на които временно или постоянно е противопоказано приемането на противозачатъчни таблетки или вътрематочни предпазни средства: спирали, диафрагми и др.; след раждане, при кърмене, след аборт или в периода около менопаузата; когато се налага случайно възникнал бърз противозачатъчен ефект; по време на предпазване с противозачатъчни таблетки, когато е пропусната дозата за деня или има забавяне на приема на таблетка навреме: в този случай ФАРМАТЕКС® вагинален крем трябва да се използва за останалите дни от цикъла. Като помощно средство при употребата на вътрематочни локални противозачатъчни средства, особено, ако са приемани редовно нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. Не трябва да се употребява едновременно със сапун и с други продукти, освен по лекарско предписание.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: противозачатъчното действие на ФАРМАТЕКС® вагинален крем зависи в най-голяма степен от правилната употреба на продукта. Това убиващо сперматозоидите средство(спермицид) се разрушава дори от минимални количества- следи от сапун. Външното измиване непосредствено ПРЕДИ или СЛЕД сексуален контакт може да бъде извършвано САМО с чиста вода или със специалното средство ФАРМАТЕКС® -свободно от сапун. Не трябва да се прилага ФАРМАТЕКС® вагинален крем, ако има увреждания по лигавиците на гениталиите или ако се наблюдават такива след приложение на продукта. Ако се наложи друго вагинално лечение с други продукти, изчакайте да завърши лечението с тези продукти, преди да използвате ФАРМАТЕКС® вагинален крем отново. **ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:**

ФАРМАТЕКС® вагинален крем не се препоръчва да се използва заедно със сапуни, с други средства с основна реакция и с други медицински продукти за вагинално приложение(всяко друго локално вагинално лечение може да доведе до пълна липса на локален спермициден ефект). Сравнително проучване



проведено с вагинални крем ФАРМАТЕКС® и няколко различни вида презервативи от латекс не показаха ефекти на влошаване на физическите характеристики на изпитваните презервативи.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ФАРМАТЕКС® вагинален крем трябва винаги да се прилага преди полов акт, независимо от периода на цикъла. Поставете дозировъчния апликатор на края на тубата. Напълнете го да отбелязания знак без да допускате да се образуват въздушни мехурчета. Разделете тубата от апликатора. Поставете апликатора колкото е възможно по-дълбоко във вагината, най-добре е да сте в лежачо положение. Бавно натиснете буталото на апликатора за се изхвърли крема във вагината. Извадете апликатора. Защитното противозачатъчно действие е незабавно и продължава най-малко **10 часа**. Преди повторен полов акт поставете нова доза с апликатора.

НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ: възможна алергия.

Да не се приема вагинални крем през устата. .

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява при температура до 25 °С. Да се пази на места недостъпни за деца. Да не се използва след срока на годност обозначен на опаковката. Дата на последната редакция на листовката: януари 2004.

1. схема как да отворите Вашата туба
2. схема на Вашата анатомия
3. поставете тубата за еднократно приложение и я изстискайте многократно
4. ако поставите тубата в право положение, първо повдигнете единия крак и го поставете на някаква опора.

ФАРМАТЕКС® гамата включва:

ФАРМАТЕКС® вагинални таблетки,

ФАРМАТЕКС® вагинален крем с дозировъчен апликатор

ФАРМАТЕКС® тампони

LABORATOIR INNOTECH INTERNATIONAL

7/9, Avenue Francois Vincent Raspail 94110 Arcueil

ПРОИЗВОДИТЕЛ: INNOTHERA CHOUZY, L'Isle Vert, 41 150 Chouzy-sur-Cisse – France

