

Листовка за пациента

PIROXICAM ALKALOID

(piroxicam)

капсули

Състав

1 капсула съдържа 20 mg пироксикам.

Фармакологично действие

Пироксикам е нестероиден противовъзпалителен препарат. Той притежава силен противовъзпалителен и аналгетичен ефект. Пироксикам обратимо подтиска синтеза на простагландините, известни като медиатори на възпалението.

Показания

Пироксикам е показан за лечение на:

- възпалителни ревматоидни заболявания като ревматоиден артрит и анкилозирац спондилит (болест на Бехтерев);
- артрози, дегенеративни ревматични заболявания
- остри скелетно-мускулни заболявания, включително остри пристъпи на ревматизъм на меките тъкани (тендовагинит, бурсит, синовит) и болки в гърба
- остра подагра
- болки с различна причина - дисменорея, постоперативни или посттравматични болки.

Противопоказания

Язва на стомаха и дванадесетопръстника, улцерозен колит. Тежка бъбречна или чернодробна недостатъчност. Свръхчувствителност към активната съставка, аспирин или други нестероидни противовъзпалителни средства/ особено ако са предизвикали астматичен пристъп, уртикария, ринит, бременност и кърмене. Не се прилага при деца под осем години.

Странични действия

Гастроинтестинални смущения като: гадене, диспепсия, запек, диария, повръщане, кръвоизливи от стомашно-чревния тракт, пептични язви. От страна на ЦНС може да се наблюдава замайване, нарушения в съня, главоболие. Най-честите кожни реакции са сърбеж, обриви, фоточувствителност. Много рядко може да се появят сърдечно-съдови и бъбречни смущения, подтискане функцията на костния мозък/гранулоцитопения, анемия/.

Лекарствени и други взаимодействия

При едновременно приложение с лекарствени средства , които също се свързват в голям процент с плазмените белтъци е необходим системен лекарски контрол.

Приемането на аспирин или други нестероидни противовъзпалителни средства намаляват ефекта на пироксикам / поради конкуриране за серумните протеини /.

Пироксикам може да намали ефекта на диуретиците и антихипертензивните средства, а да засили токсичността на литиевите препарати.

PIROXICAM ALKALOID/ ПИРОКСИКАМ АЛКАЛОИД



Листовка за пациентта

Предпазни мерки

Поради риска от гастро-интестинални усложнения при лечение с пироксикам е желателно използване на гастропротективни средства или H₂-блокери. При болни с поддържаща антикоагулантна терапия да се прилага с внимание и контрол на параклиничните показатели.

Да се избягва едновременна употреба на алкохол.

Бременност и кърмене:

Не се прилага при бременни жени и в периода на кърмене.

При жени в детородна възраст може да увреди фертилитета.

Ефект върху способността за шофиране и работа с машини

Пироксикам може да отслаби вниманието и реакциите, поради което се прилага при преценка на риска при шофиране и работа с машини.

Дозирание и начин на приложение

При възрастни дневната доза е 20 мг. еднократно приета по време на хранене. При по-тежки и болезнени състояния може да се предпише първоначална доза от 40 мг. дневно (еднократно или в повече приеми) в продължение на два дни, след което да се продължи с 20 mg от 7 до 14 дни. Пироксикам запазва своята ефективност, ако се употребява през продължителен период от време.

В случай пропускане на прием:

При пропускане на прием, следващата доза трябва да се вземе възможно най-скоро. Ако е близо до времето за прием на следващата доза, пропуснатата доза да се прескочи и лечението да продължи по установената схема. Да не се вземат две дози наведнъж.

Предозиране: Симптомите на предозиране са сънливост, гадене, повръщане и болка в епигастриума и са най-общо обратими при съответни грижи. Няма специфичен антидот. Препоръчва се предизвикване на повръщане или взима активен въглен. Може да се използват антиациди или H₂ блокери.

Съхранение

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Срок на годност

Пет (5) години.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Опаковка

Кутия с 20 капсули в блистер.

PIROXICAM ALKALOID/ ПИРОКСИКАМ АЛКАЛОИД



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ

Листовка за пациента

Притежател на разрешението за употреба

АЛКАЛОИД АД

Бул. А.Македонски 12

Скопие, Р.Македонија

ПРОИЗВОДИТЕЛ

АЛКАЛОИД АД

Бул. А.Македонски 12

Скопие, Р.Македонија

Дата на последната редакција на текста на листовката

Октомври 2002г.