

Нежелани лекарствени реакции

Не са известни.

Предозиране

До сега не са съобщени случаи на предозиране или интоксикация.

Фармакологично действие

Екстрактът от листа на червена лоза съдържа като основни компоненти фармакологично важни флавоноиди, кверцетин-глюкуронид и изокверцитрин. Предклинични проучвания с плъхове и зайци показват, че екстракт от листа на червена лоза и неговите флавоноиди предпазват съдовия епител чрез стабилизиране на мембраните и увеличаване на еластичността (нормализиране на съдовата пропускливост). Намаляването на излива на плазма, протеини или вода в междутъканното пространство, заобикалящо съдовете, намалява образуването на отоци и редуцира съществуващите.

В двойно сляпо, рандомизирано, плацебо – контролирано проучване две дози (360 mg на ден и 720 mg на ден, приемани сутрин) от ANTISTAX капсули са сравнени с плацебо при пациенти страдащи от ХВН (хронична венозна недостатъчност). Целта на изследването е да се определи ефикасността на ANTISTAX обективно по отношение на намаляване на отока на долния крайник и субективно по отношение на съответните симптоми на ХВН.

След 12 седмично лечение отокът в долния крайник е статистически значимо редуциран и при двете дневни дози в сравнение с плацебо. Резултатите се приемат за клинично приложими. Потвърдено е симптоматично подобрене. Дозата може да се увеличи до 720 mg на ден. ANTISTAX се понася добре и в двете дозови нива.

Условия на съхранение

Да се съхранява на сухо място под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Срок на годност

Да не се прилага след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Данни за опаковката


Блистери от PP/Al или Al/PVC/PVDC.

Опаковки от 20, 50 и 100 капсули от 180 mg за перорално приложение.

Притежателя на разрешението за употреба и производител

Boehringer Ingelheim International GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein
Germany

Производител



Pharmaton SA
Lugano, Switzerland

Дата на актуализация на текста:

