



Листовка - проект

**ПУРЕКС**  
крем 30 г.

**PUREX**  
cream 30 g.

**Състав:**

100 г. крем съдържа:

*Лекарствени вещества:*

Гъст екстракт от ехинацея 5,0 г  
/Echinaceae purpureae extractum spissum (5-7:1)/

*Помощни вещества:*

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| течен парафин            | 2,84 г     |
| глицерил моностеарат     | 2,84 г     |
| бял вазелин              | 30,34 г    |
| цетостеарил алкохол      | 8,53 г     |
| полисорбат 40            | 6,64 г     |
| миглиол 812              | 1,90 г     |
| пропилен гликол          | 4,74 г     |
| безводен силика гел      | 0,09 г     |
| сорбинова киселина       | 0,19 г     |
| етил парахидроксibenзоат | 0,20 г     |
| пречистена вода          | до 100,0 г |

**Фармакологични свойства:**

Екстрактът от ехинацея притежава широк спектър на биологическа активност, включително противовъзпалително и ускоряващо зарастването действие. Механизмът на действие на ехинацеята се базира на инактивирането на хиалуронидазата чрез свързването на този ензим със съдържащата се в екстракта полизахаридна фракция.

**Показания:**

Лекарствения продукт ПУРЕКС се прилага в комплексната терапия на трудно зарастващи повърхностни рани.

**Дозировка и начин на прилагане:**

Само за дермално приложение.

Тънък слой крем се нанася върху пострадалото място 2 – 3 пъти дневно.

Да се прилага в продължение на не повече от 8 седмици.



**Противопоказания:**

Свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарствения продукт.

**Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба:**

В отделни случаи могат да се проявят алергични реакции към билката ехинацея, към етил парахидроксibenзоат или друга съставка на лекарствения продукт.

**Лекарствени и други взаимодействия:**

Не е забелязано.

**Бременност и кърмене:**

Безопасност на прилагането при бременност – категория А. При външно прилагане няма противопоказания за използването на препарата в периода на бременност и кърмене.

**Нежелани лекарствени реакции:**

При продължително прилагане могат да възникнат кожни обриви и/или реакция на кожата.

**Срок на годност - 3 години**

Да не се използва след изтичане срока на годност посочен върху опаковката.

**Специални условия за съхраняване**

Да се съхранява при температура не по-висока от 25 С на недостъпно за деца място.

**Производител и притежател на разрешението за употреба:**

HASCO-LEK, 242 Zmigrodzka str., 51-131 Wroclaw, Poland

**Дата на последна редакция на текста:**

17.09.2003

