

ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RHINATHIOL 5 % ADULTS, syrup
РИНАТИОЛ 5 % ЗА ВЪЗРАСТНИ, сироп
Карбоцистейн (carbocisteine)

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 20.10.04

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Ринатиол 5% сироп и за какво се използва
2. Преди да приемете Ринатиол 5% сироп
3. Как да приемате Ринатиол 5% сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ринатиол 5% сироп
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РИНАТИОЛ 5% СИРОП И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Ринатиол 5% за възрастни е сироп против кашлица, спадащ към фармако-трапевтичния клас на муколитиците.

Това лекарство е показано за възрастни (над 15 години) в случаи на заболявания на дихателната система със затруднена експекторация (отхрачване), при необходимост от втечняване на секрета

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ РИНАТИОЛ 5% СИРОП

Не приемайте Ринатиол 5% сироп:

- при наличие на алергия към някоя от съставките, по-специално към метил парабен или други парабенови соли.

Обърнете специално внимание при употребата на Ринатиол 5% сироп

Необходимо е да се консултирате с лекар:

- при обилен и гноен секрет или треска;
- при хронични (продължителни) заболявания на бронхите и белите дробове
- ако имате язва на стомаха или дванадесетопръстника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СЪДЪРЖАНИЕТО НА АЛКОХОЛ В ТОВА ЛЕКАРСТВО Е 1.64°, Т.Е. 0.2 ГРАМА АЛКОХОЛ НА МЕРИТЕЛНА ЧАШКА.

Предпазни мерки при употреба:

- Употребата на това лекарство трябва да се съпровожда от доброволни усилия за кашляне, като по този начин позволява отхрачването.



- Не вземайте антитусивни лекарства (успокояващи кашлицата) или лекарства изсушаващи бронхиалния секрет по време на лечението с карбоцистин.
- В случай на диабет или ниско-захарна диета, трябва да се има предвид захарозното съдържание (6 g на една мерителна чашка).
- В случай на безсолна диета или диета с ниско съдържание на сол, трябва да се има предвид съдържанието на натрий (97 mg една мерителна чашка).

НЕЗАБАВНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР АКО НЯМАТЕ ПОДОБРЕНИЕ НА СИМПТОМИТЕ.

Прием на други лекарства

Това лекарство съдържа карбоцистин.

Да не се комбинира с :

- препарати, съдържащи същото лекарствено вещество. Да не се надвишава максимално препоръчаната доза (виж. КАК СЕ УПОТРЕБЯВА ТОВА ЛЕКАРСТВО).
- Лекарства, които в комбинация с алкохол причиняват реакции на непоносимост (изпотяване, зачеряване, повръщане, тахикардия): дисулфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф (антибактериални цефалоспорини), хлорамфеникол (антибактериален феникол), хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид (антидиабетни хипогликемични сулфамиди), гризофулвин (противогъбични), 5-нитро имидазоли (метронидазол, орнидазол, секнидазол, тинидазол), кетоконазол, прокарбазин (цитостатик).
- Депресанти за централната нервна система

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Нарушено внимание поради съдържанието на алкохол може да повлияе върху шофирането и работата с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ РИНАТИОЛ 5% СИРОП

Винаги приемайте Ринатиол 5% сироп точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Само за възрастни- над 15 години.

Обичайната доза е по една мерителна чашка, сутрин, обед и вечер, извън времето за хранене, без да се надвишават 3 мерителни чашки на ден.

Перорално приложение.

Изплакнете внимателно мерителната чашка след употреба.

Поставете капачката на бутилката след употреба.

Оставяйте интервал между дозите.

Продължителността на употреба е ограничена до 5 дни.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Ринатиол 5% сироп
СПРЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО И ВЕДНАГА СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР**



Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Ринатиол 5% сироп може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Възможност от стомашно-чревни разстройства: гадене, порвъщане, диария

Ако тези симптоми се появят, се препоръчва редуциране на дозата.

Поради наличието на парабен (парагидроксибензоати (естери), това лекарство може да причини уртикария (кожен обрив и сърбеж).

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ РИНАТИОЛ 5% СИРОП

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Ринатиол 5% сироп след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка.

Да се съхранява при температура под 25°C.

След първото отваряне на бутилката сиропът е годен до един месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Ринатиол 5% сироп

- Активното вещество е Карбоцистеин (carbocisteine)- 5.0g
- Другите съставки са: Захароза, метил парабен (Е 218), оцветител карамел (Е 150), канелено масло, ароматна тинктура, натриев хидроксид, дестилирана вода.
за 100 ml сироп

Една мерителна чашка от 15 ml съдържа 750 mg карбоцистеин, 6 g захароза, 0.2 g етанол и 97 mg натрий.

Съдържание на алкохол (V/V): 1.64%

Как изглежда Ринатиол 5% сироп и какво съдържа опаковката

Ринатиол 5% сироп се предлага в бутилка от 125 ml, поставена върху картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба:

Санофи-Авентис България ЕООД
София 1303
Бул. Ал. Стамболов 103



България

Производител:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1-3, allée de la Neste
ZI en Sigal
BP 319
31773 COLOMIERS Cedex, Франция

Дата на последна редакция на листовката Юли 2008

