

И А Л  
О Д О Б Р Е Н О !  
ДАТА 22.07.02

*Преди да започнете да приемате това лекарство прочетете внимателно приложената листовка, защото тя съдържа важна за вас информация.*

*Това лекарство се дава без рецепта при по-леки заболявания, които не изискват лекарска намеса. Независимо от това все трябва да използвате лекарственото средство внимателно, за да получите максимално добри резултати.*

*Пазете листовката с информацията. Може да се наложи да я прочетете отново.*

*Допитайте се до вашия фармацевт при нужда от допълнителна информация или съвет.*

*Трябва да потърсите лекар, ако не почувствате подобрение на състоянието си до 3 дни.*

**SEPTOLETE®**  
**СЕНТОЛЕТЕ®**  
таблетки за смучене

**При възпаление на устата и гърлото**

**Състав**

1 таблетка за смучене съдържа 1.0 mg бензалкониев хлорид (Benzalkonium chloride), 1.2 mg ментол (menthol), 1.0 mg ментово масло (peppermint oil), 0.6 mg евкалиптово масло (Eucalyptus oil) и 0.6 mg тимол (Thymol).

*Други съставки:* захароза, глюкоза разтвор, монохидратна лактоза, сорбитол, глицерол, боброва мас, магнезиев стеарат, течен парафин, фармацевтичен восък, повидон, титаниев диоксид (E171), жълт хинолинов оцветител (E104), индигодин (E132), противоразпенващ агент.

**Какво представляват таблетките за смучене Септолете?**

Таблетките за смучене Септолете съдържат бензалкониев хлорид, който действа като антисептик- дезинфектант и унищожават много бактерии и някои гъбички. Ментолът и ментоловото етерично масло намаляват чувството за болка и облекчават субективното усещане за парене и болка при преглъщане; те придават приятен и свеж вкус на таблетките за смучене. Подобно на бензалкониевия хлорид, тимолът има антисептично действие и усилва ефекта от лекарствения продукт. Евкалиптовото масло увеличава секрецията от лигавицата на горните дихателни пътища и така облекчава дишането.

Таблетките за смучене Септолете атакуват директно причинителите на инфекции, предотвратяват разпространението на инфекцията и ефективно облекчават състоянието при инфекции и възпаления на устата и гърлото.

**За какво се използват таблетките за смучене Септолете?**

Таблетките за смучене Септолете се препоръчват:

- За облекчаване на болката и за дезинфекция при леки инфекции в устната кухина и гърлото;
- при възпаление на лигавицата на устната кухина и венците;
- при дрезгав глас и лош дъх в резултат на инфекции на горните дихателни пътища.

**Кой не трябва да взема таблетките за смучене Септолете?**

Не трябва да вземате таблетките за смучене Септолете, ако сте свръхчувствителни (алергични) към някоя от съставките на лекарството.

### **Предпазни мерки и предупреждения**

Таблетките за смучене Септолете не се препоръчват на деца под 4-годишна възраст.

Не се препоръчва употребата на по-високи от предписаните дозировки.

При продължителна пресипналост на гласа се консултирайте с вашия лекар.

Пациентите с диабет не трябва да забравят, че всяка таблетка за смучене съдържа 0.8 g захар (захароза, глюкоза).

### **Таблетките за смучене Септолете след храната и напитките**

Не трябва да вземате таблетките за смучене Септолете непосредствено преди хранене или с прясно мляко.

### **Бременност и кърмене**

*Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство .*

Бременните жени и кърмачките може да вземат таблетките за смучене Септолете само по лекарска препоръка.

### **Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

Таблетките за смучене Септолете не влияят на способността за шофиране и работа с машини.

### **Кои други лекарствени продукти може да взаимодействат със Septolete?**

Моля, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако вземате други лекарства.

Лекарствени взаимодействия със Септолете не са известни.

### **Специални предупреждения за другите съставки**

1 таблетка за смучене Септолете съдържа 218 mg лактоза. Вие приемате 218 mg лактоза с всяка доза, ако вземате лекарството според препоръчаната дозировка. Лекарството не е подходящо за пациенти с дефицит на ензима лактаза, галактоземия или със синдром на малабсорбция на глюкоза/галактоза.

1 таблетка за смучене съдържа 632 mg захароза. Вие приемате 632 mg захароза с всяка доза за възрастни. Ако имате вроден синдром на непоносимост към фруктоза, синдром на малабсорбция на глюкоза/галактоза или дефицит на ензимите захараза изомалтаза, лекарството не е подходящо за вас.

1 таблетка за смучене съдържа 174.5 mg глюкоза. Вие приемате 174.5 mg глюкоза с всяка доза, ако вземате лекарството според препоръчаната дозировка.

1 таблетка за смучене съдържа 152.7 mg сорбитол. Вие приемате 152.7 mg сорбитол с всяка доза, ако вземате лекарството според препоръчаната дозировка. Лекарството не е подходящо за вас, ако сте с вродена непоносимост към фруктозата. То може да причини стомашно-чревни разстройства.

Високи дози глицерол могат да предизвикат главоболие и стомашно-чревни разстройства.

### **Дозировка и начин на приложение**

Разтваряйте 1 таблетка за смучене в устата си на всеки 2-3 часа.

При деца над 4-годишна възраст се препоръчват до 4 таблетки за смучене на ден, докато при деца над 10-годишна възраст – до 6 таблетки на ден. На лица в зряла възраст и деца над 12 години се препоръчва да вземат до 8 таблетки за смучене на ден.

*Ако имате впечатление, че действието на лекарството е твърде силно или твърде слабо, посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.*

**Ако приемете повече таблетки за смучене Спетовете, отколкото е нужно**  
*Ако сте взели свръхдоза, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт.*

Като се има предвид какво е количеството на активните съставки в една таблетка за смучене, възможността за предозиране е минимална. Ако сте погълнали голям брой таблетки, може да настъпят стомашно-чревни разстройства: гадене, повръщане и диария. При настъпването на такива състояния трябва да спрете да вземате лекарството, да пиете много вода или прясно мляко и да се консултирате с вашия лекар или фармацевт.

**Ако сте забравили да вземете Септовете**  
*Не вземайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата.*

**Последици след спиране на лечението със Септовете**  
Няма.

**Възможни нежелани лекарствени реакции**  
*Подобно на другите лекарствени продукти таблетките за смучене Спетовете може също да дадат нежелани лекарствени реакции.*

Ако таблетките за смучене Септовете се употребяват според предписанията, нежеланите реакции могат да се проявят много рядко. При чувствителни хора по-високи от предписаните дози могат да причинят стомашно-чревни разстройства.

Възможни са и алергични реакции.

*Ако наблюдавате каквито и да е нежелани реакции, дори и те да не са описани в тази информация за пациента, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.*

**Съхранение и срок на годност**  
*Да се съхранява на място, недостъпно за деца.*

Да се съхранява под 25°C, Да се пази от влага и светлина:

*Не употребявайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.*

**Информация за предписване**  
Без лекарско предписание.

**Опаковка**  
30 таблетки за смучене

**Произведено от**  
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

**Редакция**  
18 септември 2001