

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 25.09.2006

Информация за пациенти

## Листовка за пациента

**Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация.**

Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва да го използвате внимателно за да получите най-добри резултати от него.

- Пазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Питайте Вашия фармацевт, ако се нуждаете от повече информация или от съвет.
- Вие ще трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако симптомите се влошат или ако не се подобрят след 3 дни.

### **В тази листовка:**

1. Какво е Septolet Apple и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате Septolet Apple
3. Как да приемате Septolet Apple
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на Septolet Apple
6. За по-пълна информация

**Septolet Apple lozenges 1.2 mg**

Cetylpyridinium chloride

Септолете Ябълка таблетки за смучене 1.2 mg

Цетилпиридин хлорид

### **Антисептик за уста и гърло**

**с аромат на зелена ябълка**

- Активно вещество: cetylpyridinium chloride.
- Помощни вещества: течен малтитол, манитол, левоментол, лимонено масло, глицерол, рициново масло, натурално, силициев диоксид, безводен, магнезиев стеарат, повидон, аромат на ябълка, оцветители: Е 171, Е 141, Е 100, капол 600 фарма, малтитол.

Производител и притежател на разрешението за употреба  
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenia.

### **1. КАКВО Е SEPTOLET APPLE И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?**

Всяка таблетка за смучене съдържа 1.2 mg cetylpyridinium chloride.

Тези таблетки за смучене се предлагат в кутии по 18. Кутиите съдържат 2 блистъра по 9 таблетки за смучене. Таблетките за смучене са зелени на цвят, кръгли и леко биконвексни.

Таблетките за смучене Septolet Apple притежават локално антимикробно действие. Те съдържат антисептика cetylpyridinium chloride, който разрушава редица бактерии и гъби и със сигурност до голяма степен поддържа развитието на някои вируси. Таблетките за смучене облекчават възпалението в устата и гърлото, но най-вече те предпазват от развитие на тежки бактериални възпаления. Благодарение на своите добри овлажняващи свойства и ниско повърхностно напрежение, cetylpyridinium chloride прониква също през части на оралната и фарингеалната лигавица, които е трудно да се достигнат и поддържа бактериалния растеж.

Таблетките за смучене Septolet Apple имат приятен и освежаващ вкус на зелена ябълка. Те не съдържат захар, от която се нуждаят бактериите за своя растеж, по тази причина те не причиняват разрушаване на зъбите и ефектът на антисептиците е много по-добър.

**Таблетките за смучене се препоръчват:**

- За локално лечение на леки инфекции на устата и гърлото (фарингит, ларингит, начало на ангина),
- При възпаление на венците и устната лигавица (стоматит, гингивит),
- При симптоми на простуда и грип като болка, сухота и дразнене в гърлото, лош дъх при възпалителни процеси в устната кухина и гърлото, пресипналост.

## 2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ SEPTOLETE APPLE

**Не приемайте Septolet Apple:**

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към cetylpyridinium chloride или някое от помощните вещества на Septolet Apple.

**Обърнете специално внимание при прием на Septolet Apple:**

- ако имате отворени раны в устата, защото cetylpyridinium chloride забавя заздравяването на раните.
- Ако имате тежка инфекция, придружена с висока температура, главоболие и повръщане, трябва да се консултирате с лекар и по-специално, ако състоянието не се подобри след 3 дни.
- Ако сте диабетик трябва да имате предвид, че всяка таблетка за смучене съдържа 1 g maltitol. Поради слабата си хидролиза и абсорбция в стомашно-чревния тракт, maltitol повлиява слабо нивото на кръвната захар.

Не се препоръчва да се приемат по-високи дози от предписаните.

Таблетките за смучене не се препоръчват за деца под 4 годишна възраст.

#### **Прием на Septolet Apple с храна и течности:**

Не трябва да приемате таблетките за смучене непосредствено преди хранене и едновременно с мляко.

#### **Бременност**

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.

Поради ограничени данни относно безопасността на лекарствения продукт по време на бременност, употребата му не се препоръчва.

#### **Кърмене**

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.

Поради ограничени данни относно безопасността на лекарствения продукт по време на кърмене, употребата му не се препоръчва.

#### **Шофиране и управление на машини:**

Няма съобщени случаи за влияние на таблетките за смучене Septolet Apple върху способността за шофиране и управление на машини.

#### **Специални предупреждения да някои от помощните вещества на Septolet Apple:**

Таблетките за смучене съдържат естествен оцветител, затова те могат да избледнеят с течение на времето, ако се съхраняват на светло.

Таблетките за смучене съдържат полиоли (малбитол, манитол), които могат да причинят диария при високи дози. Високите дози глицерол могат да причинят главоболие и стомашно-чревни нарушения.

#### **Прием на други лекарствени продукти:**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или вече сте приели някои други лекарствени продукти, дори и такива, които се отпускат без рецептa.

Няма съобщения за лекарствени взаимодействия на таблетките за смучене Septolet Apple с други лекарствени продукти.

### **3. КАК ДА СЕ ПРИЕМАТ SEPTOLETE APPLE**

Винаги приемате Septolet Apple съгласно лекарските препоръки. Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт ако не сте сигурни как да ги приемате. Обичайната доза за възрастни и деца над 12 годишна възраст е 8

таблетки за смучене дневно. Разтваряйте по 1 таблетка за смучене в устата на всеки 2 до 3 часа.

За деца над 4 годишна възраст се препоръчват до 4 таблетки за смучене дневно, докато при деца от 10 до 12 годишна възраст – до 6 таблетки за смучене дневно. Разтваряте по 1 таблетка в уста на всеки 3 до 4 часа.

Не приемайте таблетките за смучене непосредствено преди или по време на хранене.

Ако имате впечатление, че ефектът на Septolet Apple е твърде силен или твърде слаб, се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

#### **Ако приемете повече Septolet Apple отколкото трябва**

Имайки предвид количеството на активното вещество във всяка таблетка за смучене, възможността от предозиране е минимална. Приемането на голям брой таблетки за смучене може да причини стомашно-чревни нарушения, гадене, повръщане и диария. В такива случаи трябва да спрете приема на лекарствения продукт, да приемете по-голямо количество вода или мляко и да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

#### **Ако забравите да приемете Septolet Apple:**

Не взимайте двойна доза, с която да компенсирате пропуснатата.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарствени продукти и Septolet Apple може да причини нежелани реакции.

Ако приемате лекарствения продукт съгласно препоръките, нежелани реакции се наблюдават рядко. При чувствителни хора, по-високи от предписаните дози, могат да причинят стомашно-чревни нарушения поради дразнене на стомашно-чревните лигавични мембрани. Признания на свръхчувствителност (алергия) към лекарствения продукт се наблюдават в много редки случаи.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива неспоменати в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.


### **5. СЪХРАНЕНИЕ НА SEPTOLETE APPLE**

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се пази от светлина и влага. Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Срок на годност





-Не трябва да използвате лекарствения продукт след срока на годност, отбелязан на опаковката.

**Информация за предписване**  
Без лекарско предписание.

**Дата на последна корекция**  
15 декември 2004

## 6. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

За по-пълна информация, моля, свържете се с местния представител на производителя и притежателя на разрешението за употреба.

Представителство в България  
KRKA, София, ул “Якубица” 19  
Тел. 02 962 34 50  
[info@krka.bg](mailto:info@krka.bg)

**Тази листовка е одобрена**

