

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Septolete plus lozenges**  
Benzocaine, cetylpyridinium chloride  
**Септолете плюс таблетки за смучене**  
бензокаин, цетилпиридин хлорид

**Двойно действие**  
**При болезнено гърбо**  
**антисептик**

Допълнителна АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-1349 / 28.12.07
Одобрено: №4/26.11.2007

*Прочетете внимателно упътването, преди да започнете да вземате това лекарство, защото то съдържа важна за вас информация.*

*Този лекарствен продукт се дава без рецепта за лечение на по-леки заболявания без лекарска намеса. Независимо от това, вие трябва да използвате лекарството внимателно, за да имате максимален ефект от него.*

*- Запазете листовката. Може да ви се наложи да я прочетете отново.*

*- Ако имате нужда от допълнителна информация или съвет, консултирайте се с Вашия фармацевт.*

*- Трябва да се консултирате с лекар, ако не почувствате подобрение след 3-дневно лечение.*

*- Ако някои от нежеланите реакции станат сериозни, или ако забележите нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.*

### **В листовката:**

1. Какво е Septolete plus и за какво се използва?
2. Преди да приемете Septolete plus
3. Как да приемате Septolete plus
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да се съхранява Septolete plus
6. Допълнителна информация

### **1. КАКВО Е SEPTOLETE PLUS И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?**

Таблетките за смучене Septolete plus оказват местно обезболяващо и антимиembroно действие. Така те дезинфекцират устната кухина и гърлото и облекчават болката там.

Таблетките за смучене съдържат антисептиката цетилпиридин хлорид, който унищожават някои бактерии и гъбички, а също в известна степен потиска развитието на вирусите. По този начин той успокоява възпалената уста и фаринкса и преди всичко предотвратява развитието на по-тежки бактериални инфекции. Тъй като може лесно да бъде овлажнен и има по-малко повърхностно съпротивление, цетилпиридин хлорид прониква и в труднодостъпните части на лигавицата на устата и гърлото където потиска бактериалния растеж.

Бензокаин е местен анестетик, подходящ за облекчаване на болката при гълтане, която често съпровожда инфекциите и възпаленията на устата и гърлото.

Таблетките за смучене Septolete plus съдържат полиолите малитол и манитол. Те не съдържат захар, която е необходима за бактериалния растеж.



Septolete plus са подходящи за диабетици, те не причиняват образуване на зъбна плака, а антисептичният им ефект е много по-добър поради липсата на захар в тях.

Таблетките за смучене Septolete plus се препоръчват за облекчаване на болката и за дезинфекция:

- при леки инфекции на устната кухина и гърлото (фарингити, ларингити, начало на ангина (силно болезнено гърло)).
- при възпаление на венците и на лигавицата на устата (гингивити, стоматити) ;

## 2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ SEPTOLETE PLUS

### **Не трябва да използвате таблетките за смучене Septolete plus**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към бензокаин, цетилпиридин хлорид или към някое от помощните вещества на Septolete plus.

### **Обърнете специално внимание на Septolete plus**

- Ако имате отворена рана в устата, тъй като цетилпиридин хлорид забавя зарастването на раните.
- Ако имате по-тежка инфекция, придружена с висока температура, главоболие и повръщане, трябва да се консултирате с вашия лекар, и то най-вече, ако симптомите ви не се подобрят след 3 дни;
- Ако сте пациент с диабет, трябва да знаете, че всяка таблетка за смучене съдържа 1 g малтитол. Поради забавена хидролиза и абсорбция в стомашно-чревния тракт, малтитол слабо повлиява нивото на кръвната захар.

Таблетките за смучене Septolete plus не се препоръчват при деца под 6 годишна възраст. Не се препоръчва приемането на дози, по-високи от предписаните.

### **Прием на други лекарствени продукти**

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, които са без рецепта.

Не е известно Septolete plus да влияе върху ефектите на други лекарствени продукти.

### **Прием на таблетките за смучене Septolete plus с храната и напитки**

Не трябва да вземате таблетките за смучене Septolete plus непосредствено преди хранене или с прясно мляко.

### **Бременност и кърмене**

*Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да вземате каквото и да е лекарствено средство.*

Тъй като данните за безопасност по време на бременност и кърмене са ограничени, не се препоръчва приемането на таблетките за смучене Septolete plus по време на бременност и кърмене.

### **Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

Не е докладвано таблетките за смучене Septolete plus да влияят на способността за шофиране и работа с машини.

### **Важна информация за някои от помощните вещества на Septolete plus**



Septolete plus лозенги съдържат малтитол. Ако имате непоносимост към някои видове захари, информирайте Вашия лекар за това.

### 3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА SEPTOLETE PLUS

Винаги приемайте Septolete plus точно както ви е казал Вашия лекар. Ако за нещо не сте сигурен, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчаната дозировка за лица в зряла възраст и деца над 12 години е до 8 таблетки за смучене на ден. Трябва да смучете по 1 таблетка на всеки 2 до 3 часа.

При деца от 6- до 12-годишна възраст се препоръчват до 4 таблетки за смучене на ден. Тези деца трябва да смучат по 1 таблетка на всеки 4 часа.

#### **Ако вземете повече таблетки за смучене Septolete plus, отколкото е нужно**

Като се има предвид какво е количеството на активните съставки в една таблетка за смучене, възможността за предозиране е минимална. Погълщането на голям брой таблетки за смучене, може да доведе до стомашно-чревни проблеми: гадене, повръщане и диария. В такива случаи трябва да спрете да вземате лекарството, да пиете много вода или прясно мляко и да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

#### **Ако забравите да вземете Septolete plus**

Не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

*Подобно на другите лекарствени средства, таблетките за смучене Septolete plus може също да причинят нежелани реакции, въпреки че не всички могат да ги проявят.*

Ако таблетки за смученете Septolete plus се употребяват според предписанията, нежеланите реакции са редки. При чувствителни хора, по-високи от предписаните дози може да причинят стомашно-чревни разстройства поради дразнене на лигавичната мембрана на стомашно-чревния тракт.

Много рядко могат да настъпят алергични реакции.

*Ако наблюдавате каквато и да било нежелана реакция, дори и тя да не е описана в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.*

.

### 5. КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВА SEPTOLETE PLUS

Да се пази от влага и светлина. Да се съхранява под 25°C.

**Да се съхранява на места, недостъпни за деца.**

*Не употребявайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.*

#### **Срок на годност**

Septolete plus не трябва да се използва след срока на годност, който е отбелязан на опаковката. Срока на годност се отнася до последния ден от месеца.



## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа Septolete plus

- Активните вещества са benzocaine(бензокаин) и cetylpyridinium chloride (цетилпиридин хлорид). Всяка таблетка за смучене съдържа 5 mg benzocaine и 1 mg cetylpyridinium chloride.

Помощни вещества са: ментово есенциално масло, левоментол, малтитол течен, малтитол, манитол, глицерол, рициново масло, магнезиев стеарат, колоиден силиций, безводен, повидон, фармацевтичен восък, титаниев диоксид (E171), син оцветител V (E131).

### Как изглежда Septolete plus и съдържанието на опаковката

Таблетите за смучене са сини на цвят, кръгли, двойноизпъкнали и лъскави.

Таблетите за смучене се предлагат в опаковки по 30, в блистерно фолио. Всяка кутия съдържа 3 блистера по 10 лозенги.

### Информация за предписване

Без лекарско предписание.

### Производител и притежател на разрешението за употреба

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

### Дата на последна корекция на листовката

8 декември 2006

