

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SERMION®

Сермион®

30 mg филмирани таблетки
ницерголин (*nicergoline*)

ИЗПЪЛНИТЕЛ	АРГУМЕНТА
Диспозитивна Приложение 2	
Към РУ №: 11-4085, 29.01.09	
Одобрено: 27 / 25.11.08	

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Сермион 30 mg филмирани таблетки и за какво се използва
2. Преди да приемете Сермион 30 mg филмирани таблетки
3. Как да приемате Сермион 30 mg филмирани таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Сермион 30 mg филмирани таблетки
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕРМИОН 30 mg филмирани таблетки И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Сермион е принадлежи към група лекарства, наречени ерго-алкалоиди, които се използва за лечение на състояния, характеризиращи се с влошаване на познавателната функция, състояния след инсулт, съдова деменция (мултиинфарктна деменция), дегенеративни състояния, свързани с деменция (сенилна и пре-сенилна деменция от типа Алцхаймер, деменция на Паркинсон), поради това, че има благоприятен ефект не само върху познавателните дейности, но и върху смущения в настроението и поведението.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ СЕРМИОН 30 mg филмирани таблетки


Не приемайте лекарството ако

- сте алергични (свръхчувствителни) към ницерголин или към някоя от останалите съставки на лекарството или други ерго-алкалоиди;
- сте прекарвали наскоро миокарден инфаркт;
- имате остър кръвоизлив;
- имате ортостатизъм (замайване или загуба на съзнание при изправяне от легнало положение);
- имате тежка брадикардия (забавена сърдечна дейност).

Обърнете специално внимание при употребата на Сермион 30 mg филмирани таблетки

- ако имате повишени стойности на пикочната киселина или страдате от подагра
- ако имате хипертония лекарството може да причини постепенно понижаване на кръвното налягане

Прием на други лекарства



Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарства, които се използват за понижаване на кръвното налягане, ацетилсалицилова киселина и лекарства за лечение на подагра или за понижаване на нивата на пикочната киселина.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите се посъветвайте с Вашия лекар, за да Ви каже как да приемате Вашето лекарство. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Тъй като ефекта върху способността за шофиране и работа с машини не е специално проучен, винаги подхождайте с внимание в тези ситуации.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СЕРМИОН 30 mg филмирани таблетки

Винаги приемайте Сермион 30 mg филмирани таблетки точно както Ви е казал Вашия лекар. Препоръчаната дневна доза е една филмирана таблетка веднъж или два пъти дневно. При възрастни:

Обичайната дневна доза е 1 таблетка, но временно дневната доза може да се увеличи до две таблетки. Ако имате бъбречно заболяване, Вашият лекар може да реши да намали дозата на лекарството.

Дозата трябва да се приема сутрин и преди основното хранене, с малко течност и без да се съдъвква.

Ако сте приели повече от необходимата доза Сермион 30 mg филмирани таблетки

Предозиране: може да настъпи преходно понижение на кръвното налягане. Консултирайте с лекар ако приемете повече таблетки от предписаното!

Ако сте пропуснали да приемете Сермион 30 mg филмирани таблетки

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Продължете приема на таблетките по обичайния начин. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели приема на Сермион 30 mg филмирани таблетки


Не спирайте да вземате Сермион 30 mg филмирани таблетки, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да направите това.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Сермион 30 mg филмирани таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Рядко се съобщават нежелани лекарствени реакции, които обикновено не са клинично тежки: хипотония и замаяност, стомашни смущения, главоболие, объркване, диария, запек, гадене, чувство на затопляне, топли вълни, сънливост, безсъние, увеличения на нивото на пикочна киселина в кръвта.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.



5. СЪХРАНЕНИЕ НА СЕРМИОН 30 mg филмирани таблетки

Да се съхранява при температура под 25°C.

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

Не използвайте Сермион 30 mg филмирани таблетки след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Сермион 30 mg филмирани таблетки

- Всяка филмирана таблетка съдържа 30 mg от активната съставка ницерголин
- Другите съставки са
 - Сърцевина на таблетката: кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, калциев хидроген фосфат дихидрат
 - Филмово покритие: силикон, железен оксид (E 172, жълт), макрогол 6000, титанов диоксид (E171), хипромелоза

Как изглежда лекарството и какво съдържа опаковката

Жълти, кръгли, двойно-изпъкнали филмирани таблетки.

Чупещата се повърхност е бяла.

Опаковка: 30 mg филмирани таблетки в прозрачни PVC/PVDC//Al/PVdC блистери поставени в картонена кутия. Опаковка от 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer Enterprises SARL

Rond-point du Kirchberg

51, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Люксембург, В. Х. Люксембург

Производител

Pfizer Italia S.r.l.

Via del Commercio

63046 Marino del Tronto

Ascoli Piceno, Италия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Дата на последно одобрение на листовката {мм /гггг}.

