

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ИЗБЪЛНУВАЕЩА СЕРВИСНА КОМПЮТЪР А
Листовка - Препоръка №: 3037 / 19.09.08
Одобрено: 21 / 29.07.08

SMECTA powder for oral suspension in sachets
СМЕКТА прах за перорална суспензия в сашета

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СМЕКТА

Качествен състав

Двосмектит 3.000 g за саше

Diosmectite 3.000 g за саше

Лекарствена форма

Прах за перорална суспензия

Кутия от 30 и 60 сашета

Фармацевтичен клас

Антидиаричен препарат

Гастроинтестинален протектор

(А:храносмилателна и метаболитна система)

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ИЗПОЛЗВА ТОВА ЛЕКАРСТВО
(ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ)

Това лекарство се препоръчва при лечение на диарии и болки свързани с хранопровода, стомаха и червата.

ВНИМАНИЕ

Специални предупреждения

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако смущенията не изчезнат до 7 дни

Ако болките са съпътствани от температура или повръщане консултирайте се веднага с вашия лекар.

Да се държи извън обсега на деца!

Лекарствени взаимодействия

Не трябва да се взимат в един и същи момент СМЕКТА и друго лекарство.

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, ТРЯБВА РЕДОВНО ДА ИНФОРМИРАТЕ ЛЕКАРЯ ИЛИ ФАРМАЦЕВТА СИ ЗА ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, КОИТО ПРИЕМАТЕ.

АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ НЕПРЕМЕННО ПОПИТАЙТЕ ЛЕКАРЯ ИЛИ ФАРМАЦЕВТА СИ ЗА СЪВЕТ.



КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОБА ЛЕКАРСТВО

- Лечение на остра диария

При кърмачета и деца:

Под 1 година: 2 сашета дневно в подължение на 3 дни и след това по 1 саше дневно.

Над 1 година: 4 сашета дневно в подължение на 3 дни и след това по 2 сашета дневно

При възрастни

Препоръчаната дневна доза е 6 сашета дневно

- Лечение при други показания

При деца:

- под 1 година: 1 пликче дневно

- между 1 и 2 години: 1 до 2 пликчета дневно

- над 2 години: 2 до 3 пликчета дневно

При възрастни

Средно по три сашета дневно.

Начин на приложение

При кърмачета и деца

Съдържанието на сашето може да се разтвори в бебери или бутилка с 50 ml вода и да се дава през деня или да се смеси добре с полутечна храна: каша, задушени плодове, зеленчуково пюре и бебешка храна.

При възрастни:

Средно 3 пликчета дневно. Съдържанието на сашето се суспендира в половин чаша хладка вода.

Ретенционна клизма: 1 до 3 клизми дневно с 1 до 3 сашета, разтворени в 50 до 100 ml топла вода.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

През устата

Съдържанието на сашето трябва да се суспендира непосредствено преди употреба. Препоръчва се приемането на диосмектит да става след ядене при пациенти с езофагит и между ядене при другите показания.



Деца

Съдържанието на сашето може да се разтвори в бутилка с 50 мл вода и да се дава през деня или да се смеси добре с полутечна храна: каша, задушени плодове, зеленчуково пюре и бебешка храна.

При възрастни

Съдържанието на сашето се разтваря в 50 до 100 мл хладка вода

За препоръчване е да се прилага:

- след хранене при езофагит
- между храненията при другите показания

Продължителност на лечението

Ако симптомите не се подобрят до 7 ден, консултирайте се с вашия лекуващ лекар

Нежелани лекарствени реакции

Нежеланите ефекти са били винаги незначителни и краткотрайни, засягащи само чревния тракт

Наблюдават се много редки случаи на развитие или влошаване на запек.

Лечението може да продължи след намаляване на дозата.

УВЕДОМЯТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЯКА НЕЖЕЛАНА РЕАКЦИЯ НЕ ПОСОЧЕНА В ТАЗИ ЛИСТОВКА

Притежател на разрешението за употреба

BEAUFOUR IPSEN PHARMA

24, rue Erlanger

75016 Paris, ФРАНЦИЯ

Производител

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE,

Rue Ethe Viron.26100 Dreux Cedex, ФРАНЦИЯ

СЪХРАНЕНИЕ

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛЕКАРСТВОТО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ, ОТБЕЛЯЗАН НА ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Преди да го изхвърлите разбъркайте във вода съдържанието на сашетата и го излейте в канализацията!

Дата на актуализация на листовката Януари 2008

