



Solpaflex* Gel

Моля прочетете листовката внимателно.

Състав: Solpaflex Gel съдържа лекарствено вещество Ibuprofen 5% w/w.

Като помощни вещества съдържа: метилиран спирт, карбомер, пропилен гликол, диетиламин, дестилирана вода.

Solpaflex Gel е в алуминиева туба, съдържаща 30гр.

Показания: Solpaflex Gel е показан за локално лечение на ревматична и мускулна болка, навяхвания, болки в гърба и невралгия. Solpaflex Gel е показан и за симптоматично облекчаване на болки при леки форми на артрит.

Характеристики: Solpaflex Gel е прозрачен, безцветен гел, съдържащ ибупрофен. Ибупрофен е от групата на нестероидните, противовъзпалителни лекарства, които успокояват болката, намаляват отока и облекчават възпалението. Гелът е специално разработен за постигане на бърза абсорбция на ибупрофен през кожата и ефективно облекчаване на болката.

Противопоказания: **Не прилагайте това лекарство:**

- ако сте алергични към ибупрофен или аспирин, или към някоя от другите съставки;
- ако сте астматик;
- ако сте бременна или кърмите;
- ако кожата е наранена;
- близо до очите, носа и устата.

Предупреждения / внимание при употреба: Преди да използвате Solpaflex Gel, консултирайте се с Вашия лекар, ако:

- имате стомашна и/или дуоденална язва (също така наричана пептична язва);
- някога сте имали проблеми с бъбреците;
- някога сте страдали от астма;
- сте показали непоносимост към аспирин или ибупрофен, приети перорално.

Дозировка:

Възрастни и деца на и над 14 години:

Отворете капачката и използвайте острия ѝ придатък, за да пробие мембраната на отвора. Нанесете гела върху засегнатите области, до три пъти на ден или както е предписал лекарят. Всеки път нанасяйте само необходимото количество гел за образуване на тънък слой върху засегнатата област, и леко масажирате кожата до пълно абсорбиране на гела. Не използвайте в излишни количества.



SOLPAFLEX Gel
Листовка за пациента .

Не използвайте повече от две - три седмици, освен ако лекаря не Ви препоръча друго.

Да не се използва при деца под 14 години освен по лекарски съвет.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Нежелани лекарствени реакции: При повечето хора, Solpaflex Gel няма да доведе до никакви проблеми. Въпреки това, както при всички лекарства, понякога могат да се появят нежелани лекарствени реакции. Рядко може да се наблюдава кожен обрив и при такива случаи използването на гела трябва да спре. Ако наблюдавате някакви необичайни реакции, спрете употребата на Solpaflex Gel и се консултирайте с Вашия лекар.

Срок на годност: 3 години. Да не се приема след датата, посочена на опаковката.

Условия на съхранение: Съхранявайте гела в оригиналната му опаковка при температура под 25⁰С. Винаги затваряйте опаковката след употреба.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Притежател на разрешението за употреба:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Brentford, TW8 9GS, UK

(лого) GSK GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Brentford, TW8 9GS, UK

* Solpaflex е запазена търговска марка.

Дата на одобрение на листовката

