



Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да използвате този лекарствен продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, моля, питайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако след прием на Солволан кашлицата продължава повече от 5 дни, моля, посъветвайте се с Вашия лекар.

Solvolan® 30 mg tablets
Ambroxol
Солволан 30 mg таблетки
амброксол

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВНОТО ДЕЛА И ПОЛИТИКАТА
Листовка - Приложение 2
№ МРУ №: 11-2930, 29.07.08
Одобрено: 13 / 26.02.08

Активно вещество: амброксолов хидрохлорид (*ambroxol hydrochloride*).

Помощни вещества: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, царевично нишесте, повидон и магнезиев стеарат.

Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Тази листовка съдържа:

1. Какво е Солволан и за какво се използва
2. Преди да приемете Солволан
3. Как да се приема Солволан
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Солволан

1. КАКВО Е СОЛВОЛАН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Състав

1 таблетка съдържа 30 mg амброксолов хидрохлорид.

Опаковка

Картонена кутия с 20 таблетки в блистерна опаковка.

Какво е Солволан?

Солволан намалява жилавостта и гъстотата на бронхиалната лигавица, улеснява отхрачването, облекчава затрудненото дишане, потиска кашличния рефлекс и повишава устойчивостта към респираторни инфекции.

За какво се използва Солволан?


Лекарственият продукт е показан за лечение на остри и хронични респираторни заболявания, придружени от кашлица и отхрачването на гъсти (вискозни) храчки.

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ СОЛВОЛАН

Кой не трябва да приема Солволан?

Не трябва да приемате този лекарствен продукт, ако:

- Имате известна свръхчувствителност към амброксол или към някое от помощните вещества на лекарствения продукт
- При наличие на тежко чернодробно или бъбречно увреждане





По време на лечение със Солволан пийте повече течности отколкото обикновено.
Не давайте таблетките на деца под 14 годишна възраст.
Пациентите със стомашна язва трябва да бъдат внимателно проследявани.

Прием на Солволан с храна и напитки

Приемайте лекарственият продукт след хранене.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.

Независимо, че няма доказателства, че Солволан има увреждащ ефект върху плода, риск не може да бъде изключен. Затова той не се препоръчва по време на бременност.

Тъй като не е известно дали Солволан преминава в майчината кърма, приложението му по време на кърмене не се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не е известно Солволан да влияе върху способността на пациентите да шофират или работят с машини.

Как другите лекарствени продукти могат да взаимодействат със Солволан?

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти. Вие можете да приемате Солволан едновременно с други лекарствени продукти за лечение на респираторни и сърдечни заболявания и с антибиотици.

Ако имате каквито и да било въпроси относно едновременното използване на споменатите лекарствени продукти и Солволан, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА СОЛВОЛАН

Дозировка и начин на приложение

Солволан таблетки е предназначен за лечение на възрастни и деца над 14 годишна възраст.

Обичайната доза на таблетките Солволан при възрастни и деца над 14 годишна възраст е по 1 таблетка три пъти дневно. В случай на продължително лечение (повече от 10 дни), пациентът трябва да приема по 1 таблетка 2 пъти дневно.

Приемайте таблетките след хранене, с течност.

Ако приемете повече Солволан отколкото би трябвало

Ако приемете по-висока доза от лекарствения продукт, или дадете на детето си такава, отколкото би трябвало, трябва да се консултирате с Вашия лекар незабавно!

Ако забравите да вземете Солволан


Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата доза!

Вземете следващата доза в обичайното време.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства и Солволан може да има нежелани реакции.

Честотата се определя като: много чести ($\geq 1/10$), чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечести ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$), редки ($\geq 1/10000$ до $< 1/1000$), много редки ($\leq 1/10000$) или с неизвестна честота (не може да се прецени от наличните данни).



Нарушения на нервната система

- чести: главоболие.

Дихателни, торакални и медиастинални нарушения

- редки: изсушаване на лигавицата на дихателния тракт, хрема.

Стомашно-чревни нарушения

- чести: гадене, повръщане, диария, гастроинтестинални нарушения (лошо храносмилане).
- редки: сухота в устата, повишено слюноотделяне, запек.

Бъбречни и уринарни нарушения

- редки: дизурия (неприятно усещане при уриниране).

Общи нарушения и състояния на мястото на приложение

- много редки: умора.

Нарушения на имунната система

- редки: реакции на свръхчувствителност (особено кожни).

Нежеланите реакции са редки и леки и преустановяване на лечението може да се наложи по изключение.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, включително и такива, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

4. СЪХРАНЕНИЕ НА СОЛВОЛАН**Срок на годност**

Да не се използва след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Условия за съхранение

Да се пази от светлина и влага. Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Информация за предписване

Без лекарско предписание.

Дата на последна корекция

20 март 2008

