

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт.

Наименование на лекарствения продукт:

Acic®

/Ацик/

Кое е активното вещество?

1 g крем съдържа 50 mg aciclovir.

Какво друго съдържа Acic® крем?

Макроглицеролови стеарати, диметикон, цетилов алкохол, течен парафин, бял вазелин, пропиленгликол, пречистена вода.

Лекарствена форма и опаковка

Крем

Оригинални опаковки, съдържащи 2 g крем.

Кой е отговорен за продажбата на Acic® крем?

Hexal AG

Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Germany

Кой е отговорен за производството на Acic® крем?

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Germany

Какво представлява Acic® крем?

Acic® крем за херпес на устата е продукт за лечение на вирусни инфекции (виростатик).

За какво се използва Acic® крем?


Продуктът се прилага за облекчаване на болката и сърбежа при случаи на често повтарящи се херпесни инфекции с образуване на мехурчета в областта на устата (рецидивиращ Herpes labialis).

Кога не трябва да приемате Acic® крем?

Вие не трябва да прилагате Acic® крем, ако сте свръхчувствителни към ацикловир или към някоя от другите неактивни съставки на продукта, както и към валацикловир.

В какви случаи можете да използвате Acic® крем само след консултация с лекар?

Acic® крем може да се прилага при определени заболявания само при определени условия или специално внимание. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако имате сериозно нарушение в имунната система.



Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Acic® крем или могат да бъдат повлияни от препаратата?

Известни са взаимодействия с циметидин.

С какво трябва да се съобразяват децата и възрастните пациенти при приложение на Acic® крем?

Няма специални инструкции за приложението на продукта при деца и възрастни.

Какви специални предпазни мерки трябва да се вземат при бременност и кърмене?

Няма налични данни за приложение на продукта при бременност и кърмене.

С какво да се съобразявате при шофиране или при работа с машини?

Няма данни за нарушена способност за шофиране или работа с машини по време на лечение с Acic® крем.

Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Ако няма друго предписание на Acic® крем от Вашия лекар, се препоръчва следната дозировка. Моля, придържайте се към указанията за употреба, тъй като в противен случай Acic® крем няма да действа правилно.

В каква доза и колко често можете да прилагате Acic® крем?

Кремът трябва да се нанася на тънък слой върху инфектираните области от кожата 5 пъти дневно през 4 часа.

Кога и как можете да прилагате Acic® крем?

Acic® крем за херпес на устата трябва да се нанася с помощта на памучен тампон, който се покрива с такова количество от крема, което съответства на големината на инфектирания участък от кожата. Трябва да се внимава кремът да се нанесе не само върху участъците с видим херпес (мехурчета, оток, зачервяване), но също и върху съседните участъци от кожата. Ако кремът се нанася с ръка, ръцете трябва да бъдат добре измити преди и след приложение, за да се избегне по-нататъшна инфекция на засегнатия кожен участък (напр. от бактерии) или чрез разнасяне на вируси върху неинфектираната лигавица и участъци от кожата.


Забележка:

За да се постигне възможно най-добър резултат от лечението, кремът трябва да се нанесе още при първите симптоми на херпесната инфекция (парене, сърбеж, усещане за напрежение и зачервяване).

Колко дълго можете да прилагате Acic® крем?

Продължителността на лечение се определя от лекуващия лекар.

Продължителността на лечение на инфекции с херпес симплекс е 5 дни. В отделни случаи лечението протича докато мехурчетата образуват коричка или изчезнат. Независимо от това, продължителността на лечение не трябва да надвишава 10 дни.



Какво трябва да предприемете, ако Acic® крем е бил приложен в много големи количества (преднамерено или неумишлено предозирание)?

Не се очакват интоксикации след предозирание с Acic® крем.

Какво трябва да направите, ако сте приложили по-малко от предписаната доза Acic® крем или сте пропуснали да приложите продукта?

Моля, продължете лечението както е предписано (моля, не нанасяйте по-често или повече крем).

Какво трябва да знаете, ако сте прекъснали лечението или сте го прекратили преждевременно?

За успешно лечение е важно да нанасяте Acic® крем за херпес на устата за достатъчно дълъг период от време (виж също "Дозировка, начин и продължителност на лечение").

Какви нежелани реакции може да предизвика приложението на Acic® крем?

След приложение на Acic® крем за херпес на устата може да се наблюдава временно усещане за парене или смъдене на третирани участъци от кожата. Рядко са били наблюдавани зачервяване, изсушаване, сърбеж и олющване на кожата, третирана с крема.

В редки случаи са били съобщени алергични кожни реакции (контактен дерматит) след приложение на Acic® крем за херпес на устата. При провеждане на алергични тестове в повечето случаи е било установено, че причина за появата на такива реакции са били помощните вещества в състава на основата на крема, а не активната съставка aciclovir.

Контактният дерматит може да бъде свързан със засилване на гореспоменатите нежелани лекарствени реакции и разнасянето на инфекцията извън областите на кожата, третирани с крема. Моля, консултирайте се с Вашия лекар в този случай.

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са отбелязани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекуващ лекар или фармацевт.

Какви мерки трябва да бъдат взети във връзка с нежеланите лекарствени реакции?

Моля, информирайте Вашия лекар, ако възникнат такива реакции, за да може той да прецени степента и тежестта им и, ако е необходимо, да се предприемат съответни мерки.

Инструкции за съхранение:

Срокът на годност на лекарството е напечатан върху опаковката.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Как трябва да се съхранява Acic® крем?

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Дата на последната редакция на листовката:

Юли 2005

