

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Спиронолактон- Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки
Спиронолактон- Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки
Спиронолактон- Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки

Spironolacton- Tchaikapharma 25 mg film-coated tablets
Spironolacton- Tchaikapharma 50 mg film-coated tablets
Spironolacton- Tchaikapharma 100 mg film-coated tablets

(Спиронолактон / Spironolactone)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 11-4003-5, 19.01.09

Одобрено: 26/11.11.08

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Спиронолактон-Чайкафарма и за какво се използва
2. Преди да приемете Спиронолактон-Чайкафарма
3. Как да приемате Спиронолактон-Чайкафарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Спиронолактон-Чайкафарма
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СПИРОНОЛАКТОН- ЧАЙКАФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА


Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg, 50 mg, 100 mg съдържат като активното вещество съответно 25 mg и 50 mg, 100 mg спиронолактон.

Таблетките са филмирани, т. е. са покрити с предпазваща обвивка.

Активната съставка спиронолактон е диуретик и действа върху бъбреците и надбъбречните жлези. Спиронолактон стимулира отделянето на урина при пациенти с натрупване на течности в тъканите (оток) или в корема (асцит) чрез повишаване на отделянето на натрий в урината. По този начин възможната загуба на калий при другите диуретици се намалява. Антихипертензивният (понижаващия кръвното налягане) ефект на спиронолактона се дължи на освобождаването на сол и вода.

Таблетките Спиронолактон- Чайкафарма от 25 mg, 50 mg и 100 mg се използват за лечение на:

- задържане на течност в тялото (оток) в резултат на сърдечни оплаквания, особено в случаи, които се поддават трудно на лечение;
- повишено кръвно налягане, като допълнение на безсолната диета и диуретиците, ако само те не са достатъчни;
- определени заболявания на бъбреците, ако диуретиците са нямали достатъчен ефект или не са подходящи за приложение;
- задържане на течност в тъканите и корема в резултат на чернодробни оплаквания;
- Диагностика и предоперативно лечение на оплаквания, при които има увеличено производство на алдостерон в надбъбречната кора (алдостеронът е хормон, който регулира обмяната на соли и вода в организма).



2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ СПИРОНОЛАКТОН- ЧАЙКАФАРМА

Не приемайте Спиринолактон- Чайкафарма

- Ако сте свръхчувствителни към спиринолактон или някое от помощните вещества на таблетките;
- Ако имате увеличено ниво на калий в кръвта;
- Ако сте бременна или кърмите;
- Ако страдате от сериозно бъбречно заболяване;
- Ако отделяте малко или почти никаква урина;
- Ако имате ограничено количество натрий в кръвта.

Спиринолактон- Чайкафарма не се препоръчва за употреба при деца под 18 години
Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Употреба на други лекарства:

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Едновременното приложение на различни лекарства понякога може да има неблагоприятни последици. Може да се появи ефект на отслабване или усилване на желаното действие или да се появят определени нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако приемате едновременно няколко лекарства, дори ако ги приемате нередовно и/ или от време на време. Вашият лекар ще прецени, дали лекарствата си взаимодействат.

Спиринолактон взаимодейства с някои антихипертензивни средства, дигоксин (за лечение на сърдечна недостатъчност), литий. Ефектът им може да се увеличи. Обратно, спиринолактон намалява ефекта на определени противосъсирващи.

При едновременната употреба на спиринолактон с определени диуретици, лекарят ще прецени възможността от прекалено покачване на калия в кръвта и ще вземе съответните мерки, за да предотврати този ефект.

Едновременното приложение на спиринолактон с така наречените ACE- инхибитори (група лекарства против високо кръвно налягане, като каптоприл, еналаприл, лизиноприл) не се препоръчва.

Едновременното приложение на спиринолактон с хепарин (противосъсирващо) може да увеличи образуването на урина.

Салицилатите (например ацетил салициловата киселина- аспирин) намаляват ефекта на спиринолактона.

Едновременното приложение на спиринолактон с други калий- съхраняващи диуретици или индометацин не се препоръчва.

Увеличената концентрация на калий в кръвта може да има нежелан ефект върху Вашето здраве, особено ако имате смущения в сърдечния ритъм.

Ефектът на понижаване на кръвното налягане на спиринолактон може да се намали при едновременната му употреба с някои антидепресанти, невролептици (успокоителни) и кортикостероиди.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате или ще приемате заедно с таблетките спиринолактон и едно или повече от посочените по- горе лекарства.


Спиринолактон може да промени някои лабораторни и диагностични тестове.

Прием на Спиринолактон-Чайкафарма с храни и напитки

По време на лечение със спиринолактон е противопоказана употребата на алкохол.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Таблетките не бива да се употребяват по време на бременност освен след консултация с Вашия лекар.



Употребата на тези таблетки следва да се прекрати по време на кърмене. Ако Вашия лекар е преценил, че лечението със спиронолактон е съществено важно за Вас, то докато приемате тези таблетки не бива да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не е известна информация за ефекта върху способността за шофиране. Могат да се появят главозамайване, объркване или главоболие. Препоръчва се пациентът да се въздържа от шофиране и работа с машини при поява на някоя от изброените нежелани реакции.

Важна информация относно някои от съставките на Спиринолактон-Чайкафарма

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СПИРОНОЛАКТОН- ЧАЙКАФАРМА

Винаги приемайте Спиринолактон- Чайкафарма точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Спазвайте дозировката, предписана от Вашия лекар. Той може да Ви предпише спиронолактон в комбинация с друг диуретик и/ или лекарство против високо налягане.

Обичайната дневна доза за възрастни е 100 mg, приложени на един или няколко приема. Ако е необходимо могат да се прилагат и по- високи начални дози.

Приемайте таблетките с половин чаша вода, за предпочитане по време на хранене. Ако приемате една доза дневно, то таблетките трябва да се приемат по време на хранене.

Спиринолактон- Чайкафарма е противопоказан при деца и подрастващи под 18 годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза

Ако са приети повече от нужните таблетки, обърнете се незабавно към лекар или най- близката болница. Запазете опаковката, за да знае лекарят, кое е лекарството.

Предозирането може да се прояви с гадене и повръщане, и (по-рядко) със сънливост, объркване, кожен обрив или диария. Могат да възникнат смущения във водно- солевия баланс и обезводняване. (виж също така “Нежелани реакции” и “Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия”)

Ако сте пропуснали да приемете Спиринолактон- Чайкафарма

Ако пропуснете прием, вземете дозата възможно най-скоро, освен ако не е време за следващия прием. В този случай не вземайте пропуснатата доза, а се върнете към предписания Ви дозов режим. Никога не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако се съмнявате, консултирайте се Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Ако сте спрели употребата на Спиринолактон - Чайкафарма

Никога не решавайте да спрете приема на тези таблетки сами- винаги първо се консултирайте с Вашия лекар. Ако внезапно спрете лечението, то могат да се появят първоначалните симптоми.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Спиринолактон-Чайкафарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции:



- прекомерно повишаване концентрацията на калий в кръвта или прекалено ниска концентрация на натрий в кръвта (особено в комбинация с други диуретици);
- стомашно- чревни смущения- колики, диария, кръвоизлив, язви, възпаление на стомашната лигавица, повръщане
- замаяност;
- объркване;
- летаргия (сънливост, апатичност); смущения в координацията;
- понижено кръвно налягане;
- обезводняване на тъканите;
- главоболие;
- кожен обрив;
- увеличаване на гърдните жлези при мъже, импотентност и намалено сексуално желание при мъже;
- менструация с лека загуба на кръв, забавена менструация, повишено окосмяване, снижаване на гласа и болезнени гърди при жени.

Нежеланите лекарствени реакции обикновено са обратими след прекратяване приема на лекарствения продукт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции е продължителна, стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА СПИРОНОЛАКТОН- ЧАЙКАФАРМА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25 °С, на сухо място в оригиналната им опаковка. Не използвайте Спиринолактон-Чайкафарма след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Спиринолактон- Чайкафарма

- Активното вещество е спиринолактон.
- Другите съставки са: лактоза, царевично нишесте, поливидон, калциев фосфат дихидрат двуосновен, пречистен талк, магнезиев стеарат, силициев диоксид, лютива мента масло, хипромелоза, макроголикол 400 и титанов диоксид (E171).

Тези лекарствени продукти съдържат лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат Спиринолактон-Чайкафарма.

Как изглежда Спиринолактон- Чайкафарма и какво съдържа опаковката
Спиринолактон- Чайкафарма 25 mg: 30 таблетки в 3 алуминиеви блистерни ленти, опаковани в картонена кутия, таблетките са бледо жълто/ кафяви на цвят.



Спиронолактон- Чайкафарма 50 mg: 30 таблетки в 3 алуминиеви блистерни ленти, опаковани в картонена кутия, таблетките са бели на цвят.

Спиронолактон- Чайкафарма 100 mg: 30 таблетки в 3 алуминиеви блистерни ленти, опаковани в картонена кутия, таблетките са бледо жълто/ кафяви на цвят.

Притежател на разрешението за употреба:

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
гр. София 1172, “Г.М. Димитров” № 1, България
тел.: 02/ 962 54 54
факс: 02/ 960 37 03
e-mail: info@tchaikapharma.com

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Име и адрес на производителя:

Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки
Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
гр.Варна 9000, ул.”Никола Вапцаров”1, България

Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
гр. Пловдив 4000, бул. “Санкт Петербург” 53, България

Дата на последно одобрение на листовката

