


**ASPERAN Effervescent Plus**  
**АСПЕРАН Ефервесцентен Плюс**



**Състав:** Acetylsalicylic acid 325 mg, натриев бикарбонат 1916 mg, лимонена киселина 1000 mg

**Показания:** Главоболие, температурни и грипни състояния, ставни и мускулни болки, зъбобол, артрит.

**Забележка:** Консултирайте се с Вашия лекар, ако страдате от сърдечно заболяване или други болести.

**Противопоказания:** кървене, лечение с антикоагуланти (противосъсирващи лекарствени продукти - кумаринови производни, хепарин и др.), дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа, полипи в носа, свръхчувствителност към аспирин (салицилати) и други нестероидни противовъзпалителни средства, стомашна или дуоденална язва, бъбречни увреждания, бременност и кърмене, диета с ограничен прием на натрий.

**Предупреждения:** АСПЕРАН Ефервесцентен Плюс не трябва да се прилага при деца и юноши със симптоми на варицела или грип. В случай на гадене, силно повръщане или повишена температура пациентите трябва да се консултират с лекар, защото тези признаци може да бъдат симптоми на рядко, но сериозно заболяване - синдрома на Reye. АСПЕРАН Ефервесцентен Плюс не трябва да се прилага в продължение на повече от 7 дни за лечение на болка или на повече от 3 дни за понижаване на температурата.

Ако болките или повишената температура продължават или се влошат, или се появят нови симптоми като зачервяване на кожата и оток, лечението трябва да се преустанови и да се направи консултация с лекар. АСПЕРАН Ефервесцентен Плюс не трябва да се приема през последното тримесечие на бременността, освен ако такова лечение е предписано от лекар и болната се проследява от него.

Лекарственият продукт трябва да се приема след пълното разтваряне на таблетките. Много е важно този лекарствен продукт да не се употребява в случай на прекомерно преяждане и препиване. Ако се появят стомашни болки, трябва да се проведе консултация с лекар.

Лекарственият продукт съдържа Na - 525 mg и трябва да се има пред вид от пациенти, които трябва да бъдат на бедна на Na диета.

**Нежелани ефекти:** В редки случаи алергични реакции със спазъм на бронхите, алергичен дерматит, много рядко стомашни оплаквания, кървене от стомашно-чревния тракт, тромбоцитопения (намаляване броя на тромбоцитите). При силно предозиране са възможни замаяване, шум в ушите, загуба на слуха, особено при деца и пациенти в напреднала възраст. В такива случаи се консултирайте с Вашия лекуващ лекар.

**Лекарствени взаимодействия:** засилва ефекта на оралните антикоагуланти (кумаринови производни и хепарин), сулфанилурейни продукти и метотрексат; засилва ефекта и нежеланите реакции на нестероидните противовъзпалителни средства. Едновременната употреба с кортикостероиди може да увеличи риска от кървене от стомашно-чревния тракт. Намалява ефекта на спиронолактон, фуросемид и урикозуричните подагрозни средства. Ако вземате други лекарствени продукти, предписани от лекар, не употребявайте този лекарствен продукт преди да се консултирате с Вашия лекуващ лекар.

**Дозировка:** Разтворете 1 до 2 таблетки в пълна чаша с вода. Изчакайте до пълното разтваряне на таблетките. Възрастни и деца над 12 години: 1 до 2 таблетки през 4 часа, но не повече от 8 таблетки дневно. Продуктът не е предназначен за деца под 12 годишна възраст.  
Отпуска се без лекарско предписание.

**Условия на съхранение:**

Да се съхранява на сухо и тъмно място при температура под 25 ° C.

**ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.**

**Срок на годност:** 3 години

Да не се употребява след изтичане срока на годност.

Производител и притежател на разрешението за употреба:  
**PERRIGO**  
Allegan, Michigan  
USA 49010