

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-4603 / 04.04.09
Одобрено: 29/13.01.09

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ТАНТУМ® ЛИМОН 3 mg таблетки за смучене, отлети
Бензидаминов хидрохлорид

TANTUM® LEMON 3 mg lozenges
Benzydamine hydrochloride

Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 7 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Тантум® Лимон и за какво се използва
2. Преди да приемете Тантум® Лимон
3. Как да приемате Тантум® Лимон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тантум® Лимон
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАНТУМ® ЛИМОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Тантум® Лимон са таблетки за смучене, съдържащи активното вещество бензидаминов хидрохлорид. Бензидаминовият хидрохлорид притежава изразени противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. Въз основа на бързото проникване и локалното натрупване във възпалената тъкан се стига до бързо затихване на симптомите.

Тантум® Лимон е с добра локална поносимост и води до целенасочена терапия на възпалителните симптоми и на оплакванията при поглъщане.

Тантум® Лимон се прилага при болезнени възпаления в устната кухина и гърлото, възпаления на венците, на сливиците, възпаления на лигавицата на гърлото и на ларинкса. Особено подходящ е за намаляване на оплакванията при простудни заболявания.

Поради лекарствената му форма – таблетки за смучене, прилагането на лекарствения продукт на деца под 6 години не се препоръчва. Приложението при деца между 6 и 11 години да бъде под наблюдението на възрастен.

Не съдържа захар.

БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ТАНТУМ® ЛИМОН

Tantum® Lemon 3 mg lozenges
09/2008



Кога не може да се прилага Тантум® Лимон?

При свръхчувствителност към някои от съдържащите се вещества.

Може ли да се използва Тантум® Лимон по време на бременност или кърмене?

Лекарственият продукт не трябва да бъде прилаган по време на бременност и кърмене, освен ако не е наложително.

Кога е необходимо вземането на специални предпазни мерки?

Ако след кратък период от време /3 дни/, не настъпи очаквания ефект от лечението, се консултирайте с Вашия лекар. Първите симптоми на поява на нежелани лекарствени реакции също трябва да се съобщят на лекаря. Това важи и за случаите, при които по погрешка се приемат големи дози от лекарствения продукт (например от деца).

Използването на бензидамин не се препоръчва при пациенти със свръхчувствителност към салицилова киселина и/или нестероидни противовъзпалителни средства.

Повишено внимание е необходимо при пациенти с бронхиална астма, тъй като е възможно развитие на бронхоспазми при тази група пациенти.

Таблетките Тантум® Лимон са без захар. Те съдържат изкуствен подсладител /аспартам/, източник на фенилаланин, поради което продуктът не трябва да се прилага при пациенти страдащи от фенилкетонурия.

Продуктът съдържа изомалт. В случаи на установена непоносимост към захари е необходимо да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Може ли Тантум® Лимон да се прилага едновременно с други лекарствени продукти?

Да, тъй като не са познати взаимодействия с други вещества.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТАНТУМ® ЛИМОН

Ако лекарят не е предписал нещо друго, дозировката трябва да се спазва точно - 3 пъти дневно по една таблетка за смучене. Лечението не трябва да превишава период от 7 дни.

Как се прилага Тантум® Лимон?

Таблетката трябва бавно да се разтопи в устата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Непосредствено след употреба може да се появи изтръпване в устата и гърлото. Този ефект спада към начина на действие на активното вещество и след кратко време отшумява.

В единични случаи след употреба на таблетките за смучене може да се появи леко парене на лигавицата на устната кухина, неразположение, повръщане или алергични реакции.

Рядък ефект наблюдаван след системна употреба на бензидамин е светлочувствителността.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ТАНТУМ® ЛИМОН

Да се съхранява при температура под 25°C.



Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се пази от слънчева светлина. Лекарственият продукт да се съхранява, поставен във външната опаковка.

Не използвайте Тантум® Лимон след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Тантум® Лимон?

Активно вещество: Бензидаминов хидрохлорид 3 mg

Помощни вещества: Аспартам, Изомалт, Лимонена киселина, аромати (Ментов и Лимонов) и оцветители (Хинолиново жълто E104, Индиготин E132).

Как изглежда Тантум® Лимон и какво съдържа опаковката?

Всяка опаковка съдържа 10, 20 или 30 таблетки за смучене, отлети, с приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

ЦСЦ Фармасютикъл Лтд – България ЕООД, ул. „Асен Йорданов“ 10, 1592 София, България

Производители на лекарствения продукт

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131- Ancona, Италия

ЦСЦ Фармасютикъл България ЕООД, ул. „Асен Йорданов“ 10, 1592 София, България

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката:

09/2008

