



Информация за пациента
Тавежил® 1 mg 20 таблетки
Tavegil® 1 mg 20 tabs

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна информация за пациента.

Тавежил® таблетки се отпуска без рецепта за облекчаване на алергични симптоми при сенна хрема и други алергични ринити (сълзене на очите, кихане, течащ нос), алергични кожни реакции (зачервяване, уртикария, сърбеж, оток), ужилване/ухапване от насекоми .

- Запазете тази листовка. Може да ви се наложи да я прочетете отново.
- Попитайте вашия фармацевт, ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет.

В тази листовка ще намерите отговор на следните въпроси:

1. Какво е Тавежил® и за какво се използва?
2. Как действа Тавежил®?
3. Какво трябва да проверите, преди да използвате Тавежил®?
4. Как трябва да вземате Тавежил® ?
5. Какви странични ефекти може да предизвика Тавежил®?
6. Как да съхранявате Тавежил®?
6. Дата на информацията

Тавежил® таблетки: всяка таблетка съдържа като активна съставка 1 mg clemastine. Тавежил® таблетки съдържат също магнезиев стеарат, поливинилпиридон, талк, скорбяла, лактоза.

1. Какво е Тавежил® и за какво се използва?

Тавежил® (клемастин) противодейства на хистамина - вещество, което тялото освобождава в процеса на алергичните реакции.

Тавежил® облекчава кожните алергични реакции (зачервяване, уртикария, сърбеж, оток), намалява отока и облекчава алергичните прояви при сенна хрема и други алергични ринити (сълзене на очите, кихане, течащ нос), както и при ужилване/ухапване от насекоми.

2. Как действа Тавежил®?

Тавежил® облекчава симптомите при:

- кожни алергични реакции (зачервяване, уртикария, сърбеж, оток)
- алергични ринити (сенна хрема и целогодишна алергична хрема: сълзене на очите, кихане, течащ нос.)
- ужилване/ухапване от насекоми



3. Какво трябва да проверите, преди да използвате Тавежил® ?

Не използвайте Тавежил®, ако:

- сте алергичен към някоя от съставките;
- имате порфирия;
- при деца под 6 год.

Други медицински проблеми

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако:

- Имате някои от следните медицински проблеми: глаукома, сериозно стомашно заболяване, нарушена функция на простатата или пикочния мехур.
- Ако сте алергични към някое лекарство
- Ако страдате от някакво друго заболяване и вече вземате други лекарства, дори и такива без рецепта.

Други неща, които трябва да помните, когато вземате Тавежил®

Както много други антихистамини Тавежил® може да увеличи седативния ефект на хипнотични средства, МАО инхибитори, трициклични антидепресанти, анксиолитици, наркотични аналагетици и алкохол

Бременност и кърмене

- Ако сте бременна, възнамерявате да забременеете или кърмите, не употребявайте Тавежил®, без да се консултирате предварително с лекар.

Използване на други лекарства

- Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако вземате или на-скоро сте вземали други лекарства, дори такива, отпускани без рецепта.
- Преди употреба попитайте лекар или фармацевт, ако приемате седативни средства или транквилизатори.

Шофиране и работа с машини

- Както много други антихистамини Тавежил® може да причини намаляване на вниманието при някои хора по време на шофиране и работа с машини.

4. Как трябва да вземате Тавежил®?

Тавежил® таблетки трябва да се приемат с малко вода преди храненията. Ако не е предписано друго, не трябва да вземате повече от 6 таблетки в продължение на 24 часа, като най-високата единична доза е 2 таблетки едновременно.

Обичайната доза за употреба при възрастни и деца над 12 години е 1 таблетка сутрин и вечер.

Обичайната доза за деца между 6 и 12 год. е 1/2 - 1 таблетка сутрин и вечер.

Придържайте се към предписаната ви от лекаря доза. Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако ви се струва, че ефектът на лекарството е твърде слаб или, обратното, твърде силен.



Какво да правите, ако пропуснете един прием?

Ако забравите да си вземете дозата, вземете нова веднага щом се сетите, освен ако не остават по-малко от два часа до следващия прием. След това продължете обичайната си схема на прилагане.

5. Какви странични ефекти може да предизвика Тавежил®?

Премането на Тавежил® таблетки може да предизвика чувство на умора, седация, а в отделни случаи - сухота в устата, главоболие, възбуда, световъртеж, гадене, болки в корема и храносмилателни разстройства, запек, кожни обриви, диспнеа, много рядко – тахикардия.

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако забележите някой друг ефект, който може да се дължи на употребата на Тавежил® таблетки.

6. Как трябва да съхранявате Тавежил®?

Не използвайте Тавежил® след срока на годност, отбелязан върху кутията. Той е маркиран с „EXP” върху опаковката.

Условия на съхранение

Тавежил® таблетки: не съхранявайте над 30 °C

Като всички лекарства Тавежил® трябва да се пази далеч от достъпа на деца.

За допълнителни данни се обърнете към вашия лекар или фармацевт, които могат да ви дадат по-подробна информация за това лекарство.

7. Дата на информацията

Тази листовка за пациента е актуализирана последно през април 2003 г.

