

ТЕСЛАСКЕН не трябва да се използва при наличие на едно от следните състояния:

- Бременност
- Свръхчувствителност към медицинския продукт или някои от съставките му
- Феохромоцитом
- Кърмене
- Тежко бъбречно заболяване
- Тежко чернодробно заболяване

Необходимо е особено внимание при използването на ТЕСЛАСКЕН при наличие на едно от следните състояния:

- Тежко сърдечно заболяване – особено при сърдечна недостатъчност или когато съществува риск от нарушение на сърдечния ритъм
- Заболявания на главата или мозъчни увреждания

Рядко могат да се срещнат реакции на свръхчувствителност (уртикария и други възможни алергични феномени).

Взаимодействие с други лекарствени средства

Няма проучвания на лекарствени взаимодействия за ТЕСЛАСКЕН.

Бременност и кърмене

ТЕСЛАСКЕН не трябва да се използва ако сте бременна.

Количеството ТЕСЛАСКЕН преминало в кърмата не е известно. Като предупреждение, за да се предпази кърмачето от въздействието на медицинския продукт, кърменето трябва да се спре от момента на прилагане и всичката кърма да бъде изхвърляна в продължение на 14 дни след изследването.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са известни. Няма причина поради която да не можете да шофирате след изследването, освен ако се чувствате замаяни или ако не сте сигурни в себе си.

3. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕСЛАСКЕН

ТЕСЛАСКЕН е за приложение на пациенти над 18 години.

Дозировка:

Количеството ще зависи от теглото на пациента: препоръчва се 0.5 ml/kg телесно тегло при възрастни и хора в напреднала възраст.

ТЕСЛАСКЕН се прилага венозно чрез инфузия преди МРИ изследване. ТЕСЛАСКЕН може да се влива във вената на ръката, чрез тънка еластична тръба. Приложението може да продължи 15-20 минути.

Информация за болния персонал

Преди употребата ТЕСЛАСКЕН трябва да бъде огледан за частици и хомогенност на съдържанието. Флаконите са предназначени за еднократна употреба. Медицинския продукт не трябва да бъде смесван с други лекарства. Неизползаната част трябва да се изхвърли.

Предозиране

Не са известни антидоти към това контрастно вещество. Лечението на предозиране трябва да бъде проведено в болница с поддържаща терапия до отзвучаване на симптомите.

Високи дози на манган може да намалят ефективността на сърдечното изследване, да разширят кръвоносните съдове, както и да предизвикат нарушения на сърдечния ритъм.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички медикаменти, ТЕСЛАСКЕН може да има нежелани реакции. Нежеланите реакции са обикновено бързопреходни и с лека интензивност. Най-често наблюдаваните са: чувство на топлина/почервяване, главоболие, гадене, повръщане, други стомашно-чревни симптоми (като коремни болки, диария, метеоризъм) и вкусови усещания. По-рядко могат да се наблюдават реакции на свръхчувствителност (като кожни реакции, ринити (катарални явления в носната кухина), фарингити (възпаление на гърлото)), замайване, сърцебиене, болки в гърдите и хипертония. Рядко се наблюдават зрителни нарушения, треска и парестезии (чувство на изтръпване). Могат да се срещнат и анафилактични реакции (хриптене, затруднено дишане и стягане или болка в гърдите).

Моля кажете на рентгенолога, Вашия доктор или аптекар ако почувствате някой нежелан ефект.

5. СЪХРАНЕНИЕ

Срок на годност

Срокът на годност е отбелязан на опаковката.
ТЕСЛАСКЕН не трябва да се използва след изтичане на срока на годност.

Специални препоръки за съхранение

ТЕСЛАСКЕН трябва да се съхранява на място защитено от светлина.

