



ТРОМБО ASS 100 mg стомашно-устойчиви филмтаблетки
THROMBO ASS 100 mg gastro-resistant filmtablets

Състав

Лекарствено вещество:

Една стомашно-устойчива филмтаблетка ТРОМБО ASS 100 mg съдържа:
Acetylsalicylic acid (ASA):100 mg

Помощни вещества:

Таблетно ядро: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, колоидален безводен силициев двуокис, картофено нишесте.

Филмово покритие: талк, глицерол триацетат, кополимер метакрилова киселина-етилакрилат, пречистена вода.

Лекарствена форма

Стомашно-устойчиви филмтаблетки

Притежател на разрешението за употреба

LANNACHER HEILMITTEL GmbH,
Schloßplatz 1, 8502 Lannach, Austria

Производител

"Фармацевтични заводи Милве" АД
3200 гр. Бяла Слатина, Промислена зона, България
в сътрудничество с Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H

Начин на действие

Ацетилсалициловата киселина (ASA) притежава антитромботични свойства и по този начин намалява наличието на кръвни съсиреци. Прилагането на стомашно-устойчиви филмтаблетки намалява стомашно-чревните нежелани ефекти, предизвикани от ацетилсалициловата киселина.

Показания

- За намаляване риска от инфаркт на миокарда при пациенти с ангина пекторис;
- За профилактика след инфаркт на миокарда;
- За профилактика на тромбоза след операция на кръвоносни съдове, например коронарен байпас;
- За вторично предпазване от преходни исхемични пристъпи и апоплексия;
- Остър инфаркт на миокарда;
- За периодична терапия при мигрена.

Противопоказания

Тромбо ASS 100 mg стомашно-устойчиви филмтаблетки не се препоръчва при:

- свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина, салицилати или към някоя от съставките на продукта;
- стомашно-чревни язви
- предразположеност към кървене, намален брой на тромбоцитите в кръвта (тромбоцитопения), нарушения на кръвосъсирването (хемофилия)
- тежко нарушение на бъбречната функция и повишено количество оксалатите в урината (оксалурия)



Специални предпазни мерки при употреба

Преди планова операция трябва да се има предвид антитромботичния ефект на Thrombo ASS.

Допълнителната употреба на други салицилати или нестероидни противовъзпалителни/противоревматични средства трябва да бъде определена от лекуващият Ви лекар.

Приемането на високи дози на ASA в продължение на много години, може да доведе до увреждане на бъбреците. Поради това бъбречната функция трябва да се проверява редовно.

При деца и подрастващи в отделни случаи са наблюдавани опасни усложнения (синдром на Рей).

В случай на продължително повръщане, дехидратация, нарушение на съзнанието, гърчове уведомете лекуващия Ви лекар незабавно.

Препоръчва се особено внимание при вече известна свръхчувствителност към други аналгетици и средства за лечение на ревматични заболявания, бронхиална астма, хемолитична анемия, стомашно-чревни заболявания (напр. гастрит), чернодробни и/или бъбречни дисфункции. Вашият лекар трябва да бъде информиран при наличието им.

Бременност и кърмене

Ацетилсалицилова киселина не трябва да се прилага през последните три месеца на бременността, защото може да предизвика удължаване времето на кървене при майката и детето по време на раждането. През първите шест месеца от бременността и по време на кърмене Ацетилсалицилова киселина трябва да се прилага само при крайна необходимост.

Уведомете незабавно лекуващият Ви лекар в случай на бременност!

Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия

Едновременното приложение на ацетилсалицилова киселина (ASA) с други лекарства може да доведе до засилване или отслабване на ефекта им.

Уведомете Вашия лекуващ лекар ако приемате редовно други лекарствени средства.

ASA засилва:

- ефекта на лекарствата, които забавят кръвосъсирването (напр. производни на кумарина, хепарин, дипиридабол и сулфинпиразон);
- ефекта на лекарствените средства, намаляващи нивото на кръвната захар (сулфанилурейните препарати);
- желаните и нежеланите ефекти на нестероидните противовъзпалителни и антиревматични средства;
- желаните и нежеланите ефекти на метотрексата
- риска от кървене от стомашно-чревния тракт след едновременно приложение с глюкокортикостероиди или алкохол;

Също така, концентрацията на дигоксин, барбитурати и литий в кръвта може да се повиши.

ASA отслабва:

- ефекта на дехидратиращите средства (спиронолактон и фуросемид)



- ефекта на лекарства, които засилват отделянето на пикочна киселина с урината (пробенецид, сулфинлиразон);
- ефекта на лекарствените средства, понижаващи високото кръвно налягане.

Едновременният прием на ибупрофен може да намали антитромботичния ефект на Тромбо ASS 100 мг филмтаблетки.

При по-продължителна употреба на антиациди, H₂-блокери и антихолинергични средства може да се наложи повишаване на дозата на ASA.

Едновременното приемане с тетрациклини може да доведе до образуването на нерезорбируеми комплекси. Поради това трябва да се спазва интервал от най-малко 1-3 часа между приема на различните лекарства.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проведени специални изследвания.

Не се очаква съществено влияние върху реакциите на пътя и работата с машини.

Една стомашно-устойчива филмтаблетка Тромбо ASS 100 мг съдържа 60 мг лактоза. Това количество вероятно е недостатъчно за образуване на лактозо-непоносими реакции.

Как да определим дозировката ТРОМБО АСС 100 mg филмтаблетки?

Ако лекарят не е предписал друго, се придържайте стриктно към дозировката.

Дозировка

За намаляване риска от инфаркт на миокарда при пациенти с ангина пекторис:

Профилактика на рецидиви след прекаран инфаркт на миокарда:

Вторична профилактика след преходни исхемични пристъпи (ТИА) и апоплексия:

За тези показания се препоръчва от 30 мг до 300 мг ASA дневно

Профилактика на тромбоза след съдови операции, напр. коронарен байпас:

За тези показания се препоръчва от 50 мг до 300 мг ASA дневно

Остър инфаркт на миокарда:

От 100 мг до 300 мг ASA дневно

За периодична терапия при мигрена:

От 100 мг до 300 мг ASA дневно

Начин на употреба

Филмтаблетките се приемат с малко течност и цели, без да се чупят. Разделянето на филмтаблетката ще разруши стомашно-устойчивото и покритие. Затова Тромбо ASS 100 мг филмтаблетки не трябва да се делят.

Предозиране

Симптомите на предозиране се свързват с дразнене на стомашно-чревния тракт като гадене, повръщане, стомашни болки, както и със световъртеж, главоболие, объркване, шум в ушите. Ако забележите дори един от тези признаци, се свържете с лекуващия Ви лекар.

Нежелани лекарствени реакции

Като цяло филмтаблетките се понасят добре, но понякога могат следните нежелани ефекти:



Рядко може да се наблюдават следните реакции:

- реакции на свръхчувствителност (bronхоспазъм, кожни реакции);
- стомашни оплаквания (гадене, повръщане);
- кървене от стомашно-чревния тракт, което в редки случаи може да доведе до желязодефицитна анемия;
- удължаване на времето на кървене;
- провокиране на астматичен пристъп;
- тромбоцитопения;
- продължителното приемане на по-високи дози може да се свърже с чернодробни и бъбречни увреждания;
- по-високите дози могат да доведат до световъртеж, шум в ушите или язви на стомашно-чревния тракт със силно кървене (повръщане, наподобяващо утайка на кафе или със светло-червен оттенък; тъмни екскременти).

Моля, да уведомите лекуващия Ви лекар или фармацевта, ако забележите каквито и да е нежелани ефекти, които не са посочени в тази листовка.

Условия за съхранение

Да се съхранява на сухо, защитено от светлина / влага място при температура под 25°C. Да се съхранява във вторичната си опаковка.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Режим на отпускане – без лекарско предписание.

Срок на годност

3 години

Да не се употребява след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Дата на последна редакция: м. май 2006 г.

