

Лекарствено вещество: Acetylsalicylic acid; **Помощни вещества:** микрокристална целулоза, нишесте.

Показания: лека и умерена болка (главоболие, зъбобол, менструални болки, мускулни болки и др.), повишена температура; възпаление, ревматични заболявания, миалгии, костно-мускулни болки, остър и хроничен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, остеоартрит и др.; профилактика на миокарден инфаркт; профилактика на тромбоемболизъм.

Дозировка: Възрастни: при болка и/или повишена температура - 1 до 2 таблетки на 4 часа при нужда, максимална доза 8-10 таблетки; при ревматични заболявания - до 10 - 12 таблетки дневно; за профилактика на миокарден инфаркт и тромбоемболизъм - по 1 таблетка дневно. Деца под 12 години: при ревматологични заболявания (ювенилен хроничен артрит) само по лекарско предписание. Дозировка: от 7 до 12 години - по 1 таблетка до 3 пъти дневно.

Противопоказания: свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина и/или други НСПВС, или помощните вещества; язва; хемофилия; хронична бъбречна недостатъчност; тежка бъбречна недостатъчност; тромбоцитопения; глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназна недостатъчност; деца под 7 годишна възраст, бронхиална астма, алергия, полипи в носа. **Предупреждения:** повишено внимание при деца под 12 години с варицела или грип (опасност от синдром на Reye). **Употреба при бременност и кърмене** - не се прилага.

Лекарствени взаимодействия: усилява действието на антикоагуланти, антидиабетни средства, НСПВС и аналгетици; понижава ефекта на АСЕ-инхибитори, бета-блокери; диуретици и урикозурични средства и др.

Нежелани реакции: увреждане функцията на бъбреците, спазъм на бронхите при астма, алергии и полипи в носа, оток на съдовете и алергичен обрив, кожни обриви, сърбеж, гадене, повръщане, коремни болки, стомашно-чревно кървене, язви, особено при продължително лечение с висока доза. **Предозиране:** потърсете медицинска помощ.

Съхранение - при температура под 30 ° С. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочен върху опаковката. Не се прилага, ако пластмасовата напечатана обвивка под капака липсва или е повредена.


Годен до: Рег. №: Парт. №

Начин на отпускане: без лекарско предписание

Притежател на разрешението за употреба: Generica Inform Impex ,
"Sultan tepe" № 19, 1124 Sofia, Bulgaria

Производител: LNK INTERNATIONAL , INC ,Nauppage , NY , USA

Alley
07.11.02



Лично списано вещество: Acetylsalicylic acid. Помогает вещества: гликозилсалицилат, инхибитор. Показан при легкой и умеренной боли (спазмобол, зубобол, менструални болан, мускулни болан и др.), повишена температура, възпаление, ревматични заболявания, мигрена, остеоартритни болан, остеомиелитни остеомиелитни артрит, коронарни артрит, остеоартрит и др.; профилактика на миокарден инфаркт, профилактика на тромбозоболан. Дозировка: Възрастни при болка или повишена температура - 1 до 2 таблетки на 4 часа при нужда, максимално до 8-10 таблетки, при ревматични заболявания - до 10-12 таблетки дневно, за профилактика на миокарден инфаркт и тромбозоболан - по 1 таблетка дневно. Децата: 12 години при ревматични заболявания (реже при коронарни артрит) само по лекарско предписание. Дозировка: 7 до 12 години - по 1 таблетка до 3 пъти дневно. Противопоказания: свръхчувствителност към ацетилсалицилат или неговия или други ИСЛС, или кожни вещества; остеомиелит, хронична бъбречна недостатъчност, тежка бъбречна недостатъчност, тромбоцитопения, глюкоза-6-фосфат-деhidrogenаза недостатъчност, деца под 7 години болност, бременност, алергия, поглъщане в носа. Предупредителни: повишена височина при деца под 12 години с вирусна или грип (опасност от синдром на Рейе). Употреба при бременност и кърмене: не се прилага. Лекарствени взаимодействия: ускорено действие на антикоагуланти, антиаритмични средства, ИСЛС и антидепресанти; понижаване ефекта на ACE-инхибитори, бета-блокери, диуретици и уросурични средства и др. Нежелани реакции: усилване функцията на бъбречата, спазми на бронхите при астма, алергия и полени в носа, оток на съдовете и алергичен обем, кожен обем, сърбеж, пазане, погрешане, коремни болан, стомашно-чревна кървене, главоболие, особено при продължително лечение с висока доза. Предупредителни: отбавяне на мускулна помощ. Съхранение - при температура под 30C. Да се съхранява място недостъпно за деца. Да не се използва след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката. Не се прилага, ако опаковката не е изцяло обичайна поддържава гласна или в повредено състояние. Рег. №: Пат. №: Нямаме отпускане. Без рецепта/предписане. Производител на разпространителя за употреба: Generics (tubing) Inc., "Substance" №18, 1124 Soho, Village, New York, NY, USA. Производител: LNK INTERNATIONAL, INC, Hauppauge, NY, USA.

