



Преди употреба внимателно прочетете написаното в листовката за пациента
Запомнете! Това лекарство е предписано за вас! Никога не го отстъпвайте на друг,
дори и да има същите симптоми като вас. Това може да му навреди!

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

TROMBOGARD tabl. 100 mg

ТРОМБОГАРД табл. 100 мг

● СЪСТАВ

Всяка таблетка ТРОМБОГАРД съдържа 100 mg acetylsalicylic acid.

Помощни вещества: Лактоза, Микрокристална целулоза, Колоидален силициев диоксид,
Натриев стеарил фумарат и Кроскармелоза натрий.

● ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетки

● ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ТРОМБОГАРД?

Тромбогард 100 mg притежава кардиопротективен ефект. Използва се при:

- лечение на нестабилна ангина пекторис
- остър инфаркт на миокарда - като част от стандартната терапия
- вторична профилактика след инфаркт на миокарда
- след артериални съдови операции или интервенции (след аортокоронарен байпас, при перкутанна транс-луминална коронарна ангиопластика);
- За профилактика на преходни исхемични атаки и мозъчни инфаркти, когато се наблюдават предупредителни симптоми

Тромбогард 100 mg не е подходящ за лечение на болкови състояния.



ВНИМАНИЕ!

● КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ТРОМБОГАРД?

Тромбогард 100 mg не трябва да се приема при свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина или някое от помощните вещества, диспепсия, пептична язва на стомаха и/или дванадесетопръстника, заболявания свързани със забавено кръвосъсирване, хемофилия, тромбоцитопения, първи и трети триместър на бременността, една седмица преди и след хирургична интервенция.

● СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да приемете ТРОМБОГАРД, непременно се консултирайте с лекар ако страдате от някое от по-долу посочените заболявания. При тези групи пациенти трябва да се прилага с особено внимание: астма и полипи в носа; заболявания на кръвотворната система; заболявания на черния дроб или бъбреците; неконтролирана хипертония; диабет; пациенти приемащи концентриран алкохол всеки ден в количество над 75 мл.

Тромбогард 100 mg не бива да се приема от деца под 18 год. и подрастващи, при болни от варицела и други вирусни заболявания, поради опасност от синдрома на Рей. Тромбогард 100 mg може да се дава на деца под 18 год. само по изрично предписание на лекар и при липса на други ефикасни средства;

● ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Винаги информирайте вашият лекар или фармацевт когато приемате и други лекарства. Аспирин може да взаимодейства с алкохол, противовъзпалителни средства, антикоагуланти, хормони, антидиабетични средства, антиепилептични средства, пробенецид, гинко билоба.

● БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

По време на бременност и кърмене винаги се съветвайте с вашия лекар или фармацевт преди да приемате лекарствен продукт.



Не се препоръчва приемането на Тромбогард 100 mg по време на бременност, освен ако не е изрично предписан от лекар.

● **КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ТРОМБОГАРД?**

За препоръчване е таблетките да се приемат по време или веднага след хранене, да се поглъщат цели с достатъчно количество течност. Таблетките не трябва да се приемат на празен стомах!

● **НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ**

Отбелязани са следните нежелани лекарствени реакции: диария, гадене, повръщане, парене в стомаха, намалено количество на урината. Ако забележите трудност в дишането или кашлица, шум в ушите, обрив, черни изпражнения, обърканост, замаяност, стомашна болка – СПРЕТЕ ВЕДНАГА ДА ПРИЕМАТЕ ТРОМБОГАРД И СЪОБЩЕТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА СЪСТОЯНИЕТО СИ.

ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЕКИ НЕЖЕЛАН ИЛИ НЕПРИЯТЕН ЕФЕКТ, КОЙТО СТЕ ЗАБЕЛЯЗАЛИ И НЕ Е ОТБЕЛЯЗАН В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

● **СЪХРАНЕНИЕ**

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕПАРАТА СЛЕД ДАТАТА ПОСОЧЕНА НА ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Срок на годност 2 (две) години.

● **СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява при температура под 25° С .

Да се съхранява на недостъпно за деца място.

● **ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

“АДИФАРМ” ЕАД

1700 София, бул.” Симеоновско шосе” 130



В ТАЗИ ЛИСТОВКА НЕ Е ДАДЕНА ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА
ЛЕКАРСТВО. АКО СЛЕД ПРОЧИТАНЕТО И ВЪЗНИКНАТ НЯКАКВИ ВЪПРОСИ,
ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА ПОПРАВКА НА ТЕКСТА:

октомври 2006 г.

