


Информация за употреба

Моля, прочетете внимателно и съблюдавайте!

TROXEMED (ТРОКСЕМЕД)

Капсули



Състав

1 капсула съдържа 0.300 g троксерутин
помощни вещества: полиетиленгликол 6000,
квинолиново жълто Е 104, титанов диоксид Е 171, сънсет жълто Е 110, желатин

Лекарствена форма и опаковка

10 капсули в блистер от PVC / Алюминиево фолио
5 броя блистери в единична картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба

Медика АД
град София, Р България
Бул. „Княз Ал. Дондуков” 82

Фармакологично действие

Троксемед е препарат с изразено антиварикозно действие. Повишава устойчивостта и тонуса на малките кръвоносни съдове (капилярите), като нормализира тяхната пропускливост. Има и противовъзпалително действие. Подобрява функцията и храненето на кръвоносните съдове и тъканите около тях, в резултат на което намаляват или изчезват отоците и болката, съпътстваща разширените вени.

Показания

Облекчаване на отока и свързаните с хронична венозна недостатъчност симптоми (умора, тежест, подуване и болки в краката, крампи, парестезии, “непочиващи крака”).

Информация, необходима преди употреба на лекарствения продукт

Противопоказания

Свръхчувствителност към някои от съставките на продукта.

Специални предпазни мерки при употреба

За да бъде налице очакваният лечебен резултат този лекарствен продукт, трябва да се прилага точно според предписанията на Вашия лекуващ лекар т.е. по определената от него доза и продължителност на лечението.

Ако по време на лечението установите наличие на някои от описаните в тази информация прояви или такива от друг характер, обърнете се за съвет към Вашия лекуващ лекар.

Лекарствени и други взаимодействия

Действието на някои лекарства може да бъде повлияно от едновременното приложение с други такива. Затова се консултирайте с Вашия лекар, ако постоянно приемате други лекарства, доскоро сте прилагали такива или желаете да ги приемате едновременно с Троксемед, макар, че до момента не са известни неблагоприятни взаимодействия на Троксемед с други лекарствени продукти.



Специални предупреждения при специфични групи пациенти

Препаратът може да се прилага по време на бременност и в периода на кърмене, но това трябва да става само по лекарско предписание и контрол.

Препаратът се прилага без опасност от неблагоприятно повлияване на двигателната активност и рефлексите при шофьори и лица, работещи с машини.

Съдържа оцветител Е110.

Информация, относно правилната употреба на лекарствения продукт

Дозировка и начин на приложение

Ако Вашият лекар не Ви е препоръчал нещо друго, то при възрастни Троксемед се приема 2 пъти дневно по 1 капсула в острия стадий на заболяването.

Капсулите се приемат несдъвкани, след или по време на хранене, с малко течност.

За поддържане на постигнатия лечебен ефект, препаратът се приема по-продължително време (20-30 дни) по една капсула дневно.

Предозиране

Състояния на предозиране до момента не са съобщени.

Нежелани лекарствени реакции

Нежелани лекарствени реакции са всички неблагоприятни прояви, които могат да се появят в хода на лечението с дадено лекарство.

Лекарственият продукт Троксемед има отлична поносимост. В изключително редки случаи могат да се наблюдават леки стомашни оплаквания-гадене, болка, общо стомашно-чревно неразположение.

Съхранение

В оригинални опаковки на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място при температура под 25⁰С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

5 (пет) години от датата на производство.

Троксемед не трябва да се прилага след изтичане на срока на годност, указан върху опаковката!

Име и адрес на производителя

Медика АД, Промислена зона
2800 Сандански, Р България

Последна редакция на листовката

м. ноември 2004 г.

