

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**УРО-ВАКСОМ 6 mg твърди капсули**  
**URO-VAXOM 6 mg hard capsules**

**bacterial lysates (бактериални лизати)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА**

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 2430 / 04.04.08

Одобрено: .....

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представляват УРО-ВАКСОМ капсули и за какво се използват
2. Преди да приемете УРО-ВАКСОМ капсули
3. Как да приемате УРО-ВАКСОМ капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на УРО-ВАКСОМ капсули
6. Допълнителна информация

### **1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ УРО-ВАКСОМ КАПСУЛИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ**

УРО-ВАКСОМ е лекарствен продукт по лекарско предписание.

Продуктът е от биологичен произход и стимулира естествените защитни сили на организма.

УРО-ВАКСОМ е показан за:

- Имунотерапия.
- Профилактика на рецидивиращи (повтарящи се) инфекции на пикочните пътища.
- Съпътстващо лечение към антибиотичната терапия на остри инфекции на пикочните пътища.

УРО-ВАКСОМ е препоръчван особено при следните заболявания: цистит, пиелонефрит, уретрит, асимптоматична бактериурия, инфекции след катетеризация на пикочния мехур или уретера.

### **2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ УРО-ВАКСОМ КАПСУЛИ**

Ако Вашият лекар Ви предпише антибиотици или пикочни дезинфектанти, които да бъдат прилагани съвместно с УРО-ВАКСОМ, не забравяйте да ги вземате.

**Не приемайте УРО-ВАКСОМ, ако имате свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.**

**Обърнете специално внимание при лечението с УРО-ВАКСОМ капсули:**

УРО-ВАКСОМ капсули не се прилагат при деца на възраст под 4 години.



Информирайте Вашия лекар или фармацевт:

- ако страдате от друго заболяване;
- ако сте алергични;
- ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, вътрешно или външно, включително и такива, отпускани без рецепта.

### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Вашият лекар ще реши дали можете или не можете да приемате УРО-ВАКСОМ по време на бременност или кърмене.

### **Шофиране и работа с машини**

Не е известен ефект върху способността за шофиране и работата с машини.

## **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ УРО-ВАКСОМ КАПСУЛИ**

*Профилактика:*

1 капсула дневно на гладно, за предпочитане сутрин, в продължение на 3 последователни месеца.

*Лечение през остриите стадии:*

1 капсула дневно на гладно, за предпочитане сутрин, като подпомагащо лечение към основната антибиотична терапия, до изчезване на симптомите, но в продължение на минимум 10 последователни дни.

Дозата е еднаква за възрастни и за деца.

**Не променяйте дозата по Ваше желание. Кажете на Вашия лекар или фармацевт ако смятате, че лекарството е твърде слабо, или обратно - твърде силно.**

## **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, УРО-ВАКСОМ капсули могат да предизвикат нежелани ефекти, като диария, гадене, коремна болка, главоболие, сърбеж или зачервяване по кожата и в някои случаи треска.

УРО-ВАКСОМ може да причини подуване (едем) на устата или на крайниците. Тези реакции са редки, но могат да бъдат сериозни. Ако се появи нежелана реакция от този тип спрете веднага лечението си и незабавно информирайте Вашия лекар или фармацевт.

В случай на реакция по кожата или при треска, спрете веднага приема на продукта и кажете на Вашия лекар, тъй като това може да е свързано с алергична реакция.

Ако забележите други странични ефекти, моля да уведомите Вашия лекар или фармацевт за появата им.

## **5. СЪХРАНЕНИЕ НА УРО-ВАКСОМ КАПСУЛИ**

УРО-ВАКСОМ трябва да се съхранява в оригиналната опаковка на сухо място при температура под 25° С.

Съхранявайте лекарствения продукт на място, недостъпно за деца.

Не използвайте УРО-ВАКСОМ капсули след изтичане на срока на годност, който е отбелязан върху блистера и върху картонената опаковка, след надписа "Годен до".



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

За повече информация, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа УРО-ВАКСОМ капсули**

1 капсула УРО-ВАКСОМ съдържа 6 mg замразен и изсушен лиофилизат от бактерията *Escherichia Coli* / Ешерихиа Коли.

Лекарственият продукт съдържа също и други съставки: модифицирана царевична скорбяла (прежелатинизирана), магнезиев стеарат, пропилгалат, натриев глутамат, манитол, червен железен оксид, жълт железен оксид, титаниев диоксид, желатин.

### **Какво съдържа опаковката**

Опаковките съдържат 3 или 9 блистера по 10 капсули.

Не всички видови опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

### **Притежател на разрешението за употреба:**

OM Portuguesa  
Rua da Industria No 2, Quinta Grande, 2720-302 Amadora  
Португалия

### **Производител:**

OM Portuguesa  
Rua da Industria No 2, Quinta Grande, 2720-302 Amadora  
Португалия

**Дата на последно актуализиране на листовката: Септември 2006**

