

Информация за пациента.

Моля, прочетете внимателно!


УРОФЛОУ 1

УРОФЛОУ 1 mg филмирани таблетки

УРОФЛОУ 2

УРОФЛОУ 2 mg филмирани таблетки

толтеродин хидрогентартат/tolterodine hydrogen tartrate



Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да използвате това лекарство

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и Вие не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди, дори ако техните оплаквания са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите реакции се задълбочи или ако забележите нежелана реакция, неупомената в тази листовка, моля, обърнете се към вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е УРОФЛОУ и за какво се използва
2. Преди да започнете да използвате УРОФЛОУ
3. Как трябва да използвате УРОФЛОУ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да се съхранява УРОФЛОУ
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УРОФЛОУ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

УРОФЛОУ принадлежи на клас лекарствени средства, които отпускат мускулатурата на пикочния мехур.

УРОФЛОУ се използва за лечение на симптомите на нестабилен пикочен мехур, т.е. остри позиви за уриниране, често уриниране или невъзможност за задържане на урината по време на позив.

Лекарствения продукт е предназначен за лечение на възрастни.



2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРОФЛОУ

Не приемайте УРОФЛОУ

- ако сте свръхчувствителни към толтеродин или някое от помощните вещества на УРОФЛОУ
- ако страдате от нарушена способност за изпразване на пикочния мехур.
- ако страдате от труднолечима глаукома (високо налягане и болки в очите).
- ако страдате от миастения гравис (нарушение на нервномускулната функция с мускулна слабост).
- ако страдате от тежък язвен колит (възпаление на дебелото черво с язви, диария с примеси на кръв) или токсичен мегаколон (остро разширяване на дебелото черво, животозастрашаващо усложнение на язвени колит или на друго чревно заболяване).

Обърнете специално внимание при лечението с УРОФЛОУ

Моля, уведомете Вашия лекар

- ако имате затруднено уриниране и изтъняване на струята.
- ако имате остро подуване и болки в корема, засягащи преминаването и смилането на храната или ако сте страдали, или страдате от тежък запек.
- ако имате бъбречни или чернодробни проблеми. В този случай лекарят ще намали обичайната доза.
- ако страдате от вегетативна невропатия (проблем, свързан с нервната система, който понякога се среща при диабет и може да доведе до диария, импотентност или ниско кръвно налягане).
- ако имате Хиатал - херния (част от стомаха преминава нагоре през диафрагмата).
- ако имате необичайна сърдечна индикация (ECG), забавен пулс (брадикадия), изменени ниски нива на калий в кръвта (хипокалемия), калций (хипокалцеемия) или магнезий (хипомагнезаемия), ако вземате лекарства, които влияят на сърдечния ритъм, или ако страдате от сърдечно заболяване като кардиомиопатия (слаб сърдечен мускул), исхемична болест на сърцето (намален кръвоток към сърдечния мускул), неравномерна сърдечна дейност (аритмия) или сърдечна недостатъчност.

Прием на други лекарства

Моля, уведомете Вашия лекар, ако вземате или наскоро сте вземали други лекарства, включително свободно- продаваеми.

Някои от лекарствата могат да взаимодействат с УРОФЛОУ и да повишат неговия ефект, напр. антибиотици, съдържащи еритромицин и кларитромицин или лекарствени продукти за лечение на гъбични инфекции или за вируса на СПИН.

УРОФЛОУ може да намали ефекта на лекарства, които подпомагат действието на храносмилателния тракт (лекарства, съдържащи метоклопрамид или цисаприд).



Приемане на УРОФЛОУ с храна и течности

Може да вземате УРОФЛОУ с вода, независимо от храненията.

Бременност и кърмене

Потърсете съвета на Вашия лекар или фармацевт преди да вземате лекарства.

По време на бременност използването на УРОФЛОУ не се препоръчва.

Кърмачките трябва да избягват употребата на този продукт.

Шофиране и работа с машини

УРОФЛОУ може да предизвика замъглено виждане и да намали способността за бърза реакция. Винаги се консултирайте с Вашия лекар, ако планирате шофиране или работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на УРОФЛОУ

Няма специални предпазни мерки, касаещи помощните вещества на този продукт.

3. КАК ТРЯБВА ДА ПРИЕМАТЕ УРОФЛОУ?

Винаги вземайте УРОФЛОУ точно както е предписано от Вашия лекар. Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни.

Възрастни (включително пациенти в напреднала възраст).

Обичайната доза е 2 mg (1 таблетка УРОФЛОУ 2) два пъти дневно. Гълтайте таблетката цяла.

Пациенти с увредена бъбречна или чернодробна функция

Препоръчителната доза е 1mg (1 таблетка УРОФЛОУ 1) два пъти дневно.

Ползата от лечението с УРОФЛОУ трябва да се преразгледа след 2 или 3 месеца.

Употребата на УРОФЛОУ при деца не се препоръчва.

Ако поемете по-голямо количество УРОФЛОУ от необходимото:

Не вземайте повече таблетки отколкото Вашият лекар е предписал. Ако случайно погълнете твърде много таблетки, потърсете незабавно медицинска помощ от Вашия лекар или от Бърза помощ.

Веднага потърсете лекар при всеки случай на предозиране или случаен прием от дете.

Ако забравите да вземете УРОФЛОУ

Ако забравите да вземете Вашата таблетка навреме, вземете я веднага щом си спомните, освен ако вече не е време за следващата.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако спрете да вземате УРОФЛОУ

Не спирайте лечението.

Вашият лекар ще Ви каже колко дълго ще продължи лечението с УРОФЛОУ.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, УРОФЛОУ може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки страда от тях.

Незабавно прекратете приема на лекарството и потърсете лекар, ако получите:

- Алергична реакция във вид на кожен обрив, подуване на лицето или затруднено дишане.

По време на прилагане на толтеродин (активното вещество на УРОФЛОУ), може да се получат следните нежелани реакции (дадени според честотата на тяхната поява); ако някоя от следните нежелани реакции е обезпокоителна за Вас, моля, информирайте Вашия лекар; той може да намали Вашата доза.

Много чести (вероятна поява при повече от 1 пациент на 10): сухота в устата

Чести (вероятна поява при 1- 10 пациента на 100): нервност, световъртеж, сънливост, променен усет – мравучкане (парестезия), главоболие, сухи и раздразними очи, замъглено виждане, стомашен дискомфорт след нахранване (диспепсия), запек, болки в корема, газове, повръщане, суха кожа, умора, гръдни болки

Нечести (вероятна поява при 1- 10 пациента на 1000): алергични реакции, обърканост, подуване на глезените, невъзможност за изпразване на пикочния мехур.

Редки (вероятна поява при 1- 10 пациента на 10000): халюцинации, ускорена сърдечна дейност (тахикардия), палпитация (сърцебиене), аритмия.

Много редки (вероятна поява при по-малко от 1 пациент на 10000): тежки алергични реакции, сърдечна недостатъчност.

Ако някоя от нежеланите реакции се задълбочи или ако забележите нежелана реакция, неупомената в тази листовка, моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА УРОФЛОУ

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Не използвайте УРОФЛОУ след изтичане на срока, отбелязан на опаковката/блистера. Срокът на годност се отнася за последния ден на отбелязания месец.

Да се съхранява в оригинална опаковка за да се предпази от влага.

Лекарствата не бива да се изхвърлят в отходните води или в битовата смет. Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да се освободите от лекарство, което вече не Ви е нужно. Тези мерки ще подпомогнат опазването на околната среда.



6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа УРОФЛОУ?

Активното вещество е толтеродин хидрогенартарат. Всяка филмирана таблетка съдържа 1 mg или 2 mg толтеродин хидрогенартарат.

Други съставки

Сърцевина на таблетката:

микрочестална целулоза, натриев нишестен глюколат (тип А), силициев диоксид, колоидален безводен, натриев стеарилфумарат.

Обвивка на таблетката:

УРОФЛОУ 1: хипромелоза 2910/5, макрогол 6000, титаниев диоксид (Е 171), железен оксид жълт (Е 172), талк

УРОФЛОУ 2 : хипромелоза 2910/5, макрогол 6000, титаниев диоксид (Е 171), Талк

Как изглежда УРОФЛОУ и какво съдържа опаковката

УРОФЛОУ 1: жълти, кръгли, двойно-изпъкнали, филмирани таблетки

УРОФЛОУ 2: бели, кръгли, двойно-изпъкнали, филмирани таблетки

Размер на опаковката: 28, 56 филмирани таблетки

Възможно е не всички видове да са на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Zentiva k.s.,

U kabelovny 130

102 37 Prague 10

Чешка Република

Дата на последна редакция на листовката

