

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти, моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт.

Vagisan®

Вагизан®

1. Състав:

Какво съдържа Вагизан®?

1 песар съдържа следните лекарствени вещества:

млечна киселина (90 %) 0,167г,

натриев лактат - разтвор(50 %) 0,100 г

(съответстващ на 40 мг млечна киселина)

0,167 g lactic acid (90%)

0,100 g sodium lactate (50%) equivalent to 40,0 mg lactic acid

2. Лекарствена форма и съдържание:

Какво представлява Вагизан®?

Вагинални свещички, съдържащи млечна киселина- лактат

Опаковка със 7 вагинални песара

3. Показания

Допълнително лечение при регулиране на съдържанието на млечна киселина във влагалището, при хронични или рекурентни бактериални вагинози с лека и умерена тежест.

4. Противопоказания:

Кога не трябва да прилагате Вагизан®?

Вагизан не трябва да се приема в случай на свръхчувствителност към млечна киселина или към някое от помощните вещества.

Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?

Няма съмнения за риск от употребата на Вагизан® по време на бременност и лактация.

5. Дозировка, начин и продължителност на употреба

По-долу посочените данни важат, ако Вашия лекар не Ви е предписал друго. Моля, спазвайте указанията за употреба, защото в противен случай е възможно Вагизан® да не действа правилно.

Колоко често и в какво количество дневно трябва да употребявате Вагизан®?

1 път дневно, вагинално

Кога и как трябва да прилагате Вагизан®?

Вагиналният песар се поставя вечер, възможно най-дълбоко във влагалището.

За да извадите песарът от блистера, разделете двете части от фолиото на върха на свещичката.

Колко дълго трябва да прилагате Вагизан®?

Продължителността на лечението е от 5 до 7 дни.



6. Грешки при употреба и предозиране

Какво трябва да имате предвид ако сте пропуснали да приложите Вагигизан®?

Ако сте пропуснали поредната доза Вагигизан®, моля не вземайте на другия ден двойна доза. Продължете лечението с пропуснатата доза Вагигизан®.

Какво трябва да имате предвид ако сте прекъснали лечението с Вагигизан® за по-дълъг период или го прекратите преждевременно?

И в двата случая резултата от лечението е застрашен.

7. Странични ефекти

Какви странични ефекти могат да възникнат при употребата на Вагигизан®?

В редки случаи могат да възникнат следните кожни реакции: зачервявания, парене, сърбеж. Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са отбелязани в тази листовка, моля информирайте за това Вашия лекар.

8. Инструкции за съхранение и информация за годност

Срокът на годност е отбелязан на външната опаковка и на блистера. Не използвайте тази опаковка след изтичане на срока на годност!

Как да съхранявате Вагигизан®?

Вагиналните свещички трябва да се съхраняват на места недостъпни за деца, при температура не по-висока от 25 °С.

9. Производител

Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel,
Südbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, Germany

10. Притежател на разрешителното за употреба

Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel,
Südbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, Germany

11. Помощни вещества:

макрогол 1500 и 6000

Makrogol 1500 , 6000

12. Дата на последна редакция на листовката:

ноември 1999

13. Допълнителни съвети за пациентката

При сухота във влагалището, преди да поставите песарът е добре да я навлажните под течаща вода.

Трябва да обърнете внимание, че поради добрата разтворимост на вагиналните песари е възможно да се появи засилено течение, което не е причина за притеснение. Затова Ви препоръчваме да използвате ежедневни дамски превръзки.

