

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

VAGOTHYL
ВАГОТИЛ
36% разтвор
(Policresulen)

ИЗДАВАТЕЛСТВО НА ЛЕКАРСТВАТА	
Кат. Р.У. №	11-5234 / 22.06.09
Одобрено:	35 / 17.07.09

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Ваготил и за какво се използва
2. Преди да приемете Ваготил
3. Как да приемате Ваготил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ваготил
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАГОТИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Приложен локално върху болезнено изменената тъкан, ваготил предизвика коагулация и излющване на мъртвите клетки без да уврежда здравите тъкани.

Проявява трихомонациден и бактерициден ефект срещу болестотворни бактерии във влагалището. Не действа на млечнокиселите бактерии.

Предизвиква местно свиване на кръвоносните съдове и ограничава кръвотечението.

Показания

Локално лечение на цервикално и вагинално възпаление, съпроводено с течение, колпити и цервицити, цервикална ерозия, трихомониози и кандидози. За спиране на кръвотечението след биопсия и премахване на цервикалните полипи. За подпомагане регенерацията на декубитални язви, причинени от песари, след електрокоагулация. Генитални кондилиоми. Външни и вътрешни хемороиди с възпалителни симптоми, фисури и рагади, анална екзема, пруритус и постоперативни рани. След проктологична хирургия.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ ВАГОТИЛ

Не приемайте Ваготил

Не използвайте X след срока на годност отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Обърнете специално внимание при употребата на Ваготил

- Да не се прилага едновременно с други продукти с местно действие при лекуване на болезнени изменения
- Да се избягват полови контакти при лечение с ваготил
- Да не се употребява по време на менструация
- По време на лечение да не се ползва дразнещ сапун.
- Разтвори на ваготил могат да се съхраняват до следващо прилагане под 25 ° C, в защитено от светлина място в течение на 2 мес.

Прием на други лекарства

При едновременно прилагане с алкални продукти, протичащата с отделяне на топлина реакция, засилва химичното изгаряне на лигавиците.

Бременност и кърмене

Бременност

Приложението върху маточната шийка и влагалището трябва да се извършва изключително внимателно и само при наличието на еднозначни показания.

Да не се прилага върху маточната шийка в късен стадий на бременността .

Кърмене

Няма данни.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за влияние.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВАГОТИЛ

Винаги приемайте използвайте Ваготил точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Само за локално приложение.

Ерозия на влагалището

След подсушаване в посока от здравите към болезнено изменените зони, се тампонира за 1-3 min. Излишното количество от продукта се отстранява със сух тампон. Процедурата да се повтаря 2-3 пъти седмично.

Кръвотечения

Тампониране за 2-3 min. до спиране на кръвотечението.

Влагалищни промивки, лечение язви и изгаряния


Използва се разтвор на 5-15 cm³ от концентрата в 1 dm³ топла вода.

Възможно е да се прилага и след разреждане с вода в съотношение 1:1 или 1:5.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

В редки случаи са възможни алергична реакция (зачервяване на влагалището и вулвата, сърбеж, кожни обриви).

В изключителни случаи в началото на лечението може да се появи местна реакция на дразнене.



5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВАГОТИЛ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

- Да не се прилага едновременно с други продукти с местно действие при лекуване на болезнени изменения
- Да се избягват полови контакти при лечение с ваготил
- Да не се употребява по време на менструация
- По време на лечение да не се ползва дразнещ сапун.
- Разтвори на ваготил могат да се съхраняват до следващо прилагане под 25 ° C, в защитено от светлина място в течение на 2 мес.

Да се съхранява под 25 ° C.

Да се пази от светлина .

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Ваготил


- | | |
|--|-------|
| - Активното(ите) вещество(а) е(са): Policresulen | 36 g |
| - Другите съставки са: Пречистена вода до | 100 g |

Как изглежда Ваготил и какво съдържа опаковката

Оранжев стъклен флакон, 50g, опакован в картонена кутия с всички необходими означения и информационна листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint-Stock Co.
5, Marszałka J. Piłsudskiego Str.
95-200 Pabianice, Полша



Дата на последно одобрение на листовката

04/2009