

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете внимателно листовката преди да започнете лечение с лекарствения продукт.

- Запазете листовката. Може отново да я прочетете.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Този продукт е предписан лично за Вас и не бива да го давате на други хора. Той може да им навреди, дори и симптомите да са същите, като вашите.

В тази листовка:

1. Какво е Весел Дие Ф[®] и за какво се използва
2. Преди да започнете лечение с Весел Дие Ф[®]
3. Как се приема Весел Дие Ф[®]
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на Весел Дие Ф[®]
6. Допълнителна информация

ВЕСЕЛ ДИЕ Ф[®] (Сулодексид)

250 LSU капсули

Активното вещество е Сулодексид 250 LSU

Помощните вещества са: натриев лаурил саркозинат, силиконов преципитат, триглицериди, желатин, глицерол, натриев етил пара-хидроксibenзоат, натриев пропил пара-хидроксibenзоат, титаниев диоксид E171, червен железен оксид E 172.

600 LSU/2 ml разтвор инжекционен

Активното вещество е Сулодексид 600 LSU

Помощните вещества са: натриев хлорид, вода за приготвяне на инжекционен разтвор

Притежател на Разрешението за Употреба

ALFA WASSERMANN S.p.A.

Via Enrico Fermi, 1; 65020 - ALANNO (PE) -Италия

Производители

Капсули

Производство на меки капсули: R.P. SCHERER S.p.A. – Aprilia (Latina) - Италия

Първична опаковка и контрол:

ALFA WASSERMANN S.p.A. – Via Enrico Fermi, 1- Alanno (PE) – Италия

Вторична опаковка и контрол:

"ЦСЦ Фармасютикъл България" ЕООД, ул. "Асен Йорданов"10, гр. София 1592, България

Ампули

ALFA WASSERMANN S.p.A. – Via Enrico Fermi, 1- Alanno (PE) - Италия

"ЦСЦ Фармасютикъл България" ЕООД, ул. "Асен Йорданов"10, гр. София 1592, България



1. КАКВО Е ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Лекарствена форма и съдържание

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] 250 LSU капсули са червени овални меки капсули, съдържащи бяло-сива суспензия. Всяка мека капсула съдържа доза от 250 LSU сулодексид.

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] 250 LSU капсули са в опаковки от 50 капсули, разделени в два блистера от по 25 капсули всеки. Блистерите са поставени в картонена кутия.

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] 600 LSU инжекционен разтвор е прозрачна светло-жълта течност от 2 ml в жълти стъклени ампули. Всяка ампула съдържа доза от 600 LSU сулодексид.

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] 600 LSU е в опаковки по 10 ампули, поставени в полистиренова форма и в картонена кутия.

Фармакотерапевтична група

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] е антитромботичен агент действащ на много нива. Лекарят Ви е предписал това лекарство за лечение и превенция на съдови заболявания. ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] притежава двойно инхибиращо действие върху 2 от факторите на кръвта, отговорни за образуването на тромби и за увеличаване на патологичните условия, като тези, които Ви засягат в момента. В допълнение, ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] има способността да ускорява активирането на ендогенно-фибринолитичната система, която след като веднъж е формирана, разрушава тромбите. ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] също така предпазва стените на съдовете и подобрява циркулирането на кръвта, което е нарушено при съдови заболявания.

Терапевтични показания

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] е показан за профилактика на артериални и венозно-съдови заболявания с потенциален риск от тромбоза.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®]

Не приемайте ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®]:

- ако имате свръхчувствителност към продукта, към хепарин или хепарин-подобни лекарствени вещества, както и към някое от помощните вещества на ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®]
- ако имате хеморагична диатеза или вероятност да развиете хеморагични нарушения

Бъдете много внимателни с ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®]:

ако сте провеждате антикоагулантно лечение. В този случай е препоръчително периодично да провеявате показателите на кръвосъсирването.

Бременност и кърмене

Като предпазна мярка по време на бременност или кърмене не се препоръчва употребата на ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®], въпреки че при проведените проучвания за фетотоксичност не са били доказани ембрио-токсични ефекти.

Шофиране и работа с машини

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Приемане на други лекарствени средства:

Листовка за пациента



Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарствени средства, дори тези без прескрибция.

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] може да увеличи противосъсирващия ефект на хепарин и пероралните антикоагуланти, ако са приемани едновременно.

3. КАК СЕ ПРИЕМА ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®]

Обичайната доза е:

Капсули: 1-2 капсули два пъти дневно; да не се приемат с храна.

Ампули: 1 ампула дневно интрамускулно или интравенозно.

Обикновено се препоръчва лечението да започне с инжекционен разтвор и след 15-20 дни да продължи с капсули за период от около 30-40 дни. Целият курс на лечение трябва да се повтори най-малко два пъти годишно.

В зависимост от преценката на лекуващия лекар дозировката може да се променя по отношение на количеството и честотата на приложение.

Ако приемете повече ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®], то тогава трябва:

Лекарственото средство винаги трябва да се приема според предписанието на лекаря. В случай, че сте приели повече ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] се препоръчва да информирате лекаря си.

Ако забравите да вземете ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®]:

Ако сте забравили да вземете лекарственото средство, то трябва да вземете дозировката възможно най-бързо. Ако един ден сте пропуснали да вземете лекарството, следващия ден вземете обичайната доза. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите дози.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти, така и ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®] може да има нежелани лекарствени реакции. Все пак, при предписаната дозировка, възможността от поява на нежелани лекарствени реакции е много малка.

При лечение с ампули нежеланите лекарствени реакции обикновено се ограничават в мястото на инжектиране и може да включват болка, усещане за парене и хематоми.

При приемане на капсули редките прояви на нежелани лекарствени реакции обикновено са съсредоточени в гастро-интестиналния тракт и могат да включват гадене, повръщане, диария, диспепсия и болка в епигастриума.

Съобщени са редки случаи на главоболие, виене на свят и обриви на кожата при приемане на меки капсули или ампули.

В случай, че проявите някоя от тези нежелани лекарствени реакции, информирайте лекаря си.

Моля, информирайте лекаря или фармацевта си, ако забележите лекарствени реакции, неупоменати в тази листовка за пациента.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕСЕЛ ДУЕ Ф[®]

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под +30°C.

Да не се използва след датата, отпечатана на кутията.

Последна редакция на текста Септември 2008 г.

Листовка за пациента

