

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

И А Л
О Д О Б Р Е Н О !
ДАТА 05.12.06г.

Моля, прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Тази листовка ще Ви даде информация за ВИБРАМИЦИН.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля попитайте Вашия лекар или Вашия фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди дори, когато техните оплаквания са същите като Вашите.
- Запазете тази листовка, може да пожелаете да я прочетете отново.

В тази листовка:

1. Какво представлява ВИБРАМИЦИН и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате ВИБРАМИЦИН
3. Как трябва да се приема ВИБРАМИЦИН
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхраняване на ВИБРАМИЦИН
6. Допълнителна информация

VIBRAMYCIN® 100 мг таблетки
ВИБРАМИЦИН® 100 мг таблетки
DOXUSYCLINE

Името на това лекарство е ВИБРАМИЦИН. Лекарственото вещество е doxusycline (доксисицилин).

Всяка таблетка съдържа 100 мг от лекарственото вещество.

Помощните вещества са: микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, колоиден безводен силиций.

Притежател на разрешението за употреба:
PFIZER EUROPE MA EEIG,
Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ

Производител:
Pfizer PGM, Zone Industrielle – 29 Route des Industries, 37530 Porce-sur-Cisse, France.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИБРАМИЦИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ВИБРАМИЦИН се предлага под формата на диспергиращи се таблетки, съдържащи 100 мг лекарствено вещество.

ВИБРАМИЦИН се предлага в опаковка, съдържаща 10 броя таблетки.

Какъв тип лекарство е ВИБРАМИЦИН

ВИБРАМИЦИН принадлежи към група лекарства, наречени тетрациклинови антибиотици. Използва се за лечение на много различни видове инфекции.

За какво се използва ВИБРАМИЦИН



Вашият лекар може да ви предпише ВИБРАМИЦИН за лечение на различни инфекции като например:

- Гръдни или белодробни инфекции, например бронхит, пневмония;
- Инфекции на пикочополовия тракт, например цистит, уретрит, епидидимоорхит;
- Акне;
- Очни инфекции;
- Полово-предавани болести, напр. гонорея, сифилис, хламидиаза;
- Антракс, включително и белодробната форма на инфекцията.

ВИБРАМИЦИН се използва и за профилактика на някои инфекции като малария, холера, тиф, диария на пътника и лептоспироза.

Вашият лекар може да ви предпише ВИБРАМИЦИН за лечение на друга инфекция, която не е посочена по-горе. Също така той може да комбинира ВИБРАМИЦИН с друго лекарство за лечението на Вашата инфекция. Ако имате някакви въпроси, консултирайте се с Вашия лекар.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ВИБРАМИЦИН

ВИБРАМИЦИН не трябва да се използва:

Ако сте получавали алергична реакция към доксициклин или някое от помощните вещества в състава на лекарството, описани по-горе.

Ако сте бременна или се опитвате да забременеете.

Ако кърмите.

Ако лекарството е предписано за дете под 8 години.

Тетрациклините не трябва да се прилагат по време на периода на развитие на зъбите (втората половина от бременността, при бебета и деца под 8 години), тъй като могат да доведат до трайна промяна в цвета на развиващите се зъби (жълто-сиво-кафяв цвят).

Ако отговорът на някои от въпросите по-долу е ДА, уведомете Вашия лекар преди да приемете ВИБРАМИЦИН, тъй като това лекарство може да не е подходящо за Вас.

▪ Ако по време на лечението ви с ВИБРАМИЦИН се появи диария. Наблюдавано е увреждане на дебелото черво (псевдомембранозен колит) при приложението на почти всички антибиотици, включително и при приложението на ВИБРАМИЦИН, като степента на изява е различна.

▪ Ако се появят възпаление или ранички в областта на гърлото или гълтача, когато лекарството се приема непосредствено преди лягане, тъй като макар и рядко приемът на тетрациклингов антибиотик, в това число и ВИБРАМИЦИН, може да причини това.

▪ Ако се повиши честотата на възпаление на влагалището, причинено от гъбички и проявяващо се със сърбеж и възможна поява на бяло течение (вагинална кандидоза)

Ако приемате продължително време ВИБРАМИЦИН, Вашият лекуващ лекар може да прецени, че е необходимо периодично да Ви се правят някои изследвания.

Необходимо е да се избягва прекомерно излагане на слънце или изкуствена ултравиолетова светлина (солариум) или да се има предвид необходимостта от употребата на слънцезащитни продукти. Ако се появят реакции на фоточувствителност (напр. кожни обриви и др), съобщете незабавно на Вашия лекуващ лекар.

Приемайте обилни количества течности с ВИБРАМИЦИН, за да се намали риска от раздразване и разязвяване на хранопровода.

Уведомете Вашия лекуващ лекар, ако приемате лекарства, съдържащи бисмутови соли (използват се обикновено за лечение на диария и за лечение на стомашна язва), тъй като те могат да намалят усвояването на ВИБРАМИЦИН при едновременен прием.



Ако трябва да Ви бъдат направени някакви изследвания, съобщете на лекаря или лаборанта, който прави изследванията, че приемате ВИБРАМИЦИН.

Бременност

ВИБРАМИЦИН не трябва да се приема по време на бременност, освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал друго. Жени в детородна възраст е необходимо да използват ефикасни противозачатъчни средства. Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако забременеете, смятате, че сте забременели или планирате забременяване, докато приемате ВИБРАМИЦИН.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, ако сте бременна.

Кърмене

Докато употребявате ВИБРАМИЦИН, не се препоръчва да кърмите, тъй като това лекарство се излъчва в майчиното мляко. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, докато кърмите.

Шофиране и работа с машини:

Няма данни за ефекта върху способността за шофиране и работа с машини. Предвид начина на действие на лекарството не се очакват значими ефекти.

Прием на други лекарства:

Преди да започнете да приемате каквото и да е ново лекарство с ВИБРАМИЦИН трябва да говорите с Вашия лекар. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако в момента вземате или наскоро сте вземали каквото и да е друго лекарство, даже и без лекарско предписание.

ВИБРАМИЦИН и някои други лекарства могат да си влияят едно на друго (взаимодействие).

Съобщете на Вашия лекар, ако използвате някое от по-долу изброените лекарства:

- Антиациди (използват се при киселини в стомаха), железни препарати или бисмутов субсалицилат: Ако приемате тези лекарства едновременно с ВИБРАМИЦИН, това може да попречи на действието му.

- Warfarin (варфарин) или други противосъсирващи лекарства: Тетрациклините могат да засилят действието на тези лекарства и да е необходимо намаляване на дозата им.

- Перорални противозачатъчни: Едновременната употреба на противозачатъчни лекарства и тетрациклин може да намали действието на противозачатъчните и да увеличи вероятността за нежелана бременност

- Пеницилинови антибиотици: ВИБРАМИЦИН може да намали действието на тези антибиотици.

- Алкохол: Алкохолът може да намали действието на ВИБРАМИЦИН.

- Карбамазепин, фенитоин (използват се при лечението на епилепсия) и барбитурати (използват се за контролиране на епилепсията или като успокоителни): Намаляват действието на ВИБРАМИЦИН.

- Едновременното приложение на ВИБРАМИЦИН и инхалационния анестетик methoxyflurane (метоксифлуран) води до необратимо увреждане на бъбреците.

В някои случаи е възможно да се получат фалшиво положителни резултати при някои лабораторни тестове за изследване на урина.

Прием на ВИБРАМИЦИН с храна и напитки:

Не се препоръчва консумация на алкохол, докато приемате ВИБРАМИЦИН.

3. КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ВИБРАМИЦИН



Винаги приемайте ВИБРАМИЦИН точно както вашият лекар Ви е инструктирал. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще определи каква доза е подходяща за Вас.

Трябва да се има предвид, че дозировката на ВИБРАМИЦИН се различава от тази на повечето от другите антибиотици от същата група (тетрациклини)

ВИБРАМИЦИН трябва да се приема само през устата.

Обичайна доза: 200 mg през първия ден, а след това по 100 mg на ден, най-често за период от 7 дни.

Деца над 8 години: Лекарят ще определи дозата, която трябва да получава Вашето дете в зависимост от неговото тегло.

Акне: 50 до 100 mg на ден за период до 12 седмици.

Лекарите могат да назначат дози, различаващи се от тези, в зависимост от типа на инфекцията и състоянието Ви. Консултирайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни за какво Ви е предписано лекарството или имате други въпроси.

Приемайте таблетките ВИБРАМИЦИН с обилно количество течност, за да се намали риска от раздразване и поява на ранички на хранопровода.

Най-добре е да приемате Вашето лекарство по едно и също време всеки ден в седнало или изправено положение.

Ако стомахът Ви е раздразнен, ВИБРАМИЦИН може да се приеме с мляко или храна.

Вземайте таблетките през целия курс на лечение дори когато се почувствате по-добре. Ако спрете да приемате таблетките твърде рано, инфекцията може да се възобнови.

Ако все още не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако приемете по-голямо от необходимото количество ВИБРАМИЦИН:

Обадете се незабавно на Вашия лекар или отидете до най-близкото болнично спешно отделение. Вземете опаковката от ВИБРАМИЦИН с Вас, дори ако в нея не са останали таблетки.

Ако забравите да вземете ВИБРАМИЦИН:

Важно е да вземате вашите таблетки ВИБРАМИЦИН редовно по едно и също време всеки ден. Ако забравите да вземете една доза, вземете я веднага щом си спомните, освен ако не е дошло време за Вашата следваща доза. В този случай просто продължете със следващата доза по обичайния начин. Не вземайте 2 дози по едно и също време, за да наваксате дозата, която сте пропуснали.

Колко бързо ще започне да действа лечението

Би трябвало да се почувствате по-добре след няколко дни. Ако приемате ВИБРАМИЦИН за лечение на акне, може да минат няколко седмици преди да се получи подобрение.

Какво да правите, ако не се почувствате по-добре

Ако инфекцията се влошава, не се почувствате по-добре в рамките на няколко дни (с изключение на акне) или се развие нова инфекция, консултирайте се отново с Вашия лекар.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

ВИБРАМИЦИН, както всички лекарства, може да причини някои нежелани лекарствени реакции.

Нежеланите лекарствени реакции, споменати по-долу, са:

- Раздразнен стомах;
- Неразположение;
- Диария;
- Трудности при преглъщане;
- Загуба на апетит;
- Възпаление и сърбеж в ректалната област.

Тези нежелани лекарствени реакции обикновено са леки. Ако Ви създават проблеми, силно изразени са или не отшумяват в хода на лечението, информирайте Вашия лекар.

Други нежелани лекарствени реакции, които може да се появят, са:

- Обрив на кожата;
- Кожата Ви може да стане по-чувствителна към слънчева светлина, докато приемате тетрациклини. Ако получите кожен обрив, сърбеж, зачервяване или тежко слънчево изгаряне под влияние на силна слънчева или ултравиолетова светлина (напр. в солариум), спрете да приемате лекарството и се консултирайте с Вашия лекар;
- Много силно главоболие;
- Възпаление и разязвяване на гърлото или езика;
- Кръвни аномалии, обикновено свързани с промяна в броя на кръвните клетки;
- Шум в ушите.

Ако някоя от тези нежелани реакции се окаже трайна или обезпокоителна или ако забележите нежелана реакция, която не е спомената в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВИБРАМИЦИН

Съхранявайте Вашето лекарство при температура под 25°C.

Пазете всички лекарства място, недостъпно за деца!

Съхранявайте в оригиналната опаковка.

Не употребявайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в тази листовка се отнася само за ВИБРАМИЦИН. Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на листовката:

