

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВОЛТАREN ДОЛО 12.5 mg Филмирани таблетки

Диклофенак калий

VOLTAREN DOLO® 12.5 mg Film-coated tablets

Diclofenac potassium

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 11-4649, 10.04.09

Одобрено: 27 | 25.11.08

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че вашите симптоми се влошават или не се подобряват - болката не преминава в рамките на 5 дни, а температурата не спада до 3 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

- 0) Какво представлява ВОЛТАREN ДОЛО и за какво се използва
- 0) Преди да приемете ВОЛТАREN ДОЛО
- 0) Как да приемате ВОЛТАREN ДОЛО
- 0) Възможни нежелани реакции
- 0) Как да съхранявате ВОЛТАREN ДОЛО
- 0) Допълнителна информация

0. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВОЛТАREN ДОЛО И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ВОЛТАREN ДОЛО съдържа диклофенак, който принадлежи към групата лекарства, наречени "нестероидни противовъзпалителни средства" (НСПВС). ВОЛТАREN ДОЛО е с болкоуспокояващо, противовъзпалително (намаляващо отока) и понижаващо температурата действие.

ВОЛТАREN ДОЛО осигурява бързо облекчаване при главоболие, зъббол, менструални, ревматични, мускулни и болки в гърба. Облекчава симптомите при простудни заболявания, болка при възпалено гърло. За понижаване на температурата.

0. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ВОЛТАREN ДОЛО

Не приемайте ВОЛТАREN ДОЛО

- ако сте алергични към някоя от съставките;
- ако сте имали някога алергични реакции към диклофенак, ибупрофен или ацетилсалициловая киселина (използвана за предотвратяване на кръвосъсирването), използвани за лечение на болка, възпаление или температура. Реакциите може да включват: астма, хрипове, кожен обрив, оток на лицето или хрема;

- ако имате язва на стомаха или дванадесетопръстника;
- ако сте забелязали кръв в изпражненията или черни изпражнения (симптоми на стомашно-чревно кървене);
- ако страдате от тежко бъбречно или чернодробно заболяване;
- ако имате остра сърдечна недостатъчност;
- ако сте в последните три месеца от бременността.

Информирайте вашия лекар или фармацевт, защото ВОЛТАREN ДОЛО не е подходящ за вас при тези обстоятелства.

Обърнете специално внимание при употребата на ВОЛТАREN ДОЛО, в случай че:

- сте имали някакви стомашни или чревни заболявания, като стомашна язва, кървене или черни изпражнения. Ако сте имали стомашни болки или киселини, след като сте приемали болкоуспокояващи или противовъзпалителни медикаменти.
- страдате от астма, имате проблеми с бъбреците или черния дроб или отоци в краката.
- приемате други болкоуспокояващи или противовъзпалителни лекарства.
- съществува опасност да се дехидратирате (в резултат на заболяване, диария, преди или след сериозна операция).
- имате проблеми с кръвосъсирването или други проблеми на кръвта, включително чернодробна порфирия.

Ако някое от изброените състояния се отнася за вас, не приемайте таблетките, преди да се консултирате с вашия лекар или фармацевт.

Лекарства като диклофенак могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърден инцидент ("миокарден инфаркт") или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и продължително лечение. Не превишавайте препоръчените дози и продължителността на лечението. Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за вас може да има риск от появата им (например, ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с вашия лекар или фармацевт.

ВОЛТАREN ДОЛО може да маскира симптомите на инфекция (напр. главоболие, висока температура) и да я направи по-трудна за откриване. Ако не се чувствате добре и имате нужда да посетите лекар, не забравяйте да го уведомите, че приемате ВОЛТАREN ДОЛО.

Пациенти в старческа възраст

Както с другите болкоуспокояващи, хората в напреднала възраст може да са по-чувствителни към ефектите на ВОЛТАREN ДОЛО в сравнение с другите. Внимателно следвайте инструкциите и приемайте възможно най-малката доза, предизвикваща облекчаване на симптомите. Особено е важно възрастните пациенти навреме да съобщават за нежеланите ефекти на своя лекар или фармацевт.

Деца

Не давайте ВОЛТАREN ДОЛО на деца под 14 години.

Употреба на други лекарства

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако взимате или напоследък сте взимали други лекарства включително и такива отпускати без лекарско предписание.

Особено важно е да уведомите вашия лекар или фармацевт, ако използвате някое от изброените лекарства:

- литий или лекарства от класа на антидепресантите, наречени SSRIs (медикаменти за лечение на депресивни състояния);
- дигоксин (лекарство за лечение на сърдечни заболявания);
- ACE инхибитори или бета-блокери (клас лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане и сърдечна недостатъчност);
- метотрексат (медикамент за третиране на някои видове рак или артрит);
- медикаменти, назначени при диабет, с изключение на инсулин;
- диуретици (лекарства за отводняване - увеличаване на количеството на урината);
- лекарства, използвани за превенция на кръвосъсирването („лекарства за разреждане на кръвта“ или антикоагуланти);
- други противовъзпалителни или болкоуспокояващи, като ацетилсалицилова киселина или ибuproфен ;
- кортикоステроиди (лекарства за облекчаване на възпаления, засягащи различни части на тялото);
- циклоспорин (лекарство, използвано от пациенти, претърпели трансплантиация на органи;
- някои лекарства, използвани срещу инфекции (хинолонови антибактериални лекарствени продукти).

Бременност и кърмене

Не употребявайте ВОЛТАREN ДОЛО, ако кърмите, защото това може да навреди на вашето дете.
Информирайте вашия лекар, ако кърмите.

Важна информация за състава на ВОЛТАREN ДОЛО

Таблетките ВОЛТАREN ДОЛО съдържат лактоза. Ако сте информирани от лекар, че имате непоносимост към някои захариidi, консултирайте се с вашия лекар, преди да вземете това лекарство.

Шофиране и работа с машини

ВОЛТАREN ДОЛО обикновено не влияе върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, както с други болкоуспокояващи, в редки случаи пациентите могат да усетят нарушения на зрението, виене на свят и сънливост. Ако почувствате подобен ефект, не трябва да шофирате или да работите с машини. Уведомете вашия лекар, колкото е възможно по-скоро.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВОЛТАREN ДОЛО

Възрастни и деца над 14 години

Когато симптомите са налице, вземете първоначална доза от 2 таблетки. Ако е необходимо, продължете с 1 или 2 таблетки на всеки 4-6 часа. Не приемайте повече от 6 таблетки за 24 часа.

Погълщайте таблетките цели с вода, за предпочитане между или преди харанене.

Не превишавайте посочената доза!

Не приемайте ВОЛТАREN ДОЛО повече от 5 дни, ако имате болки, или 3 дни - при температура. Ако симптомите не изчезнат или се задълбочават, уведомете вашия лекар, за да се уверите, че те не са в резултат на сериозно заболяване. Важно е да използвате най-ниската доза, която повлиява болката ви, и да не използвате ВОЛТАREN ДОЛО по-дълго от необходимото.

Ако сте приели повече от необходимата доза ВОЛТАREN ДОЛО

Ако сте приели повече таблетки ВОЛТАREN ДОЛО, веднага уведомете вашия лекар или фармацевт, или потърсете бърза помощ. Може да се наложи да останете под медицинско наблюдение.

Ако сте пропуснали да приемете ВОЛТАREN ДОЛО

Приемете следващата доза в обичайното време.

Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате други въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, се консултирайте с вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарства ВОЛТАREN ДОЛО може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Възможно е някои редки или много редки нежелани ефекти да са сериозни. Спрете употребата на ВОЛТАREN ДОЛО и уведомете вашия лекар незабавно, ако е налице някое от посочените състояния:

- остра стомашна болка, кръв в изпражненията или черни изпражнения, повръщане на кръв;
- алергични реакции, включващи отичане на лицето, устата, езика или гърлото, често придружени от кожен обрив. Припадък;
- хрипове и тежест в гърдите;
- болка в гърдите, умора, високо кръвно налягане;
- внезапно и тежко главоболие, схващане на шията, затруднен говор, конвулсии;
- кожен обрив с мехури, лющене на кожата, морави петна по кожата, пъпки по устата и очите;
- отичане на ръцете и краката (едем);
- промени във вида или количеството на урината;
- пожълтяване на кожата или очите;
- необично кървене или травмиране, висока температура или продължително възпаление на гърлото;

Лекарства като диклофенак могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърден инцидент ("миокарден инфаркт") или инсулт. Други ефекти, които може да се появят, обикновено са слаби. Някои от тях са установени при високи дози диклофенак - активното вещество на ВОЛТАREN ДОЛО, и дългосрочна употреба.

Уведомете вашия лекар или фармацевт, ако забележите някои от посочените ефекти.

Срещани нежелани ефекти (засягат от 1 до 10 души на 100):

- болка в корема или стомаха, диария, гадене, повръщане, газове;
- главоболие, виене на свят;
- кожен обрив;

Редки нежелани ефекти (засягат от 1 до 10 души на 1000):

- сънливост

Много редки нежелани ефекти (засягат по-малко от 1 човек на 10 000):

- запек, възпаление в устата, нарушение на вкуса ;
- изтръпване или сковаване на ръцете или краката, треперене;
- замъгляване на зрението, шум в ушите, сърцебиене;

- промени в настроението, трудно заспиване, чувство на объркане;

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако някои от посочените реакции се задълбочат или забележите нежелана реакция, която не е посочена в тази листовка.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВОЛТАРЕН ДОЛО

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25 °C.

Не използвайте ВОЛТАРЕН ДОЛО след срока на годност отбелаязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да унищожите ненужните ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ВОЛТАРЕН ДОЛО

Активно вещество : Диклофенак калий

Всяка таблетка ВОЛТАРЕН ДОЛО съдържа 12.5 mg диклофенак калий като активно вещество.

Помощни вещества:

силика, лактоза, царевично нишесте, натриев нишестен гликолат, поливидон, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, метилхидроксипропил целулоза, титанов диоксид (E171) и стеаринова киселина.

Какво съдържа опаковката

ВОЛТАРЕН ДОЛО са малки, лесни за прегъщане бели таблетки в опаковка по 10.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Германия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с упълномощения представител на притежателя на разрешението за употреба за България / вносител:

Салвис Фарма ООД,
София 1528, ул. Димитър Пешев 5,
тел./факс: +359 2 973 22 99; +359 2 973 26 87

Последна редакция на листовката

Август 2008 г.

